


33724/B

vol 2

RM(MH) 110





CAROLI LINNÆI

ENTOMOLOGIA,

FAUNÆ SUECICÆ DESCRIPTIONIBUS

AUCTA;

DD. SCOPOLI, GEOFFROY, DE GEER, FABRICII, SCHRANK, &c. speciebus vel in Systemate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliæ Australis locupletata, generum specierumque rariorum iconibus ornata;

Curante & augente CAROLO DE VILLERS, Acad. Lugd. Massil. Villa-Fr. Rhotom. necnon Geometriæ Regio Professore.

TOMUS TERTIUS.



LUGDUNI,

Sumptibus PIESTRE ET DELAMOLLIERE,

1789.





I V.

NEUROPTERA.

Alæ IV, nudæ, venis reticulatæ.

Cauda sæpius aliquo sexus adminiculo instructa, inermis.

GENUS PRIMUM.

LIBELLULA. Os maxillosum: maxillis pluribus.

Antennæ thorace breviores.

Alæ extensæ.

Cauda (Maris) hamoso-forcipata.

* *Alis patentibus acquiescentes.*

4-Maculata. I. L. (la Françoise) alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. t. 7. f. 1.

Scop. carn. 679.

Faun suec. n. 764. lib. alis macula marginali duplici.

Libellulæ declaratæ sunt accipitres gymnopterorum; larvæ intra aquam currunt, crocodyli crudeles insectorum aquaticorum; illarum patentes lepidoptera, credæ diptera imprimis prædantur.

Insect. Tomus III.

A

Raj. inf. p. 49. n. 3.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 1, 2.

Geoff. parif. 2. p. 224. n. 6.

Fab. 1. alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante, abdomine depresso tomentoso.

Faun. Fridr. n. 531.

Hab. in Europa.

Desc. Nomen *Raji* nil valet, descriptio bona est. *Thorax* crassus maculis duabus flavis, præter anticam, distinctis nigris lineis a tergo hirsutis. *Abdomen* attenuatum ex lato principio. *Alæ* albæ, versus basin luteæ, sed inferiores infra luteum colorem nigræ. *Abdominis* latera & dorsum flavescentia; *cauda* duabus appendicibus teretibus utrinque attenuatis. Nota essentialis, qua hæc species ab omnibus distinguitur, consistit in puncto marginali, quod ut in reliquis versus extremitates nigrum est, sed præter hoc punctum, fusca nigra alia macula ad marginem anteriorem in medio singulæ alæ; adeoque puncta quasi duo marginalia in omni ala. *Oculi* postice subtus linea flava. *Faun* 1459.

Obs. 1. In *Faun. Fridr.* hujus libellulæ quinque varietates numerantur.

α Libellula *quadrinaculata* macula marginali umbrata, oculis fuscis sex punctatis.

β Libellula *quadrinaculata* macula marginali nebulosa, abdomine pellucido.

γ Libellula *quadrinaculata* macula marginali media ocellata.

δ Libellula *quadrinaculata* macula marginali media duplicata, abdomine æquali.

η Libellula *quadrinaculata* macula marginali media duplicata & punctata, abdomine attenuato.

Obs. 2. Multas alias varietates enumerare facile v. g. in varietate γ sæpe macula marginalis est nebulosa. V.

Flaveola. 2. L. (l'Éléonore) alis basi luteis. *

Raj. inf. 49. n. 4.

Raf. inf. 2. *aqu.* 2. t. 5. f. 4.

Geoff. paris. 2. p. 225. n. 7. t. 13. f. 1.

Schæff. inf. t. 4. f. 1.

Fab. 5.

Enum. 596.

Faun. Fridr. n. 532.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 767.

Hab. in Europâ.

Desc. Dorsum luteum, subrus tota nigra.

Thorax niger, utrinque maculis duabus obliquis flavis, præter lineas duas flavas præcedentes. Pedes nigri. Frons virescens. Oculi grisei. Alæ omnes basi lata flava macula. *Faun.* 1460. Variat.

α *Libellula flaveolata* alis albis basi maculaque marginali luteis.

β *Libellula flaveolata* alis albis basi maculaque marginali & media superiorum luteis.

γ *Libellula flaveolata* alis albis basi maculaque marginali & media omnium luteis.

Obs. 1. Omnes & aliæ varietates in Gallia Aust. V.

Obs. 2. Hæc inter minores: variat rarius alis absque basi lutea, forte sexu.

Vulgata. 3. L. (la claire) alis hyalinis, corpore griseo, cauda simplici. *

Scop. carn. 680.

Raj. inf. 49. n. 6.

Raf. inf. 2. *aqu.* 2. t. 8.

Fab. 14. alis hyalinis immaculatis, abdomine cylindrico, rufo.

Faun. Fridr. n. 533. alis albis, corpore fusco, cauda simplici.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Alæ albæ, puncto marginali rufosusco. Corpus nigricans. Anus absque appendice. Faun. 1461.

Rubicunda. 4. L. (la Laïs) alis tantum posticis basi nigricantibus. *

Ræf. inf. 2. aqu. 2. t. 7. f. 4.

Raj. inf. 50. n. 8.

Fab. 10.

Faun. Fridr. n. 534.

Hab. in Europa. Circa Lugdunum non rara. V.

Desc. Facies alba. Thorax niger pallido lanatus, lineis rubris & dorso inter alas coccineo. Pedes nigri. Alæ hyalinae, macula marginali ferruginea. Inferiores basi nigræ. Abdomen nigrum, maculis dorsalibus magnis rubris. Cauda parva. Sexus alter a tergo thoracis & abdominis maculis rubris; alter luteis; foemina igitur lutea, ubi mas ruber. Faun. 1462.

Obs. Color cum vita sæpius transit, sed facies semper alba. Variat macula marginali ferruginea vel atra.

Depressa. 5. L. (la Sylvie) alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato lateribus flavescente. *

Scop. carn. 678.

Raj. inf. 140. & 49. n. 4, 5.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 1.

Ræf. inf. 2. aqu. t. 6. f. 4.

— t. 7. f. 3.

Edw. av. t. 333.

Geoff. parif. 2. p. 226. n. 9.

Fab. 2. alis omnibus basi nigricantibus, abdomine depresso lateribus flavicante.

Enum. n. 597.

Poda gr. p. 98.

Faun. Fridr. n. 535.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 768.

Hab. in Europa.

Desc. Facies lutescens. *Thorax* villosus, pallido-virens, antice lineola flava. *Alæ* macula marginali atra; & omnes basi nigro-ferrugineæ, intimo margine albo. *Abdomen* lanceolatum, cinereo-virescens, segmentis 3, 4, 5, 6, 7 lateribus luteis, apice obscure ferrugineo; ano setis duabus subulatis brevissimis. *Femora* basi livida. *Pedes* nigri. Hæc interdum abdominis tergo cærulefcente occurrit. *Faun.* 1463.

Vulgatissima. 6. L. (la Justine) thorace flavo, strigis octo nigris. *

Swamm. quart. t. 8. f. 6.

Ræf. aqu. 2. t. 5. f. 3.

Geoff. parif. 2. p. 227. n. II.

Fab. 12.

Faun. Fridr. n. 536. thorace strigis octo flavicantibus.

Hab. in Europa.

Desc. Latera thoracis & abdominis flava. *Alæ* albæ, nullo modo flavescences ut in *Rajana*, a dorso longitudinaliter fusca. *Puncta* marginalia alarum fusco-ferruginea. *Faun.* 1464.

Cancellata. 7. L. (la Philis) alis basi immaculatis, abdomine dorso lateribusque interrupte luteis. *

Libellula mas, visâ sociâ, ut eam devirginet, caudæ forcipe apprehendit. fœminæ collum, quo vero illa, vinci nolens volensve, liberatur, cauda sua vulvisera repellit proci pedus, ubi maris arma latent, sic unitis sexibus obvolitat propria lege. Vide *Swamm. Rajum*, *Reaumurium*.

Fab. 15.

Faun. Fridr. n. 537.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud frequens V.

Desc. *Facies* pallida, *fronte* nigra. *Oculi* postice linea flava nigro interrupta. *Thorax* antice testaceus, lineis duabus nigris & lateribus maculis duabus flavis. *Abdomen* dorso flavum, utrinque lineis duabus nigris longitudinalibus & segmentorum marginibus nigris. *Faun.* 1465.

Obs. In nostris speciminibus anus albus, appendice albo. V.

Ænea 8. L. (l'Aminthe) thorace æneo-viridi. *

Faun. suec. 1. n. 768, 769. lib. thorace viridi-nitido, lineis flavis.

Raj. inf. 49. n. 5. & 140.

Raf. inf. 2. aqu. 2. t. 5. f. 2.

Geoff. paris. 2. p. 226. n. 10.

Fab. 27.

De Geer tom. 2. p. 687. t. 19. f. 1.-18. viridi-ænea nitida, capite globofo, pedibus nigris, abdomine medio incrassato.

Schæff. icon. t. 113. f. 4.

Faun. Fridr. n. 538.

Hab. in Europa.

Desc. præcedenti simillima. *Maris* cauda quadridentata, dentibus superioribus pilosis, inferioribus singulis duplici denticulo. *Fæminæ* cauda foliis 2 lanceolatis. *Caput*, *thorax*, *abdomen* cupreo-inaurata. *Thorax* pilosus absque maculis: margo alarum posticarum poneversus abdomen macula membranacea. *Oculi* præsini. *Labium* pallidum. *Abdomen* subtus hinc inde albescens. *Faun.* 1466.

Obs. Variat alis fere immaculatis. V.

Grandis. 9. L. (la Julie) alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis.

Ad. nidr. 3. p. 412. t. 6. f. 9.

Mouff. inf. 67. f. 2. n. 3.

Raf. inf. 49. n. 2. & 140. n. 2.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 3.

Raf. inf. 2. aqu. 2. t. 4. f. 14.

Geoff. paris. 2. p. 227. n. 12.

Fab. aeshna 2. thorace lineis 4 flavis, thorace variegato.

De Geer tom. 2. p. 678. t. 20. f. 5.-16. *flavipennis* fusca, capite globofo, thorace lineis 4 obliquis flavis, alis subluteis, abdomine cylindrico.

Enum. 599.

Schæff. icon. tom. 2. f. 4.

— t. 60. f. 1.

Sulz. inf. t. 17. f. 101.

Scop. carn. 677.

Faun. Fridr. n. 539. quadrifasciata.

α Alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor albidis.

β Alis albidis, abdomine rufosusco, dorso baseos triangulo flavo.

γ Alis totis albidis, abdomine rufosusco, dorso baseos sex lineis inæqualibus nigris.

ε Alis albidis, abdomine punctis, maculis lineisque diversis coloribus variegatis.

η Alis flavescenscentibus, abdomine prope basin attenuato.

Raf. inf. tom. 2. cl. 2. *inf. aqu. t.* 4. f. 14.

ζ Alis flavescenscentibus, abdomine basi crasso.

Hab. in Europa.

Desc. Duo folia fusca lanceolata in cauda. *Abdomen* longum, angustum, rufosusum, interdum albo maculatum. In *thorace* lineolæ utrinque duæ,

oblique transversales, flavæ; thorax alias abdomini concolor, hirsutus. Alæ flavescentes, macula ferruginea. Est inter maximas. *Faun.* 1467.

Obs. Magnitudine facile agnoscitur uti lineis thoracis. Cætera variant colorefque fere semper cum vita pereunt.

Variat admodum hæc libellula non solum coloribus, sed etiam abdominis basi modo attenuata, modo crassa. Variat adhuc alarum color, modo albidus, modo glaucescens, modo flavescens. V.

Juncea. 10. L. (la Liffette), alarum membranula accessoria nigricante, thorace lineis sex flavis, abdomine basi attenuato.

Schæff. inf. t. 6. f. 10.

Hab. in Europa.

Alarum posticarum membranula baseos nigricans in hac specie. *Syst.*

Obs. An species? An grandis varietas? Mera varietas videtur. V.

Forcipata. 11. L. (la Caroline) thorace nigro characteribus variis flavescens, cauda unguiculata. *

Pet. mus. 84. n. 819.

Reaum. inf. 4. t. 10. f. 4.

— 6. t. 35. f. 5.

Geoff. inf. 2. p. 228. n. 13.

Enum. n. 596.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 770.

Fab. aeshpa 1.

Faun. Fridr. n. 539.

De Geer tom. 2. p. 685. t. 21. f. 1, 2.
nigra, capite globoso, thorace maculis abdomineque angulis viridibus.

Schæff. icon. t. 160. f. 1. - t. 196. f. 1.

*Raf. inf. tom. 2. cl. 2. inf. aqu. t. 5.
f. 3 & 4.*

Hab. in Europa.

Desc. Est inter maximas. *Mas* cauda forcipata, duobus unguibus majoribus, oppositis & duobus mucronibus subjectis, parvis. *Thorax* viridi-flavescens, antèrius ad alarum exortum, versus caput, tribus nigris lineis duplicatis notatus. *Abdomen* cylindricum, nigrum, octo constans articulis, a tergo linea flava longitudinali inscriptis, quæ 6 priores articulos exarat, non vero 7 & 8. Singulum segmentum ad latera macula flava transversa & alia minore incurva longitudinali insignitur, quæ maculæ evidèntiores in fœmina, quam in mare. *Fœminæ* cauda duobus mucronibus armatur, maris vero quatuor. Maris *genitalia* sub vel in primo abdominis segmento, fœminæ vero sub vel in ultimo segmento, uti in omnibus congeneribus. *Alæ* hyalinæ, puncto marginali & linea transversali in medio. *Faun.* 1469.

Ex spec. D. Fab.

Pedemon- 12. L. (la Piémontoise) alis planis cinereis, fascia apicis fusca.

Sulz. inf. t. 24. f. 1 ?

*Hab. in agro Pedemontano. Dr. Allioni.
In Gallia Aust. V.*

Desc. Parva. *Corpus* obscure flavescens.

Obs. Alæ omnino hyalinæ, sola macula marginali fusca. V.

Ex Faun. Fridr.

Cyanea. 13. L. (la Henriette) alis albidis. puncto

marginali nigro, lineis sex thoracis sulphureis.

Ræf. inf. aqu. t. 2. f. 1.

Hab. in Europa In Gallia Aust. V.

An species? An grandis varietas?

Hafnienfis. 14. L. (la Danoise) alis basi margineque superiori aureis, thoracis lateribus sex fasciatis, abdomine nigro, lineis punctisque sulphureis.

Hab. in Europæ pratis.

Pratenfis. 15. L. (la Bergere) alis hyalinis, thoracis lateribus fasciis virentibus octo, antice tribus fulvo.

Hab. in Europa.

Fulva. 16. L. (la Chrifline) alis basi fulvescentibus, macula marginali nigra, thorace abdomineque fulvo.

Hab. in Europa.

Triedra. 17. L. (la Gertrude) alis omnibus basi luteis, puncto marginali nigro, abdomine triangulari.

Hab. in Europa. In Gallia prope Lugdunum. V.

Variat 1°. Alis posticis basi luteis.

— 2°. Alis nullis basi luteis.

Obs. Hæc ultima varietas cinerea frequensque in Burgundiæ comitatus pratis, in Parochia vulgo *Epi*.

Sanguinea. 18. L. (la Ninon) alis hyalinis puncto marginali ferrugineo, dorso sanguineo.

Ræf. inf. 2. aqu. t. 8. f. 4.

Hab. in Europa. In Gallia prope Lugdunum. V.

Obs. An libellulæ vulgaræ varietas? Vix, nisi colore, discrepant. V.

Variegata. 19. L. (la Rosalie) alis hyalinis puncto marginali ferrugineo , abdomine flavo rubeoque variegato.

Ræf. inf. aqu. t. I. f. 2.

Hab. in Europa.

Obs. Si species vera est , *grandis* magnitudinem æquat. V.

Frédriche- 20. L. (l'Agathe) alis prioribus linea ,
dalenfis. posticis macula baseos nigricante , abdomine depresso cæruleo.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Rubra. 21. L. (la Pudique) alis posticis lata macula flavescente , thorace abdomineque cylindrico rubro.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Obs. Nostræ diagn. convenit , sed abdomen depressum est. V.

Frumenti. 22. L. (la Catherine) alis albis puncto marginali nigricante , abdomine subluteo , linea interrupta laterali nigra.

Ræf. inf. 2. aqu. 2. t. 7. f. 4.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Ex inf. paris. entom. que paris.

Cecilia. 23. L. (la Cécile) thorace virescente , abdomine fusco , characteribus flavis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Obs. Alæ omnes luteo marginatæ.

Victoria. 24. L. (la Victoire) corpore flavo , abdomine cylindrico , alarum basi flavescente.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Obs. An varietas libellulæ rubræ n. 21 ?

** *Oculi distantes remotique.*

Virgo. 25. L. (la Louise) alis erectis coloratis. *

Scop. carn. 681.

α Libellula corpore sericeo nitido , alis luteo-fuscis , margine immaculatis.

Faun. suec. 1. n. 756.

Raf. aqu. 2. t. 9. f. 7.

Raj. inf. 50. n. 11.

Schæff. elem. t. 78. f. 1.

Geoff. paris. 2. p. 221. n. 1.

Enum. n. 600.

Fab. agrion. 1.

Faun. Fridr. n. 552.

Poda gr. p. 97.

Desc. Corpus mediæ magnitudinis , e cæruleo-nitens , sive atratum. *Alæ* luteo-fuscæ absque ullo puncto ad marginem exteriorem alarum. *Faun.* 1470.

β Corpore sericeo nitido , alis viridicærulefcentibus apice fuscis , margine immaculatis.

Faun. suec. 1. n. 757.

Raj. inf. 50. n. 10.

Homb. Ad. paris. 3. p. 145.

Rcaum. inf. 6. t. 35. f. 7.

Leuwenh. arc. 19. t. 19.

Desc. *Alæ* , quæ etiam puncto marginali carent , nigro-cærulefcentes , apice pallide fuscæ. *Cauda* unguiculata.

— Corpore viridicæruleo , alis subfuscis , puncto marginali albo.

Faun. suec. 758.

Geoff. Lulrique.

Raf. aqu. t. 9. f. 6.

Raj. inf. 51. n. 12.

Desc. Corpus viridi-sericeum , nitidum , minime cæruleum. *Pedes* nigri. *Alæ*

subfuscae, puncto marginali albicante oblongo. t. 7. f. 2.

— Libellula corpore sericeo nitido, alis inaurato-fuscis, macula nigra.

Faun. 759.

Mouff. inf. 68. f. 1.-3.

Ræf. aqu. 2. t. 9. f. 5.

Raj. inf. 50. n. 9. & p. 140. n. 2.

Hab. in Europæ fluviis.

Varietates hujus numerosæ; 1, alis glaucis; 2, alis fuscescentibus; 3, alis nigris; 4, alis hyalinis fascia lata nigra; 5, alis hyalinis apice albis; 6, alis apice fuscis puncto albo.

Desc. Corpus cæruleo-nitidum. Pedes nigri. Alæ a medio versus apices cærulefcente-nigræ, ipsis apicibus aurato-fuscis; a medio alæ versus ejus basin color inauratus, nullum punctum marginale in hac.

Puella. 26. L. (l'Amélie) alis erectis hyalinis. *

Scop. carn. 682.

α Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali fusco. *Faun.* 1. n. 760.

Raj. inf. 51. n. 15.

Ræf. aqu. 2. t. 10, 11. omnes.

Reaum. inf. 6. t. 40. f. omnes.

Sulz. inf. t. 17. f. 102.

Enum. n. 601.

Fab. agrion 2.

Faun. Fridr. n. 553.

Desc. Hæ e minoribus. Dorsum secundum totam longitudinem æneum. Alæ auratæ, nitidæ, puncto marginali fusco, rhomboide, non nigro; vasa alarum reticulata constant semper duobus nervis longitudinaliter sibi propioribus. Thorax & abdomen subtus & ad latera livida. Pedes extra nigricantes, intus

lividi. *Oculi* cinerei, supra fusci. *Caput* a tergo æneum, linea alba transversa transversim trifida, extremitatibus crassioribus. *Thorax* a tergo viridi-æneus, utrinque linea alba longitudinali notatus. *Antennæ* nigræ, breves, infimo articulo crasso. *Faun.* 1471.

- ♂ *Libellula* corpore incarnato, alis puncto marginali fusco.

Faun. suec. 1. n. 761.

Raj. inf. 51. n. 16. & 52. n. 17.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 4. & t. 4. t. 11. f. 6.

Rœf. inf. aqu. 2. t. 10, 11.

Geoff. la Dorothée.

De Geer tom. 2. p. 701. t. 21. f. 14.-22.

Desc. *Corpus* incarnatum, juxta incisuras abdominis lineolis five characteribus nigris. Punctum alarum marginale fuscum. *Faun.* 1471.

- ♀ *Libellula* corpore sericeo, alis puncto marginali nigro.

Faun. suec. 1. n. 762.

Raj. inf. 140. n. 1.

Desc. *Alæ* albæ, puncto marginali atro. *Corpus* supra viridi-cæruleum, nitidum, absque ulla alia mixtura; magnitudo præcedentium duarum. *Faun.* 1471.

- ♂ *Libellula* corpore cæruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro.

Faun. suec. 1. n. 763.

Gæd. inf. 3. p. 29. f. R.

List. Gæd. 228. f. 103.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 6.

Geoff. paris. 2. p. 222. n. 3.

Mérian. Eur. 78. t. 156.

Raj. inf. 53. n. 18.

Frisch. inf. 8. t. 11.

Schæff. icon. t. 120. f. 4, 5, 6.

Hab. ad prata paludosa, victitans muscis.

Varietates conjunxi, quas copula sæpius junctas vidi.

Obs. Varietates harum specierum innumeræ, at copula junguntur, ideoque haud distinctæ. *Fab.*

Desc. *Alæ* albæ, puncto marginali atro. *Abdominis* articuli, a tergo visi, antice cinerei, postice cærulescenti – nitidi; antepenultimus & ultimus articulus in plerisque cinereus, nullo modo nitidus.

Libell. non descript. vide in actis N. C. an. 1764.

Obs. 1. *Entom. parif. n. 6.* libellula *Adelais* varietas ejusdem. Corpore viridi-sericeo, alis albis puncto marginali.

Aliam varietatem indicat *D. Fab.* aliam adhuc vidimus tibiis quatuor posticis albo membranaceis, ciliatis, at vix distincta videtur.

Obs. 2. Dantur quædam præcedentibus minores, quæ forsan diversas species constituunt &, oculis remotis, ad hanc divisionem pertinent. V.

Tenella, 27. L. (la Thérèse) alis hyalinis, puncto marginali minimò. Abdomine rubro, rubellove, thorace viridi lineato vel non lineato. V.

Hab. in Europa. In Gallia.

Albidella, 28. L. (la Life) thorace infra albo, supra nigro, viridi lineato, abdomine albo, vel albido vel fusco-albido, alis brevibus, puncto marginali fusco vel ferrugineo. Hæ duæ habitant passim. V.

Hab. in Europa. In Gallia.

GENUS II.

EPHEMERA. Os edentulum absque palpis.
 Stemmata II, maxima, supra oculos.
 Alæ erectæ, posticis minimis.
 Cauda setosa.

* Cauda trifeta.

Vulgata. 1. E. (la commune) cauda trifeta; alis
 nebuloso-maculatis. *

Scop. carn. 683.

Sulz. inf. t. 17. f. 103.

Geoff. parif. 2. p. 238. n. 1.

Fab. 1. cauda trifeta, alis fusco reticu-
 latis maculatisque, corpore fusco.

Faun. Fridr. n. 555.

Enum. n. 602.

De Geer tom. 2. p. 621. t. 16. f. 1.-14.
 -t. 17. f. 1.-10. fusca, abdomine
 luteo; maculis triangulis nigris, alis
 fusco maculatis, cauda trifeta.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 778.

Hab. in Europæ aquis.

β Desc. Differt manifestè a reliquis. Alæ
 venis reticulatis valdè fuscæ & maculis
 alarum nebulosis, fuscis, inæqualibus.
 Setæ etiâ caudæ fuscæ. Faun. 1472.
 Hujus tanta copia circa Laz Carniolia,
 e rivulò quodam, junio M. nascitur,
 ut rustici vicini exiguam messëm se
 collegisse putent, nisi quilibet ulra 20

Ephemera Larvæ natant in aquis; volatilis facta brevissimo
 fruuntur gaudio, uno sæpe eodemque die nuptias, puerperia,
 & exsequias celebrantes.

currus

currus his probe onustos in agrum exoneraverit , stercorationi optime infervientes. Scopol.

Lutea. 2. E. (la jaune) cauda trifeta , corpore luteo , alis hyalinis reticulatis.

Fab. 2.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 238. n. 2.

Enum. n. 603.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 778.

Hab. in Europa.

Desc. Alæ albæ , diaphanæ , fusco reticulatæ. Setæ caudæ nigro luteoque variegatæ. V.

Marginata. 3. E. (la bordée) cauda trifeta , corpore fusco , alis albis margine exteriore fusco.

Fab. 3.

Raf. inf. aqu. 2. t. 12. f. 1 , 2.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 239. n. 3.
luteo-fusca , alis fusco-viridibus , cauda trifeta.

De Geer t. 2. p. 646. t. 17. f. 11.-16.
teste *Fab. nigra* , thoracis lateribus fuscis , alis albis , pellucidis , immaculatis , cauda trifeta. An hæc ? An sequens ?

Hab. in Europa. Fabricius. Prope Lugdunum in loco vulgo les Broteaux. V.

Desc. similis eph. vulgaræ , sed minor & corpore fusco.

Vespertina. 4. E. (la noire) cauda trifeta , alis nigris , inferioribus albis. *

It. Oel. 21.

Geoff. paris. 2. p. 139. n. 4.

Fab. 4.

Hab. in Europæ aquosis.

Desc. Est inter minores generis sui , tota

corpore & alis superioribus nigra; solæ
alæ inferiores albæ, quibus ab om-
 nibus generis seu speciebus manifeste
 differt. *Faun.* 1480.

Obs. Ephemerarum ultima transformatio
 extra aquas. Ante hanc *alæ inferiores*
 albæ, post ultimam transformationem
 nigrae. Inde diagnosi *Linnaei* emendari
 debet. V.

Ex spec. D. Fab.

Halterata. 5. E. (la ceinture) cauda trifeta fusca,
 abdomine albido, alis duabus albis.
Fab.

De Geer tom. 2. p. 650. t. 17. f. 17, 18.
 cincta fusca, abdominis medio albo,
 oculis 4 maris, cauda trifeta.

Hab. Kilicæ ad aquas stagnantes frequens.
Ibid. In Bressia. V.

Obs. *Alæ inferiores* breves & quodam
 modo dipterarum halteribus similes.
Oculi quatuor reticulati. Stemmata
 tria. V.

Ex Faun. Fridr.

Danica. 6. E. (la Danoise) alis pallide aureis
 maculatis.

Hab. in Europa. In paludibus. *Vulgata*
 major.

** *Cauda bifeta.*

Bioculata. 7. E. (la tuberculée) cauda bifeta, alis
 albis reticulatis, abdomine diaphano. *

Fab. 7. alis albis reticulatis, capite tu-
 berculis duobus luteis.

Geoff. tom. 2. p. 239. n. 5. t. 13. f. 4.
teste Fab.

Faun. Fridr. n. 556.

Hab. in Europæ aquosis.

*Obs. 1. synonymia D. Fab. An vera ?
Ephemera D. Geoff. tuberculiscaret. V.*

Desc. Caput minimum. Tubercula duo lentiformia, elevata, lutea, oculis multo majora, pellucida oculis incumbentia. Thorax compressus, supra nebulosus. Abdomen cylindraceum, albo diaphanum, ultimis articulis subfuscis. Cauda duabus fetis rectis, corpore ipso duplo longioribus, albis: intra has duæ fetæ brevissimæ, incurvæ. Pedes nivei, quorum anteriores longiores. Alæ erectæ, albæ, opalo-incarnato parum nitentes, reticulatæ. Faun. 1473.

Obs. 2. Alæ, ut totum corpus, pallide flavescences, sed in pluribus aliis speciebus opalo-incarnato nitentes. V.

Fuscata. 8. E. (la brunette) cauda bifeta, corpore fusco, alis segmentisque abdominis variis albis. *

Faun. Fridr. n. 557.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. aquis. V.

Desc. Caput, thorax, abdominis primum & quatuor ultima segmenta fusca. Alæ albæ; secundariæ minutæ. Spiracula abdominis fusca. Pedes albi, antici duo longissimi. Ungues fusci. Gibberes oculares magni, flavi. Antennæ breves albæ. Caudæ fetæ duæ, albæ, abdomine breviores. Faun. 1474.

Nigra. 9. E. (la noire) cauda bifeta, corpore nigro, alis nigricantibus, inferioribus minimis.

Fab. 3.

Enum. n. 606.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 780.

Hab. in Europa. In Galliæ aquis. V.
Desc. Magnitudo culicis, tota nigra. *Pedes*
 pallidiores. *Alæ inferiores* adeo parvæ
 ut vix conspectum fubeant. *Alarum*
 margo tenuior subciliatus. *Faun.* 1478.

Culicifor- 10. F. (la Culiciforme) cauda bifeta , alis
mis. albis , corpore fusco. *

Poda inf. t. 1. f. 10.

Geoff. parif. 2. p. 240. n. 6.

Fab. 10.

Hab. in Europæ aquosis.

Desc. Culice paullo major. *Thorax* nigricans. *Abdomen* fuscum. *Setæ* caudæ longitudine corporis. *Tubercula* 2 supra oculos, crassa, magna, livida. *Faun.* 1475.

Horaria. II. E. (l'Éphémère) cauda bifeta , alis
albis margine craffiore nigricantibus.*

Swamm. quart. 87. ephemera minima.

Geoff. parif. 2. p. 240. n. 8.

Feb. 9.

Ad. Ups. 1736. 27. 3.

Hab. in Europæ aquis.

Desc. *Alæ* albæ, margine crassiore fusconigricante. *Cauda* duabus setis armata, absque ullis parvis interjectis. *Pedes* albi, exceptis primis majoribus magis fuscis. Supra oculos *tubera* duo oculis majora, fusco-purpurea. *Abdomen* cinerascens, segmentorum marginibus albis. Habet quasi sex oculos, tubera scilicet duo majora descripta, oculos duos compositos, ad horum tuborum latera oculos duos alios minimos ante tubera positos.

Circa vesperam evolans ex aquis, tecum
ferentes tunicam puppulae, quam de-
ponunt, ubi primo quiescunt, albam;
sic fenestras & navigantium vestes

tunicis his adspargunt; vivunt tantum per noctem, moriuntur insequente hora matutina omnes. Magnitudo muscæ domesticæ minoris. *Faun.* 1476.

Striata. 12. E. (la striée) cauda bifeta, alis hyalinis striatis, thorace fusco, abdomine albo.

Geoff. paris. 2. p. 240. n. 7. thorace fusco, abdomine albo, cauda bifeta, alis fuscis striatis.

Fab. 11.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. Alæ hyalinæ, sed vasis minime reticulatis. Cauda setis longis caret; capitis tubera oculis minora sunt in hac specie. Mas corpore pelliculo, thorace nigricante. Fæmina corpore opaco-subrufescente. In congressu cohærent perfecte uti libellulæ. *Faun.* 1479, sub nomine ephemeræ muticæ.

Diptera. 13. E. (la diptere) cauda bifeta, alis duabus, costâ marginali fusca cinereo maculata. *

Fab. 12.

De Geer tom. 2. p. 656. t. 18. f. 5.-10. alis duabus griseo-fuscis, abdomine lineolis rubris, cauda bifeta, alarum fæminæ margine exteriori fusco, maculis albis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Alarum costâ nigricans velut characteribus albidis inscripta.

Inferiores alæ vix existunt. *Faun.* 1477.

Obs. Singulare insectum inter hujus familiæ insecta. Alæ inferiores vix existunt, inquit celeb. *Linn.* sed oculis lente armatis invisibiles, inde vera diptera. V.

Ex op. D. de Geer.

Nervosa. 14. E. (la nerveuse) fusco-grisea , abdomine subtus griseo , alis pellucidis nigro-nervosis , cauda bifeta. *Retz.* 183. - *De Deer* tom. 2. p. 652. t. 18. f. 1. - 4.

Tab. 6.

Hab. in Daniæ aquosis.

Desc. Alæ diaphanæ immaculatæ , nervis nigris. V.

Ex enum.

Speciosa. 15. E. (la belle) cauda bifeta , corpore triplo fere longiore , pedibus anticis longissimis cyaneis , alis albis , corpore fusco. *Poda gr.* p. 98.

Hab. ad loca aquosa. In Bressiæ aquosis. V.

Flava. 16. E. (la dorée) flava cauda bifeta lutea , alis posticis minimis. *Beytr.* *Zur. Nat.* p. 82. 6. 39.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 239. n. 5. t. 13. f. 4. lutea , alis albis reticulatis , cauda bifeta.

Hab. in locis uliginosis.

Obs. Bono jure citatur hæc eph. D. *Geoff.* nam ad ephemeram bioculatam non referenda , carens tuberculis. V.

Ex nost. Mus.

Maculata. 17. E. (la tachetée) alis hyalinis transverse maculatis. Cauda longissima annulata , trifeta. t. 6. f. 3.

Hab. in Bressiæ stagnis.

Desc. Inter magnas numeranda. Speciebus descriptis differt & maculis parvis nigris in alis superioribus transverse dis-

positis & cauda corpore duplo majore,
albida, annulis parvis interfecta.

Ex ent. carn.

Gemmata. 18. E. (la perlée) tuberculis tribus frontalibus, diaphanis, crystallinis, nigro punctatis, corpore rufo, cauda bifeta.
Hab. circa aquæductus fodinarum Idrien-
num.

Obs. Hæc & sequentes caudam bifetam gerunt.

Desc. *Incisuræ* abdominis marginibus flavicantibus. *Setæ caudales*, unciales.

Albipes. 19. E. (l'albipede) fusca, oculis rufescentibus, pedibus albidis.

Hab. in aquolis. In Bressiæ aquis. V.

Desc. *Oculorum* ambitus pallidior. *Alæ* villosulæ. *Setæ caudales* albidæ; corpore duplo longiores.

Parvula. 20. E. (le demi-deuil) alba, capite, thorace abdominisque apice nigris.

Hab. in paludolis Majo M. In Bressia. V.

Desc. *Oculi* rufi. *Alæ* hyalinæ. *Setæ abdominales* alis duplo longiores, albæ.
Abdomen pellucens.

Obs. Omnium ephemerarum vita brevis non est; sola sere species quæ esca piscium & inter congeneres præstantissima, inter solis occasum & ortum nascitur & moritur; inde huic speciei generis nomen applicavi. V.



GENUS III.

PHRYGANEÆ. Os edentulum, palpis IV.
Stemmata III.

Antennæ thorace longiores.

Alæ incumbentes, inferioribus plicatis.

* Cauda aristata, setis 2 truncatis (Perlæ Geoff.)

Bicaudata. 1. P. (la double queue) cauda bifeta,
alis venoso-reticulatis. t. 7. f. 4.

Scop. carn. 705. phryganea maxima.

Wagn. Helv. 227, 228, 229.

Reaum. inf. 3. t. 13. f. 12.

Sulz. inf. t. 17. f. 6.

Geoff. paris. 2. p. 231. t. 13. f. 2.
perla 1.

Fab. semblis 6. cauda bifeta, setis longitudine corporis.

Ad. Upsal. 1736. 27. 1.

Enum. n. 607.

Poda gr. p. 99.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 784.

Hab. in Europæ aquosis. Ova unita sub
ventre circumfert, ut aranea. Scop.

Desc. Variat admodum magnitudine. Alæ
oblongæ, incumbentes, non deflexæ,
antrorsum angustatæ, albæ, venis
fuscis admodum reticulatæ. Cauda
duabus setis antenniformibus & anten-
narum longitudine gaudet. Faun. 1489.

Phryganeæ Larvæ latent sub aqua intra tubos cylindricos mobiles,
a se constructos; declarata choicæ vespertinæ in aere instituunt;
piscantur ab hirundinibus.

Perlæ utrum genere differant a phryganeis, nec non, determinabit
metamorphosis.

perla 1. 150, 159.

Nebulosa. 2. P. (la nébuleuse) cauda bifeta , alis subcinereis.

Geoff. parif. 232. perla 3.

Fab. semblis 7. cauda bifeta , fetis truncatis abbreviatis.

Enum. n. 610.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 787.

De Geer t. 2. p. 730. *t. 23. f.* 16 , 17. pseudo-phryganea , corpore oblongo-ovato , alis elongatis cinereis , nigro-venosis.

Hab. in Europa.

Desc. Insectum oblongum , angustum , subcylindraceum dum alis suis vestitum. *Antennæ* setaceæ , longitudine corporis , non vero alarum. *Thorax* minus latus & marginatus. *Cauda* terminatur duabus fetis truncatis , brevissimis. *Corpus* totum atrum , exceptis solis alis. *Alæ* incumbentes in figuram semicylindricam , subcinereæ , maculis seu fasciis albidis , hinc inde interlucen- tibus , vix tamen manifestis ; suprema ala nervis tribus , versus marginem tenuiorem extensis , valde reticulata est ; reliqui nervi non ita reticulati sunt. Macula nulla in clypeo thoracis , sed duo velut ulcera coalita. *Faun.* 1499.

Obs. Fascias albas a *Linn.* citatas *D. Geoff.* non vidit , sed si phryganeam hanc lumi- ni exponas , oculo lente armato , statim conspicuæ sunt. V.

Phalænoi- 3. P. (la phalénoïde) nigra , alis albidis , maculis nigris sparsis. *

Uddm. diss. 53. *f.* 16. phryganea nigra , alis albo - pallidis , maculis plurimis nigris.

Fab. semblis 5.

Faun. Fridr. n. 558.

Hab. in Europa.

Desc. Speciosior & major omnibus notis Europæis hujus generis. *Corpus* nigrum. *Antennæ* corpore dimidio breviores. *Alæ* albidæ, concolores. *Superiores* maculis adspersæ plurimis nigris, ad marginem posticum in ordine digestis. *Inferiores* albæ, margine postico fascia nigra, margine vero laterali inferiori maculis nigris. *Faun.* 1481.

Ex entom. carn.

Grammatica. 4. P. (la Turque) flava. linea lunata nigra fronti inscripta, abdomine bifeto.

Podæ gr. p. 99.

Enum. n. 608.

Geoff. tom. 2. p. 230. *n.* 2. *an?*

Hab. in Europæ aquis. In Gallia Aust V.

Desc. *Alæ* hyalinæ, albidæ, in maculatæ, antennis longiores. *Antennæ* basi flavæ, extrorsum fuscæ. *Oculi* nigri. *Abdomen* super a nigricans, foveis caudatibus longius. *Scutellum* tuberculis binis.

Tripunctata. 5. P. (la triponctée) flava, tuberculis tribus frontalibus oculisque nigris, abdomine bifeto.

Hab. frequens in vitibus. In Gallia Aust. V.

Desc. Diverfa a priore, statura, colore homogeneo defectu lunulæ frontalis.

Obs. Ab acaro *phryganeæ* frequenter infestatur.

Ex enum.

Uncinata. 6. P. (la crochue) alis deflexis fuscis, cano maculatis, cauda uncis duobus subcapitatis.

Hab. in Europa. In Luftenberg Austriae Superioris Dynastia.

Desc. Insectum ferrugineo-fuscum. Antennæ longæ, fere corpore longiores, attenuatæ. Caput, thorax, alæ superiores, omnia hæc pilosa sunt, fusca cinereoque variegata. Abdomen terminatur utrinque corpore corneo, incurvato, cornu tauri more, sed apice subclavato truncato.

Ex nost. mus.

Flavicornis. 7. P. (la flavicorne) antennis luteis, alis superioribus lutescentibus, inferioribus fuscis.

Ræf. aqu. 2. t. 14 ?

Hab. in Europa. In montibus Cebennis.

Desc. Affinis phr. Ræf. Antennæ lutæ, alarum superiorum longitudinem æquant. Caput & thorax hirsuta, uti in D. Fab. phr. pilosa. Alæ superiores fusco - flavescens. Inferiores fuscæ, margine interiore valde ciliatæ. Cauda brevissima.

*** Cauda mutica.*

Reticulata. 8. P. (la réticulée) nigra, alis subferrugineis atro reticulatis. *

Fab. 1.

Enum. n. 618.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 785.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Hæc magis terfa, quam reliquæ species.

Desc. Media. Statura phalænæ. Alæ superiores subferrugineæ, venis atris reticulatæ; ad angulum ani macula nigricans. Inferiores subferrugineæ, fascia nigra, margine postico nigri-

cante e maculis confluentibus acutis.
Faun. 1482.

Obs. Alarum situ & nescio quis habitus
 phal. *quercifoliae*. *Pigerrima*. *Enum.*

Striata. 9. P. (la striée) nigra , alis testaceis
 nervoso-striatis. *

Scop. carn. 688.

Alb. inf. 763.

Frisch. inf. 13. t. 3.

Reaum. inf. 3. t. 13. f. 8, 9. 11.

Geoff. paris. 2. p. 246. n. 1. t. 13. f. 5.

Fab. 2.

Ad. Ups. 1736. 27. 2.

Aldrovand. inf. 763.

Faun. Fridr. n. 559.

Raj. inf. 247. 2. **274. 2.**

Hab. in Europa.

Desc. Fascies phal. majoris. *Antennæ*
 antrorsum porrectæ, longitudine cor-
 poris. *Alæ* magnæ, latæ subtestaceæ
 five fusco-testaceæ, venis aliquantu-
 lum ramonis striatæ, minime autem
 ullo in puncto reticulatæ. Punctum
 album postice in ala superiore. *Caput*
 fuscum. *Faun.* 1483.

Grisea. 10. P. (la grise) grisea , alis superioribus
 nebulosis , macula marginali nigra.

Fab. 11.

De Geer tom. 2. p. 543. t. 13. f. 18.-21.
 antennis longitudine corporis, grisea,
 punctis maculisque nigricantibus, alis
 superioribus postice rotundatis, angulo
 exteriori linea nigra.

Hab. in Europæ aquis. In Gallia Aust. V.
Larva involucrum cylindricum e culmis
 juncorum graminumque construit &, ut
 ad metamorphosin perveniat, utrasque
 extremitates filis sericeis reticulat. V.

Desc. Mediæ magnitudinis est. *Alæ* incumbentes, postice compressæ. *Superiores*, (uti totum corpus) griseæ, fusco obsolete nebulosæ, in quarum medio juxta marginem inferiorem seu crassiorem nigra macula. *Faun.* 1484.

Grandis. 11. P. (la grande) alis cinereo-testaceis, lineolis duabus longitudinalibus nigris, puncto albo. *

Reaum. inf. 3. t. 14. f. 4?

Raf. aqu. 2. t. 17.

Fab. 8. alis fusco - testaceis, cinereo-maculatis.

De Geer tom. 2. p. 527. t. 13 f. 1.-17. antennis longitudine corporis, alis cinereo - testaceis, maculis cinereis, linea longitudinali nigra punctisque duobus albis.

Faun. Fridr. n. 561.

Sulz. inf. t. 24. f. 9.

Schæff. icon. t. 109. f. 3, 4.

— t. 180. f. 1, 2.

Hab. in Europa, intra cylindricum ex ramis longitudinalibus ligneis.

Desc. Magna. *Alæ* testaceo-cinerascentes, lineis in superioribus alis duabus longitudinalibus eademque serie dispositis, & singulis albo puncto notatis. *Antennæ* longæ, antrorsum porrectæ. *Faun.* 1485.

Rhombica. 12. P. (le Rhombe) alis flavescensibus deflexo-compressis, macula rhombea laterali alba. *

Reaum. inf. 3. t. 14. f. 5.

Raf. inf. 2. *aqu.* 2. t. 16.

Phryganæ minores a phalænarum tincis minoribus distinguuntur palpis, quibus carent phalænæ.

Geoff. paris. 2. p. 246. n. 2.

Fab. 10. alis griseis, macula laterali rhombica alba.

Enum. n. 612.

Schæff. elem. t. 100.

— *icon. t. 90. f. 5, 6.*

Faun. Fridr. n. 52.

Hab. in Europæ aquis, intra nidum ex ramentis gramineis transversis.

Desc. Alæ magnæ, pellucidæ (quas gerit ut phal. nasutæ) deflexo-compressæ, sublutæ sive griseæ; in medio alæ exterioris macula rhombea albida obliqua & pone hanc alia albida vix notabilis. Corpus testaceum, uti antennæ & pedes, supra & pone maculam alarem aliquid fusci. Est hæc inter majusculas sui generis. Faun. 1486.

Obs. 1. Alas gerit valde compressas, præter maculas albas, a Linn. & Geoff. memoratas, etiam apex albidus est. Enum.

Obs. 2. Variat colore defectuque albedinis in apice. Enum.

Bimaculata. 13. *P. (la bimaculée) alis fuscis, macula laterali duplici flava. **

Fab. 3.

De Geer tom. 2. p. 568. t. 15. f. 1.-10. antennis longioribus, alis fuscis, maris cinereo fasciatis, foeminæ macula grisea.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 248. n. 5.

Hab. in Europæ aquosis.

Larva intra cylindrum attenuatum ex arena lutoque confectum. Fab. De Geer.

Desc. Minor, non autem inter minimas. Alæ fusce. In medio alarum macula duplex lunularis flava, altera pone

alteram. Animal antice angustatum.
Faun. 1487.

Flavilatera. 14. P. (la dilatée) alis reticulatis , cauda inermi , thoracis lateribus flavis. *

Geoff. parif. 2. p. 255. hemerobius 3.

Hab. in Europæ aquis.

Desc. Sedet alis deflexis uti phalæna , vel potius phalæna *quercifolia*. *Alæ* subcinereæ , reticulatæ , venis fuscis maxime reticulatis , præsertim ad marginem anteriorem , qui admodum dilatatur. *Corpus* totum nigricans. *Antennæ* corpore dimidio breviores. *Cauda* simplex , absque stilibus prominulis. *Os* duobus denticulis & quatuor a palpis. *Collare* antice & postice , non ad latera flavescens. *Faun.* 1488.

Nigra. 15. P. (la noire) alis cæruleo-atris , antennis corpore duplo longioribus. *

Raj. inf. 275.

Geoff. parif. 2. p. 250. n. 10.

Fab. 14. alis nigris , antennis longissimis.

Entom. carn. 696. an ?

Faun. Fridr. n. 563.

De Geer tom. 2. p. 580. t. 15. f. 21. 22. antennis longissimis s. corpore duplo longioribus , palpis longis villosis , alis cæruleo-atris , oculis rubris.

Hab. in Europa.

Desc. *Alæ* nigrae seu atræ cum cærulei vel virescentis mixtura , margine dorsali in medio villoso. *Antennæ* corpore duplo vel triplo longiores , nigrae. *Pedes* cinereo-nigri. Magnitudo muscæ domesticæ quoad alas. *Faun.* 1490.

Obs. In *syst. nat.* hemerobium n. 10.

D. Geoff. bis citavit clar. *Linnæus* : 1°. inter phryganeas n. 11 ; 2°. inter

hemerobios *n.* 12. *idem.* apud *D. Fab.*
hoc exemplum non secutus est *D. de*
Geer & optimo jure ; nam in phryg.
D. Geoff. *n.* 10. alæ albæ sunt , sed
caeruleo-nigræ in phryg. *nigra syst.*
inde citatio emendanda. V.

Azurea. 16. P. (l'azurée) alis nigris , postice
violaceis. *

Fab. 15.

Hab. ad aquas Europæ.

Desc. Musca minor. Alæ nigræ : sin-
gulæ V. fusco diviso , ita tamen ut
divaricatio litteræ posteriora respiciat ,
in qua color azureus locatus. *Faun.*
1491.

Ciliaris. 17. P. (la ciliée) nigra , abdomine utrin-
que linea alba , tibiis posticis pallidior-
ibus , antennis mediocribus. *

Faun. Fridr. *n.* 565.

Fab. pusilla an ?

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Thorax pilosus. Abdomen utrinque
linea longitudinali pallida. Alæ , im-
primis ad marginem , ciliatæ. *Faun.*
1497.

Obs. Conf. disc. *D. Fab.* corpus parvum ,
obscurum. Antennæ longitudine cor-
poris , annulatæ. Alæ anticæ testaceæ ,
ciliatæ , posticæ magis fuscæ.

Marginata. 18. P. (la bordée) nigricans , alis mar-
gine omni flavo.

Fab. 16.

Hab. in Suecia. *Th. Bergman.*

Corpus nigrum , magnitudine culicis.
Thorax vellere testaceo. Alæ nigræ ,
cinctæ margine luteo. Pedes testacei.

Longicornis.

Longicornis. 19. P. (la longicorne) alis superioribus nebulosis , antennis corpore triplo longioribus. *

Geoff. paris. 2. p. 249. n. 7.

Fab. 21. alis fuscis , strigis duabus undatis obscurioribus , antennis longissimis.

Hab. in Europâ.

Desc. Magnitudo majoris culicis. *Alæ superiores* pallido - griseæ , maculis fuscis ; *inferiores* canæ , margine piloso. *Antennæ* albidæ , corpore triplo aut quadruplo longiores. *Faun. 1492.*

Filosa. 20. P. (la filiforme) alis cylindrico-incumbentibus flavescentibus , antennis corpore triplo longioribus.

Fab. 23 ? alis rotundatis , fuscis , immaculatis , antennis corpore triplo longioribus.

Faun. Fridr. n. 564.

Hab. in Suecia. In Gallia Aust. prope Lugdunum. V.

Desc. præcedenti multo major. Pallidolutescens. *Antennæ* longissimæ , sed nec albo fuscoque annulatæ , nec in articulo primo pilosæ ut in desc. *D. Fab.* Inde dubium. *V.*

Wæneri. 21. P. (la Suédoise) cinereæ , alis posticis pallidioribus , margine interiore piloso albido. *

It Wgoth. 44.

Hab. in Europâ , frequens ad lacum Wænerum Sueciæ.

Albifrons. 22. P. (le front blanc) nigra , alis exterioribus strigis linearibus quatuor albis. *

Hab. in Suecia. T. Bergman. In Bressiæ aquis. V.

Desc. Tota nigra, magnitudine culicis. Frons alba. Antennæ mediocres. Alæ superiores lineola transversa alba marginis tenuioris versus basin; duæ lineolæ in medio quasi ex una transversa interrupta; una obliqua versus apicem ad marginem crassiolem. Faun. 1495.

Obs. In nostris antennæ corpore paullo longiores. V.

Bilineata. 23. P. (la bilinéaire) nigricans, alis superioribus utroque margine lineolis duabus transversis albidis.

Fab. 18.

Hab. in Europa. In Bressiæ aquis. V.

Desc. Parva non minuta. Antennæ corpore longiores. Alæ obscuræ. V.

Fusca. 24. P. (la brune) fusca immaculata, alis inferioribus hyalinis. *

Fab. 4. alis anticis fuscis immaculatis, pedibus flavis.

Faun. Fridr. n. 566.

Hab. in Europa. In aquis montium Galliæ Aust. V.

Desc. Parva, oblonga, cylindrica, tota fusca. Alæ venosæ, minime maculatæ, corpore longiores, nitidiusculæ. Cauda absque setis. Antennæ corpore paullo breviores. Abdomen subtus atrum, supra pallidum, lateribus utrinque maculis septem nigris. Faun. 1500.

Obs. D. de Geer a D. Fab. citatus fuit. Phryganea fusca, antennis corporis longitudine, pedibus luteis, macula alba, alarum nervis albo nigroque variis, quæ verba indicant phryganeam

descriptam. tom. 2. p. 548; sed phr. *D. de Geer* inter magnas hujus generis, uti delineatione adparet: phryg. vero *syst.* inter parvas numeratur. Insuper ad phryg. *Linnaei* non retulit *D. Retz.* p. 56. Diversa igitur species videtur. V.

Flava. 25. P. (la jaune) alis flavo-reticulatis, antennis longitudine abdominis.

Faun. Fridr. n. 568.

Hab. in Europa. In aquis propre Lugdunum. V.

Desc. Colore facile ab aliis distinguitur.

Antennæ porrectæ, luteæ, uti tota phryganea. V.

Umbrosa. 26. P. (l'obscure) nigra, alis superioribus lutescenti-nebulosis. *

Hab. in Europa, ad aquas.

Desc. Magnitudo culicis. *Antennæ* longitudine corporis. *Corpus* nigrum. *Alæ superiores* fuscae, irroratae glaucofuscescente colore. *Inferiores* nigrae.

Faun. 1498.

Minuta. 27. P. (la petite) nigra, palpis villosis capite longioribus. *

Fab. 24. fusco cinereoque variegata, palpis villosis.

Faun. Fridr. n. 567.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* longitudine corporis. *Palpi* duo superiores capite longiores, nigri, inferiores vero albidi. *Pedes* pallidi.

Faun. 1501.

Saltatrix. 28. P. (la sauteuse) alis hyalinis, macula viridi albaque, antennis longioribus. *

Hab. in Europa. In Bresliæ aquis. V.

Desc. Minima est & saltatrix. *Corpus*

culice minus, fuscum. *Antennæ* corpore longiores, lente inspectæ villosæ adparent. *Os* ut in reliquis cum palpis, (adeoque non chermes) accedit enim figura ad chermem alis. *Alæ* corpore longiores, versus corpus pone compressæ, aqueæ, macula subviridi & alba, versus marginem inferiorem venis nigris, versus superiorem venis albis. *Faun.* 1503.

Ex entom. carn.

Albicornis. 29. P. (l'albicorne) fusca, antennis longis albis.

Enum. n. 619.

Hab. in Europa. In Bressiæ aquis. V.

Desc. Magnitudo media. *Alæ anticæ* albidæ, sed apices testacei. *Antennæ*, quæ corporis longitudinem æquant, albidæ. V.

Rufierus. 30. P. (la tuberculée) fusca, collo bituberculato flavo.

Enum. n. 614.

Hab. in aquis fluentibus.

Desc. *Collum*, quod caput thoraci adnectit, eleganter flavum, tuberculis binis elevatis. *Femora* flava. *Enum.*

Ferruginea. 31. P. (la rouillée) ferruginea tota, alis anticis fusco obiterque reticulatis, oculis nigris.

Hab. in sylvis, secus aquas, Majo M. In Bressia. V.

Desc. *Abdomen* punctis nigris lateralibus tot, quot ejus segmenta. Sexus alter maculam albidam rotundam communem punctaque alba 5, 6 in margine externo alarum anticarum gerit.

Variegata. 32. P. (la bigarrée) alis anticis flavis ,
punctis ferrugineis. t. 7. f. 5.

Fab. 17. alis fuscis testaceo irroratis.

Enum. n. 621.

Hab. in aquosis & circa torrentes. *Ibid.*

In montibus Gebennis. V.

Desc. *Antennæ* longitudine fere alarum
superiorum , ferruginæ. *Oculi* , *corpus* ,
femora nigricantia. *Caput* villis ferru-
gineis pubescens. *Tibiæ* ferruginæ.

Bimacula- 33. P. (la bimaculée) alis anticis testaceis ,
ta. nitidis , macula fusca marginali.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. *Corpus* fuscum. *Antennæ* pedesque
alarum superiorum colore. Macula
harum dicta infidet margini superiori
versus apicem. *Alæ posticæ* hyalinæ.
Abdomen linea albida laterali.

Tineoides. 34. P. (la tinéoïde) alis anticis fusco-
ferrugineis , antennis corpore triplo
& ultra longioribus , fuscis , albo an-
nulatis.

Hab. in plantis lacustribus Junio M. non
rara. *Ibid.* In Bressia. V.

Desc. *Phr. longicornis* Linn. huic minime
aptari potest. Nostra *phal. tineam* ,
longissimis antennis , exacte refert.
Alæ posticæ fuscae. *Pedes* alis anticis
concolores. *Corpus* fuscum , tres
lineas longum.

Obfuscata. 35. P. (l'obscure) fuscescens tota , pedibus
ferrugineis.

Hab. Circa lacus & fontes , primo vere.
In monte vulgo Pila. V.

Desc. *Antennæ* crassiusculæ , nigricantes ,
alis breviores.

Fuliginosa. 36. P. (la fuligineuse) supra lucida nigra ,
 alis subtus fuscis , antennis nigris albo
 annularis , pedibus albidis.

Hab. in Europa , circa aquas. In Bressia. V.

Desc. Corpus nigrum , lin. 2 $\frac{1}{2}$ longum.

Alæ nigræ , sed cæruleo quodam aut
 viridi transluciente colore , ut ideo non
 male ad *phr. nigram* Linn. reduci
 posset.

Obs. Videtur species propria : etenim
 margo dorsalis in medio non vil-
 losus. V.

Testacea. 37. P. (la testacée) fusco - testacea , alis
 fimbriatis , posticis fuscescentibus.

Hab. in Europa , prope aquæductus. Circa
 Lugdunum. V.

Desc. Habitus alarumque fimbria , ut in
phal. tineæ. *Pedes* subferruginei. *Corpus*
 alis anticis duplo brevius.

Pyralina. 38. P. (la pyraloïde) alis fusco-hyalinis ,
 pedibus ferrugineis.

Hab. in Europa , passim circa rivos , fontes ,
 paludes. Prope Lugdunum. V.

Obs. Noctu cubilibus involat copiose
 & avidè lumen appetens. Hinc alia die
 in lucernis nocturnis immersæ plurimæ
 reperiuntur.

Dubia. 39. P. (la douteuse) antennis deflexis
 pectinatis , corpore nigro tomentoso.

Poda. mus. gr. p. 102. tenthredo hirsuta.

Hab. in Europa.

Desc. prodierunt mihi tres ex eo cylindro
 quo *phr. rhombyca* Linn. An est proles
 hybrida *phalænæ bombycis* ? Sed *alæ*
pilosæ lepidoptero nulli. Nigra est &
 valde tomentosa. *Alæ* nigricantes pi-
 losæ , deflexæ ; *posticæ* plicatæ. *Os* valde

barbatum, aut palpos occultat, aut palpi sunt ita lanati, vel nulli prorsus.

Pectinicorn- 40. P. (la pectinée) antennis deflexis pectinatis, alis & dorso canescentibus, abdomine ferrugineo.

Hab. in Europa.

Desc. Fascies prioris, sed non nigra, major. *Thorax* magis tomentosus. *Natæ* mihi duæ ex eo cylindro, unde *phr. grandis Linn.*

Martia. 41. P. (la précocé) alis incumbentibus, hyalinis, immaculatis, venulis fuscis, corpore fusco, pedibus testaceis.

Hab. in aquæductibus Idrienſibus, M. Martio circumvolans.

Desc. *Antennæ* nigræ, alarum longitudine. *Frons*, tuberculis tribus. *Thorax*, linea depressa, transversa, antica, sub qua foveolæ nonnullæ. *Palpi*, colore pedum. *Abdomen* muticum, *subtus* fusco-testaceum.

Regelatio- 42. P. (la pressée) tota nigra, alis fuscescentibus, incumbentibus, hyalinis.

Hab. in Europa, circa fluvios volitat etiam M. Februario. In Bressia M. Martio capta. V.

Desc. Inter caput & thoracem *plica* transversa pallida. *Abdomen* muticum, supra *plicæ prædictæ* concolor.

Ex spec. D. Fab.

Analys. 43. P. (la marquée) alis fuscis, macula anali alba, nucha hirta aurea.

Hab. in Europa Boreali, Suecia.

Desc. *Caput* & *antennæ* nigræ. *Nucha* recta hirsutæ aurea. *Alæ* fuscae, puncto albo ad angulum ani.

Pilosa. 44. P. (la velue) alis testaceis immaculatis, capite thoraceque hirtis.

Hab. in Sueciæ aquosis. In Bressia. V.

Desc. Corpus totum cum alis pilosum.

Pallipes. 45. P. (la pallipede) alis omnibus nigris, immaculatis, pedibus pallidis.

Hab. in Italia Dr. Allioni. In Gallia Aust. circa Nemausum ad rivum vulgo le Viste.

Desc. Triplo minor phr. fuscæ. Antennæ mediocres, uti totum corpus fuscæ, immaculatæ. Pedes pallidi.

Interrupta. 46. P. (l'interrompue) nigra, alis fuscis, fasciis quatuor niveis, anterioribus interruptis, posteriori marginali punctata.

Entom. paris. 17.

Hab. in Angliæ aquosis.

Desc. Statura phr. bilineatæ. Antennæ corpore longiores, albo nigroque annulatæ. Caput & thorax nigra, palpis pallidis. Alæ anteriores fuscæ, fasciis tribus interruptis niveis margineque postico albo punctato. Posteriores cinereæ. Pedes pallidi.

Hirta. 47. P. (la hérissée) fusca, alis anticis hirtis, antennis longitudine corporis.

Hab. Oxoniæ Anglorum. In Bressia. V.

Desc. Media. Antennæ longitudine corporis, albæ, fusco annulatæ, primo articulo longiori hirtis. Caput & thorax fusca, immaculata, hirta. Alæ anticae rotundatæ, hirtæ, fuscæ, maculis duabus obscurioribus obsoletis, altera ad marginem tenuiorem, altera in medio alæ. Alæ posticae glabræ, fuscæ. Pedes pallidi.

4-Fasciata. 48. P. (la quadrifasciée) nigra, alis

testaceis, fasciis quatuor nigris, antennis longissimis.

Hab. in Angliæ aquosis. *Ibid.* In Bressia. V.

Desc. *Antennæ* longissimæ, albo nigroque annulatæ. *Caput*, *thorax* & *abdomen* nigra. *Alæ* obscure testaceæ, fasciis quatuor latis nigris, quarum postica terminalis. *Pedes* pallidi, femoribus posticis nigris.

Viridis. 49. P. (la verdâtre) e caudata virescens, thoracis margine tenuissime nigro, semblis 9. *Mantiss. tom. 1. p. 244.*

Hab. Hafniæ. D. Lund.

Desc. Parva in hoc genere. *Antennæ* fere longitudine corporis, fuscæ, basi virescentes. *Caput* virescens, stemmatibus tribus oculisque nigris. *Thorax* marginatus, virescens, margine tenuissime nigro. *Abdomen* cylindricum, virescens. *Alæ* corpore duplo longiores, virescenti-hyalinæ, immaculatæ. *Pedes* virescentes.

Ex Enum.

Lineola. 50. P. (la linéaire) alis superioribus flavescens, margine interiori fusco, inferioribus hyalinis, linea prope apicem fusca.

De Geer tom. 2. p. 543. t. 13. f. 18.-21. an?

Hab. in Europa. In Austria.

Desc. *Corpus* ferrugineum, etiam *alæ superiores*, quas deflexas gerit, sed hæ margine interiori fuscæ, non tamen toto. *Alæ inferiores* hyalinæ, apice, non procul margine exteriori linea longitudinali fusca. *Antennæ* longæ, antrorsum porrectæ.

Obs. Varietas occurrit etiam habens alas superiores punctis nigris copiosis confitas.

Collaris. 51. P. (le collier) fusco-ferruginea tota , immaculata.

Hab. in Europa. In Austria.

Desc. Phr. *ruficruri* simillima , dentis coloribus defectuque tuberculi duplicis in collo diversa ; *collum* tamen distinctum caput inter & thoracem.

Digitata. 52. P. (la digitée) alis testaceis fusco maculatis , venis manifestis , post medium inter se anastomosantibus.

Hab. in Europa. In Austria. In Bressia. V.

Desc. Ferruginea. *Oculi* nigri aut brunnei.

Alæ superiores magis fuscae , maculis adhuc magis fuscis variegatae. *Venæ* manifestae , post medium omnes per paria anastomosant , ita , ut anastomoses constituent lineam aliquam curvam continuam , postquam excurrentes denuo aliae *venæ* constituunt , cum interjectis areolis , alas apice quasi digitatas.

Bicolor. 53. P. (la bicolor) ferruginea , alis anticis fuscis , linea longitudinali lata maculaque flavis.

Hab. in Europa. In Austria.

Desc. Tota ferruginea. *Alæ anticae* fuscae , in medio earum , a basi ad apicem , linea flava lata & ad marginem externum prope apicem macula ejusdem coloris.

Ex Faun. Fridr.

Nitida. 54. P. (la brillante) alis deflexo-compressis , pellucidis , posticarum medio linea longitudinali nigra.

Hab. in Europa. In hortis.

Occulta. 55. P. (la cachée) alis deflexo-compressis, flavescentibus nitidis, posticis punctis duobus marginatis.

Hab. in Europa, juxta amnes.

Ex inf. parif. ent. que parif.

Plumbea. 56. P. (la plombée) atra, alis plumbeis, pedibus fulvis.

Hab. in Europa.

Desc. Phr. *rhombicæ* affinis, sed paullo minor. *Antennæ* longitudine corporis, nigrae. *Caput*, *thorax*, *abdomen* supra etiam nigra. *Pedes*, incisuræ *abdominis* infra luteo fulvæ. *Alæ*, nitido plumbeæ.

Venosa. 57. P. (la veinée) atra, pedibus albis, alis pallidis, venosis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra tota. *Alæ* pallide griseæ, venis fuscis. *Pedes* albicantes. An species? An phr. *pallipes* Dr. *Allioni*?

Viridis. 58. P. (la verte) viridis, oculis nigris, alis niveis.

Hab. in Europâ.

Desc. Magnitudo minor. *Antennæ* corpore longiores, tenues, fusco albidoque annulatæ. *Thorax* viridis supra & lateraliter luteo maculatus. *Abdomen* viride. *Alæ* albæ. *Pedes* argentato-albi.

Funerea. 59. P. (la pleureuse) tota atra, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus.

Hab. in Europæ pratis.

Desc. Antennæ corpore breviores. Alæ atræ, abdomine longiores.

Larva pedibus elongatissimis. *De Geer* tom. 2. p. 568. n. 8.

Variegata. 60. P. (la marbrée) nigro-fusca , maculis cinereis , pedibus nigro cinereoque intersectis.

Hab. in Europa.

Muscifor- 61. P. (la mouche) fusca , corpore rotundiore , antennis corpore brevioribus , alis pallidis venosis.

Reaum. inf. tom. 3. t. 14. f. 7.

Hab. in Europa.

Desc. Phr. funereæ similis. Antennæ breves , nigræ. Corpus nigricante-fuscum. Alæ albæ , minime fimbriatæ , venis fuscis. Pedes pallide lutescentes.

Lugubris. 62. P. (l'enfumée) tota atra , alis fuscis , venis nigris.

Hab. in Europa.

Obs. *Phalæna nigra* syst. ? V.

Atra. 63. P. (la Savoyarde) tota atra oblonga , alis nigris.

Hab. in Europæ amnium ripis.

Ex oper. D. de Geer.

Obs. A D. de Geer plures phryganearum larvæ observatæ fuerunt quarum imago non adhuc descripta fuit.

Binervosa. 64. P. (la binerveuse) flavo-fusca , antennis longitudine corporis , pedibus ochraceis , alis superioribus macula alba lineisque 2 nigro griseoque punc-

tatis. *Retz.* 176. - *De Geer tom. 2.*
p. 548. t. 14. f. 1. - 5.

Hab. in Europa.

Nigro- 65. P. (les nervures noires) antennis ni-
 nervosa. gris, corpore duplo longioribus, palpis
 longis villosis, alis fusco - testaceis,
 nervis nigris, oculis ferrugineis. *Retz.*
178. - De Geer tom. 2. p. 578. t. 15.
f. 1. - 9.

Hab. in Europa.

Cylindrica. 66. P. (la cylindrique) oblonga cylin-
 drica nigra, alis fuscis costis nigris,
 abdomine fulvo, maculis lateralibus
 nigris. *t. 7. p. 599. t. 44. f. 17, 18.*
Hab. in Europa. In Gallia Aust. fre-
quens. V.

Desc. Minor. Nigra. Alæ corpori fere
circumvolutæ, fuscæ, abdomine duplo
longiores, nervis nigris. Abdomen
fulvum, maculis nigris lateralibus.
Celeriter observatorem fugit.

Obs. Phalænis situ, structura, alarum
colore valde affines sunt phryganææ &
a primis ad neuroptera & hymenop-
tera, hoc genere transire videtur na-
tura; inde error facilis. Alæ nihilo-
minus nec farinosæ, nec diaphanæ.
Insuper lingua spirali dentibusque ca-
rent. Ab antiquis sub nomine ligni-
perdæ cognitæ fuerunt, licet lignis
innoxiæ. D. de Geer.



GENUS IV.

HEMEROBIUS. *Os* dentibus duobus, *palpis* IV.
Stemmata nulla.

Alæ *deflexæ* (*nec plicatæ*.)

Antennæ *thorace* *convexo* *longiores*, *setaceæ*,
porrectæ.

Perla. I. H. (la perle) *luteo-viridis*, *alis hya-*
linis, *vasis viridibus*. *

Scop. carn. 709.

Geoff. parif. 2. p. 253. n. I. t. 13. f. 6.

Mouff. inf. 937. *musca chrysops*.

Gæd. inf. 2. p. 40. t. 14.

Alb. inf. t. 64.

Merian. Eur. 2. p. 49. t. 8.

Vallisn. Nat. 1. p. 77. t. 2.

Pet. mus. 4. n. 6. *perla merdam olens*.

Raj. inf. 274. *musca quadripennis*, *cor-*
pore luteo viridi.

Reaum. inf. 3. t. 33. f. 2, 5, 6. *leo*
aphidum.

Ræf. inf. 3. p. 127. t. 21. f. 4, 5.

Schæff. inf. t. 5. f. 7.

Fab. 2.

Enum. n. 613.

Poda gr. p. 100.

Müll Lin. Nat. cl. v. p. 793.

Faun. Fridr. n. 571.

Hab. in Europæ plantis, *viſitans aphidibus*. *Ova* *ſtipiti capellari inſidentia*.

Deſc. Alæ *magnæ*, *reticulatæ*, *venis*
viridibus, *pellucidæ*, *ac ſi alæ ſolo*
reticulo conſtarent, *macula marginali*

Hemerobii viſitant plurimum aphidibus.

oblonga viridi. *Oculi* globosi, magni, aurei. *Antennæ* feraceæ, subfuscæ. *Corpus* etiam viride, tactum foetet stercore humano. *Faun.* 1504.

Albus. 2. H. (le blanc) albus, oculis viridi-
æneis. *

Fab. 3.

Enum. n. 624.

Scop. carn. 707.

Poda gr. n. 100.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 793.

Faun. Fridr. n. 573.

Hab. in Europa. In Gallia, prope Lugdunum frequens. V.

Desc. Simillimus hem. *perlæ*, sed alæ vasis etiam albis simulque venis ciliatis.

Corpus totum album. *Syst. Faun.* 1506.

Chrysops. 3. H. (le porte-or) viridi nigroque varius, alis hyalinis maculis reticulatis. *

Scop. carn. 708.

Frisch. inf. 4. p. 40. t. 23.

Reaum. inf. 3. t. 33. f. 14, 15, 16.

Ræf. inf. app. 1. p. 126. t. 21. f. 3.

Geoff. paris. 2. p. 454. n. 2.

Fab. 4.

Sulz. inf. t. 25. f. 1.

Schæff. icon. t. 5. f. 7, 8.

De Geer tom. 2. p. 708. t. 22. f. 1. - 3.
viridis, nigro maculatus, nervis alarum nigris.

Enum. n. 625.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 794.

Faun. Fridr. n. 572.

Hab. in Europa.

Desc. Major. Alæ striatæ & reticulatæ; fuscæ venæ plures ad marginem inferiorem; duæ vero validiores in

margine tenuiore supra dorsum. *Faun.* 1505.

Phalænoi- 4. H. (le phalénoïde) testaceus , alis basi
des. mucronatis , postice excisis. * t. 7. f. 6.

Schæff. inf. t. 3. f. 11, 12.

Fab. 5.

Scop. ann. hist. nat. 5. 120. 141.

Sulz. icon. t. 25. f. 2.

De Geer tom. 2. p. 714. t. 22. f. 12, 13.

fusco-ferrugineus , thorace angulato ,
alis magnis latis , postice excisis.

Reaum. inf. tom. 3. p. 390. t. 32. f. 8.

Enum. n. 628.

*Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud
frequens. V.*

*Desc. Phalænam metiens. Alæ latissimæ ,
breves , rufo - testaceæ , reticulato-
venosæ : supra basin superiorum mucro
prominens ; in medio punctum promi-
nens obscurum ; strigæ duæ obliquæ ,
fuscæ e vasis ; margo posticus excisus ;
apice longiore acutiore. *Faun.* 1508.*

Hirtus. 5. H. (le hérissé) alis albis fusco reti-
culatis , fasciis duabus fuscescentibus. *

*Fab. 7. flavescens , alis albis , strigis
fuscis.*

De Geer tom. 2. p. 711. t. 22. f. 4.-7.
griseus fusco - maculatus , alis albis ;
nervis confertim fusco punctatis pilo-
sisque.

Hab. in humuletis. In Gallia Aust. V.

*Desc. Magnitudo muscæ. Corpus fuscum ;
Alæ deflexæ : superiores albidæ , fusco
confertim nebulosæ s. reticulatæ , nervis
pilosis ; fasciæ duæ arcuatæ fusces-
centes e venis : inferiores albidiores ;
minus venosæ , fascia arcuata in medio
& alia terminali , utraque fuscescente.*

Antennæ

Antennæ mediocres. Abdomen terminatur forcipe. Pedes pallidi. Oculi fusci. Faun. 1507.

Humuli. 6. H. (du houblon) alis albis , punctis sparsis fuscis , antennis albo fuscoque annulatis. *

Fab. 8.

Enum. n. 626.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 796.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus albidum , magnitudine formicæ. Alæ magnæ , albæ , venosoreticulatæ , maculis parvis obsoletis fere instar punctorum , temere sparsis. Antennæ setaceæ , lineolis albis fuscisque monilis instar variegatæ. Pedes albidii. Oculi cæruleo-ænei. Supra abdomen utrinque ordo macularum fuscicarum. Faun. 1510.

Paganus. 7. H. (le Payfan) alis albis , superioribus obscure subfasciatis , antennis albis.

Hab. in Europa. Upsaliæ. Prope Lugdunum rarior. V.

Similis hem. humuli. Antennæ & pedes albi s. pallidi. Alæ superiores postice quasi strigis nebulosæ , vix manifestis. Alæ omnes , lynceo inspectæ , auratæ fere evadunt.

6-punctatus, 8. H. (le sixponctué) alis albis , maculis fuscis , postice punctis sex distinctis , antennis fuscis. *

Geoff. paris. 2. p. 250. phryganea 10.

Fab. 11.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. Generis forte phryganæ.

Desc. Hem. humulo simillimus , sed quaduplo minor. Alæ superiores hyalinæ ,

Insect. Tomus III.

D

reticulatæ & fusco maculatæ, ut in illo;
sed postice in singulis alis observantur
puncta sex, scilicet singula intra sin-
gulam retis maculam. *Inferiores* hya-
linæ, immaculatæ: omnes determinato
ad lucem situ, aureæ. *Antennæ* non
albo & nigro variegatæ, ut in illo.
Faun. 1511.

Flavicans. 9. H. (le jaunâtre) niger, thorace ab-
domineque flavis. *

Fab. 12.

Faun. Fridr. n. 575.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo pediculi. *Antennæ* ni-
græ, setacæ, longitudine corporis.
Caput nigrum. *Collum* angustius,
flavum. *Thorax* nigricans. *Abdomen*
ovatum, teres octo, incisuris profundis
cinctum, flavum. *Pedes* nigricantes.
Alæ hyalinæ, venis obscuris ramosis.
Facies aphidis. *Faun.* 1512.

Lutarius. 10. H. (l'aquatique) niger, alis albidis
striatis, albo maculatis. *

Haffn. pict. t. 12.

Ræf. inf. 2. aqu. 2. t. 13.

Fab. semblis 8. caudata, alis reticulatis.

De Geer tom. 2. p. 716. *t.* 22. *f.* 14.-18.

t. 23. *f.* 1.-15. niger, thorace magno
depresso, alis pallidis fuscis, nervis
nigris.

Schæff. elem. t. 97.

— *icon. t.* 37. *f.* 9, 10.

Faun. Fridr. n. 576.

Hab. in Europæ plateis, imprimis vere.
Larva Ræselii accedens ephemeris singulare
insectum reddit.

Desc. Magnitudo panorpæ. *Alæ* corpore
longiores, lanceolatæ, obtusiusculæ,

albæ, venis fuscis striatæ; venis his vix reticulato-connexis, nisi solum in alis exterioribus, duabus aut tribus margini interiori propioribus; duo exteriores nervi seu extimus vix uno in loco connectitur; at alæ omnes quatuor, ad marginem anteriorem, versus apicem, linea fusca inter duo exteriora vasa notantur. *Corpus & pedes nigra. Abdomen subtus atrum; juxta anum duæ appendices brevissimæ. Antennæ nigræ, setiformes, longitudine corporis. Thorax planiusculus, medio convexus. Faun. 1513.*

Obs. Ex synonymia *D. Linn.* & *De Geer* hemerobius lutarius *syst.* ad *tab. 13.* aquat. *Ræselii* refertur. *Clariss. Linn. Schæff. elem. t. 97.* indicat: eandem tabulam & *tab. incon. 37. f. 9, 10.* reclamatione *D. Fab.* & insuper *D. Geoff.* hemerobium tertium. Omnes non igitur hi doctissimi Entomologi non concordant.

1°. Phrasis clariss. *Linn.* emendanda, ut optime annotavit *D. de Geer.*

2°. Hoc insectum non ad *Schæff. elem. t. 97,* sed ad *icon. t. 37. f. 9. & 10* referendum, licet hanc tab. non indicaverit *D. de Geer.*

3°. In synonymia *D. Fab.* delenda est *D. Geoff.* citatio.

Obs. Lente volitat, stemmatibus caret thoraceque duplici gaudet. V.

Pedicula- 11. H. (le pédiculaire) virescens, antennis mediocribus. *

Hab. in Europa.

Desc. Hic ita termiti pulsatorio similis, ut, dentis alis, vix differat facie, an sexu solo? *Antennæ corporis longi-*

rudine. *Corpus* fusco-virescens. *Alæ* quatuor venosæ. *Abdomen* virescens. *Obs.* Inter hemerobios, exemplo *D. Fab.* numeravi. In *syst. nat.* p. 1015. synonymia sequens.

Scop. carn. 1032.

Derh. Theol. 119.

Bradt. Nat. t. 27. f. 3.

Ad. Ang. n. 270. p. 231. & n. 291. p. 1586. & n. 245. p. 376.

Roland. ad. Stockh. 1754. p. 52.

Sulz. inf. t. 22. f. 144.

Geoff. paris. 2. p. 601. pediculus 12.

Schæff. elem. t. 126.

Blank. Belg. 169. add. t. 14. f. F.

Enum. n. 630.

Fab. 15. apterus ore rubro, oculis luteis.

De Geer tom. 7. t. 4. f. 1.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 797.

Hab. in Europa & America, frequens in domibus, invisum vestibulis, herbariis, muscis. Fœmina horologii instar pulfatoria in ligneis festucis.

Desc. Corpus oblongum, pallidum. *Oculi* flavi. *Antennæ* fetacæ, longitudine (in plerisque) ipsius corporis; macula fusca annularis intra abdomen & pone hanc versus anum punctum fuscum. Segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula notata sunt. *Osc.* rufum. *Faun.* 1937.

Bipunctatus. 12. H. (le bipoctué) viridi-nigroque varius, alis superioribus maculis duabus nigris.

Fab. 12.

Hab. Upsaliæ. *Fr. Logie.*

Desc. Corpus Magnitudine aphidis. *Antennæ* longitudine corporis. *Alæ* hyalinæ, venis fuscis reticulatæ. *Superiores*

maculis duabus nigris, quarum quæ ad marginem crassiorē posteriùs locata, quæ vero ad marginem tenuiorem anterioriùs. *Faun.* 1514.

Ex spec. D. Fab.

Nitidulus. 13. H. (le brillant) alis fusco nitidulis, corpore testaceo, pedibus pallidis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo hem. *hirti*. *Antennæ* longitudine corporis fuscæ. *Caput* testaceum, oculis magnis nigris. *Thorax* & *abdomen* testacea, immaculata. *Alæ* corpore multo majores, fuscæ, aureo rubroque nitidissimæ, immaculatæ. *Pedes* pallidi.

Longicor- 14. H. (le longicorne) niger, ore pedibusque
nis, pallidis, antennis longioribus fuscis.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. montibus. V.

Desc. Hem. *hirto* paullo major. *Antennæ* corpore triplo longiores, fuscæ, immaculatæ. *Caput* nigrum, ore pallido. *Thorax* & *abdomen* nigra, immaculata. *Alæ* albæ, nervis punctoque marginali fuscis. *Pedes* pallidi.

Obs. Hoc insectum in nostris regionibus haud frequens, antennarum longitudine singulare. V.

Striatulus. 15. H. (le strié) fuscus flavo maculatus, alis fusco striatis, posticis immaculatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Major hem. *bipunctato*. *Antennæ* fuscæ, corpore longiores. *Caput* flavum, ore oculisque fuscis. *Thorax* fuscus. *Pedes* & *pectus* flava. *Alæ antica* albæ, fusco striatæ. *Postica* immaculatæ.

Abdomina-16. H. (l'imperceptible) fuscus , abdomine
lis. flavo , ano nigro.

Hab. in Anglia. *It. Norwag.*

Desc. Pediculo minor. *Antennæ* breves ,
fuscæ. *Alæ* albæ fusco maculatæ.

Maculatus. 17. H. (le ratcheté) alis albis , anticis
nigro maculatis, corpore nigro. *Mantiss.*
tom. I. p. 247.

Hab. Monspeliæ. *D. Broussenet. Mus.*
D. Banks.

Desc. Magnitudo hem. *chryf.* at specimina
haud bene conservata. *Antennæ* defunt.
Corpus nigrum , capite pedibusque sub-
testaceis. *Alæ omnes* albæ ; *antica*
maculis plurimis sparsis nigris , postice
tantum costa nigro maculata.

Fasciatus. 18. H. (le fascié) alis albis , fasciis tribus
atomisque numerosis nigris. *Mantiss.*
tom. I. p. 247.

Hab. Kiliæ.

Desc. Statura præcedentium parva. *An-*
tennæ nigrae. *Caput & thorax* flava ,
litoris fuscis. *Abdomen* nigrum. *Alæ*
antica albæ , fasciis tribus nigris , pos-
teriore terminali atomisque præterea
plurimis fuscis. *Posticæ* albæ , imma-
culatæ.

4-Puncta- 19. H. (le quadriponctué) alis albis , basi
tus. punctis quatuor atris , apice fusco
radiatis. *Mantiss. tom. I. p. 248.*

Hab. Kiliæ. *D. Daldorff.*

Desc. Parvus. *Caput & thorax* nigra , imma-
culata. *Antennæ* pallidæ. *Abdomen* , uti
& *pedes* , pallidum. *Alæ* albæ , hyalinæ ,
basi punctis quatuor magnis distinctis ,
atris , tribus ad marginem tenuiorem ,
quarto in medio , apice fusco striatæ.

Ex entom. carn.

Fulvicephalus. 20. H. (le fulvicéphale) alis hyalinis , maculis marginalibus venulisque fuscis reticulatis , capite fulvo , corpore nigricante. t. 7. f. 7.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Nemausum captus. V.

Desc. Inter majores numerandus. *Facies* myrmeleonis *formicarum* , sed anteuuæ non clavatæ , attamen breves. *Alæ* fusco maculatæ in parte antica marginis interioris. V.

Flavus. 21. H. (le jaune) flavus , oculis nigris.

Hab. in Europa. Prope Lugdunum , circa aquas volitat primo vere. V.

Desc. *Antennæ* quoque flavæ. *Abdomen* muticum. *Alæ* hyalinæ albæ , venulis pallide virescentibus.

Ex Enum.

Aphidiodes. 22. H. (l'aphidioïde) niger , alis hyalinis , nigro reticulatis , macula marginali fusca.

Faun. Fridr. n. 580.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Ita aphidi alatæ similis , uti pro tali habeatur ab omni qui os palpis instructum non intuetur. *Totus* niger , etiam antennis , quas aphidum more portat.

Ex Faun. Fridr.

Nemorialis. 23. H. (le sauvage) alis hyalinis æneis venosis , primoribus nigro punctatis.

Hab. in Europæ Nemoribus.

Obscurus. 24. H. (l'obscur) niger , alis obscure venosis , abdomine fusco.

Hab. in Europa , juxta rivos.

Parvulus. 25. H. (le laiteux) alis lacteis integris , antennis albis longitudine corporis.

Hab. in Europa.

Obs. Vix major aphide.

Ex nost. mus.

Rufus. 26. H. (le roux) rotus rufus , alis valde reticulatis , obscuris.

Hab. in Europa.

Obs. Inter magnos numerandus.

Varius. 27. H. (le varié) collare pallido , thorace nigro-luteoque variegato.

Hab. in Europa. In Bressia , circa aquas. V.

Desc. Magnitudo major. Alæ amplæ , nitidæ , hyalinæ , immaculatæ.

Raphidioi- 28. H. (le raphidioïde) niger , alis fuscis.
des. t. 7. f. 8.

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis , sed rarissimus.

Desc. Caput ut in raphidia ophiopsi , sed thorax diversus. Alæ opalo-nitentes , hirtæ , reticulatæ , ratione insecti magnitudine magnæ sunt. Corpus totum nigrum uti caput , thorax etiamque antennæ.



GENUS V.

MYRMELEON. Os maxillosum , dentibus duobus.

Palpi IV , elongati.

Stemmata nulla.

Cauda maris forcipe e filamentis duobus rectiusculis.

Antennæ clavatæ , longitudine thoracis.

Alæ deflexæ.

Libelluloides. 1. M. (le Libelluloïde) alis nigro-punctatis maculatisque. t. 7. f. 9.

Raj. inf. 53. musca rarissima ad libellas referenda.

Pet. gaz. 6. t. 3. f. 1. libella turcica major , alis locustæ.

Fab. 1. alis griseis fusco maculatis , corpore nigro flavoque variegato.

Drury. hist. inf. 1. t. 46.

Sulz. inf. t. 25. f. 3.

De Geer tom. 3. p. 565. t. 27. f. 9. collari luteo , alis griseis , nigro maculatis nervisque flavis.

Hab. in Europa Australi , Oriente , Africa & in Cap B. Spei. In Gallia Australiori. V.

Desc. Corpus magnitudine libellulæ majoris. Caput nigricans , labio flavo , punctisque duobus flavis inter antennas.

Antennæ nigræ , clavatæ. Collum supra nudum , flavum. Thorax flavus , lineis tribus nigris , villis albis hirsutus.

Abdomen libellulæ , nigrum , linea utrinque flava. Alæ superiores deflexæ,

oblongæ, subflavescenti-albidæ, hyalinae, indique adspersæ & fere nebulosæ punctis nigris venarumque anastomosibus confertissimis, albidis; ex hisce punctis 4 s. 5 maculæ nigræ sunt. *Alæ inferiores* hyalinae, confertissimis anastomosibus albis & tribus vel quatuor maculis magnis nigris, difformibus didymis, una post alteram, pictæ præter margines nigro-punctatos. *Pedes* nigri. *Mas* cauda setis 2 rigidis, hirtis, apice unguiculatis, quibus sociamprehendit. *Mus. ulr. p. 401.*

Obs. Nescio quo fato hemerobium speciosum ad hoc genus retulerunt. *D. Fab.* & *D. de Geer*, saltem *tab. Ræf. 21. fig. 1.* fidendo; nam antennæ non sunt clavatæ. Tarde volitat hoc myrmeleon volatusque trepidus. V.

Longicorne. 2. *M.* (le longicorne) alis flavis, maculis duabus nigris difformibus, antennis longitudine corporis.

Hab. in Europa Australi, Africa. In Gallia Aust. Nemausum prope. V.

Desc. *Corpus* magnitudine hem. *Perlæ*, nigrum. *Caput* nigrum, pilosum, occipite flavo. Macula flavâ supra oculos. *Antennæ* nigræ, longitudine corporis, apice clavatæ. *Thorax* ater, villosus, supra punctis octo luteis. *Alæ superiores* luteæ, macula oblonga nigra, ad basin & lineola nigra versus marginem exteriorem. *Alæ inferiores* flavæ, basi nigræ & lunula nigra versus apicem. *Abdomen* nigrum. *Femora* & *tibiæ* flavæ. *Plantæ* nigræ. *Mus. ulr. p. 402.*

Obs. Primo intuitu, dum volitat, pro myrmeleone barbaro sumitur. *Antennæ*

similes. In quiete vix visibile utrumque ;
sed in myrmeleone *barbaro*, *alæ*, im-
primis *inferiores* aliter pictæ. Insuper
hoc in fegetibus prope Lugdunum,
non rarum ; sed altera species non
reperitur.

Formica- 3. M. (le fourmilion) alis macula alba
rium. marginali postica.

Syst. nat. 10. p. 550. n. 4. hemerobius
formicaleo.

Faun. suec. 1509. *

It. Oel. 149, 206.

Vallis. oper. 1. p. 77. t. 2.

Reaum. inf. 4. t. 14. f. 18, 19 & t. 11.
f. 8. & tom. 6. t. 32, 33, 34.

Raf. inf. 3. p. 101. t. 17. - 20. & t. 21.
f. 2.

Sulz. inf. t. 17. f. 105.

Poda inf. t. 1. f. 8.

Geoff. paris. 2. p. 258. t. 14. f. 1.
formicaleo.

Fab. 3.

Enum. n. 631.

Schæff. elem. t. 65.

— icon. t. 22. f. 1, 2.

Poupart. ad. paris. 1704?

Faun. Fridr. n. 574.

Hab. in Europæ arenosis, larva retro-
grada, sub fovea excavata formicis
præcipitatis victitans.

Desc. Os flavescens, uti pedum articuli
ad basin. *Alæ* nostratis absque maculis
fuscis. *Syst.*

Circa hanc speciem magna restat ambi-
guitas, quam turba auctorum nondum
sustulit. *Enum* 631.

Ex *D. Reaum.* imaginibus sequitur for-
mileonem. fig. 8. tom. 4. tab. 11. & f. 7.
t. 34. tom. 6. eandem esse speciem :

maculæ igitur alarum speciem diversam non constituunt. *D. Geoff.* hoc descripsit; sed macula alarum alba marginali nec in uno nec in altero reperitur. Hæc variant; nam in aliis alæ sunt maculatæ, in alteris immaculatæ ultimum in 21. *Raf. D.* pictum est descriptumque in *syst. nat.* In omnibus his duobus antennæ nigræ, flavo-annulatæ, venæ alarum variegatæ. *Thorax* niger flavo lineatus aut maculatus; sed cum in numerosis nostris speciminibus, macula marginalis magis minusve sit conspicua & aliquoties fere oblitterata sit, cum ex larvis iisdem, hæc insecta nata sint, pro una & eadem specie habebimus; sed in Gallia Aust. datur altera species præcedentibus vere distincta. Antennæ quæ longiores sunt, nec nigræ, nec flavo annulatæ. Alæ omnino immaculatæ, nervis albidis, minime variegatis. *Abdomen* nigrum absque annulis flavis. *Pedes* omnes testacei. Species quæ *D. Reaum. n. 14. t. 34. tom. 6.* descripta est valde affinis.

Obs. In *Faun. suec.* inter hemerobios ordinatum fuerat hoc myrmeleon ibidemque larva optime descripta fuit. Magnitudine aranæ cinereæ. *Abdomen* magnum, ovatum, papillis hispidis, 5 ordinum, longitudinaliter notatum. *Thorax* angustus. *Os* forcipe longa ad apicem connivente; singula maxima tribus dentibus, præter apices, armata, utrinque pilosæ. *Pedes* albicantes, quibus retrograde incedit instar cancri & abdomine cavitates & arenam fodit, sub qua latebit.

Phryganea ipsa nigra. Alæ oblongæ hyalinæ, venis fulcis reticulatæ: costa

versus marginem inferiorem constat e duobus nervis elevatis atris, parallelis, apice coeuntibus, spatio ab apice remoto. Thorax villosus. *Faun.* 1509.

Formica- 4. M. (le formicalynx) alis immaculatis
lynx. hyalinis, antennis setaceis.

Syst. nat. 10. p. 550. n. 5.

Ræf. inf. 3. t. 21. f. 2.

Fab. 5. alis immaculatis, corpore fusco.

De Geer tom. 3. p. 564. t. 27. f. 8. alis hyalinis, macula albida corpore fusco, maculis griseis.

Hab. in Africa. In Gallia Aust. prope Nemausum. V.

Obs. In nostris speciminibus antennæ clavatæ, apice clava compressa flexa; a myrmeleone igitur *Ræf.* t. 21. n. 2. diversum; minus & alas omnino immaculatas habet. *Antennæ* fuscæ alæque corpore sunt longiores. V.

Barbarum. 5. M. (l'Africain) alis hyalinis, antennis longitudine corporis, clava suborbiculata.

Fab. ascalaphus 1. alis reticulatis hyalinis, maculis duabus fuscis.

Schæff. elem. t. 77.

— *monogr.* 1763.

— *icon.* t. 50. f. 1, 2, 3.

Seba mus. 3. t. 86. f. 2.

Sulz. hist. inf. t. 25. f. 4.

Hab. in Barbaria. In Gallia Aust. prope Lugdunum tempore segetum frequens. V.

Corpus myrm. fornicario minus, nigrum, testaceo-variegatum, excepto abdomine hirsutum. *Antennæ* filiformes nigrae, apice clava rhombo-orbiculata compressa. *Oculi* fusci, quibus incumbit

quasi palpebra ovata, testacea. Alæ deflexæ, lanceolatae, hyalinae, reticulatae, puncto marginali fusco, ut in libellulis. Abdomen nigrum, linea dorsali flava; subtus flavo-variegatum. Pedes flavi. Frons pilosa.

Ex spec. D. Fab.

Italicum. 6. M. (l'Italien) alis anticis hyalinis; macula duplici basæos flava, posticis flavis basi atris.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. Prope Lugdunum. V.

Desc. Vix a myrm. barbaro distinctum.

Caput nigrum, hirtum, pilis in medio atris, superne inferneque ferrugineis.

Obs. In his regionibus myrm. barbaro frequentius. V.

Pantheri- 7. M. (la panthere) alis albis nigro maculatis, corpore flavo, abdomine nigro variegato. *Mantiss. tom. I. p. 249.*

Hab. in Austria.

Desc. Antennæ mihi defunt. Caput flavescens, fronte inter antennis atra, nitida. Thorax flavescens, immaculatus. Abdomen flavescens, nigro maculatum. Alæ omnes albidæ, hyalinae, maculis plurimis nigris. Pedes defunt.

Australe. 8. M. (l'Austral) alis albis, macula marginali nigra, corpore variegato. *Mantiss. tom. I. p. 250.*

Hab. in Europa Australi D. Lund.

Desc. Antennæ longitudine corporis, nigrae, clava oblonga. Caput flavum, fronte oculisque fuscis. Thorax & abdomen flavo fuscoque variegata. Alæ omnes albæ, reticulatae maculaque

marginali ordinaria fusca. *Pedes* flavi,
angulis fuscis.

Ex nost. Mus.

Occitanicum. 9. M. (le Languedocien) alis hyalinis,
nervis albo nigroque variegatis, ab-
domine annulato, cauda maris hirsuta.
t. 7 f. 10.

Hab. in Europa, prope Nemausum.

Desc. Magnitudine myrmeleonis *libellulæ*.
Frons coma alba. *Pectus* valde villosum.
Femora & *tibiæ* pilis albis vestita.
Oculi glaucescentes. *Antennæ* nigrae,
thorace longiores, apice incrassatae,
recurvae, nigrae. *Thorax* testaceus,
in medio maculis duabus nigris
longitudinalibus, medio coeuntibus,
extremitatibus divergentibus, hirsu-
tus, imprimis ubi abdomini conjun-
gitur. *Caudæ maris* rigida, pilosa,
dente in medio obtuso prominente.
Alæ lanceolatae, valde reticulatae,
venis albo nigroque tessellatae, rete
variegato. *Pedes* nigri.

Lugdunens- 10. M. (le Lyonnais) fronte lutea, ver-
tice luteo nigro cruciato, alis om-
nibus diaphanis concoloribus.

Hab. in Europa.

Desc. Fere major myrm. *formicario*.
Antennæ longiores, fuscae, unicolores.
Alæ omnes diaphanæ immaculatae.
Nervi alis concolores.



GENUS VI.

PANORPA. *Rostrum* corneum, cylindricum;
palpis duobus.

Stemmata III.

Antennæ thorace longiores.

Cauda maris chelata.

Communis. 1. P. (la commune) alis æqualibus nigro
maculatis. *

Scop. carn. 710.

Aldr. inf. 386. f. 8, 9, & 387. f. 5, 6.
musca scorpiura.

Frisch. inf. 9. p. 29. t. 14 f. 1. scorpio
musca.

Mouff. inf. 62. f. 3, 4.

Reaum. inf. 4. t. 8. f. 9.

Sulz. inf. t. 17. f. 106.

Geoff. paris. 2. p. 260. t. 14. f. 2.

Ad. nidros. 3. p. 414. t. 6. f. 10.

Fab. 1.

Schæff. elem. t. 93.

— *icon.* t. 88. f. 6, 7.

De Geer tom. 2. p. 733. t. 24. f. 3.-11.-
t. 25. f. 1.-3. nigra lineis abdominis
flavidis, thorace cylindrico.

Poda gr. p. 100.

Enum. n. 633.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 803.

Faun. Fridr. n. 581.

Hab. in Europa.

Desc. Rostrum in proboscidem duram;
corneam prominens deorsum. *Ant-*
ennæ 30. articulis, setaceæ, nigræ.
Corpus fuscum. Latera corporis flava.
Cauda articulata, chela scorpionis
inftar

instar rufescente, bifida. *Alæ* albæ, maculis fasciatis, venis reticulatis. *Mas* cauda chelifera; *fœmina* inermis. *Faun.* 1516.

Obs. Metamorphosis omnino adhuc latet. *Fab.*

Germanica. 2. P. (l'Allemande) alis æqualibus, hyalinis, apice fuscis.

Fab. 2.

Enum. n. 634.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 803.

Hab. in Germania. P. *Forskæl.*

Priore dimidio minor. Cauda magis palatida. *Alæ* tantum apice fuscæ & puncto ad marginem exteriorem.

Hyemalis. 3. P. (l'hyémale) alis subulatis subincurvatis ciliatis, fœmina aptera.

Fab. 3.

Hab. in Thuringiæ muscis, tempore hyemali. D. *Schreber.* In Gallia, prope Lugdunum rara. V.

Corpus magnitudine pediculi, supra fusco-æneum. Antennæ corpore breviores. Rostrum corneum, cylindricum, thorace longius. Thorax teres, rugosus. *Alæ* maris 4, abdomine breviores apice incurvo subulato, fuscæ. Abdomen maris muticum; fœminæ ense terminali, abdomine brevior. Pedes longi.

Coa. 4. P. (l'insulaire) alis erectis, posticis sublinearibus longissimis.

Hasselqu. iter 423. ephemera: coa.

Ad. Stokh. 1747. p. 176. t. 6. f. 1.

Fab. 5.

Rüysch. thesaur. animal. t. 1. f. 2. D.

Pet. gazoph. 1. t. 73. f. 1.

Hab. in coa metellina & insulis Archipelagi, in Hispania. *Loestign, Alstræmer,*

Insect. Tomus III.

E

Desc. Alæ flavescences, antice fusco maculatæ. *Fab.*

Ex spec. D. Fab.

Tipularia. 5. P. (la tipule) alis immaculatis, abdomine falcato, pedibus longissimis.

t. 7. f. 11.

Müll. *Ad. Taurin.* 3. 194.

Schränk. *Beytr.* 82. 40.

Sulz. *hist. inf.* t. 25. f. 7, 8.

Hab. in Europa Australiori. *Dr. Allioni.*

In Galliæ Aust. pratis. Prope montem Aldemari frequens. V.

Obs. figura adeo tipulæ ut primo intuita male judicetur. Alæ quatuor & rostrum panorpæ. V.

GENUS VII.

RAPHIDIA. Os dentibus duobus in capite depresso corneo.

Palpi IV.

Stemmata. III.

Alæ deflexæ.

Antennæ longitudine thoracis antice elongati, cylindrici.

Cauda læminæ seta recurva laxa.

Ophiopsis. 1. R. (la raphidie) thorace cylindrico. *

t. 7. f. 12.

Scop. carn. 711.

Rœf. inf. app. 1. p. 130. t. 21. f. 6, 7.

Fab. 2.

Schæff. elem. t. 107.

— icon. t. 95. f. 1, 2.

De Geer tom. 2. p. 742. t. 25. f. 4.-9.
nigra, lineis abdominis flavidis, tho-
race cylindrico.

Sulz. hist. inf. t. 25. f. 9.

Faun. Fridr. n. 582.

Enum. n. 636.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 805.

Hab. in Europa.

Puppa hujus currit matri simillima, licet
aptera. *Caput* obcordatum.

Desc. Magnitudo & facies proxime ad
panorpam accedit. *Caput* nigrum,
corneum, postice angustum, supra
depressum, læve. *Thorax* angustus,
cylindraceus, niger. *Antennæ* seta-
cæ, albidæ, innumeris articulis.
Abdomen oblongum, fuscum, lineis
transversis albis. *Alæ* diaphanæ, venis
reticulatis, uti in libellulis. Ab ano
exferitur mucro setaceus, niger, ar-
cuatus, longitudine dimidii abdominis,
flexilis, iners. Variat aculeo armata
& eodem destituta, quod sexus nota.

Faun. 1517.

Obs. *Caput*, collo mobili thorace con-
nexum. *Thorax* cum abdomine, mar-
gine membranaceo articulatam, inde
caput thoraxque in varia latera in-
flectit. *Abdominis* incisuræ novem,
non computato cono anum terminante.
Cauda utroque latere depressa, apice
mobili adscendente.

Mantispa. 2. R. (la raphidie-mante) pedibus anticis
thoraci antice annexis, antennis tho-
race brevioribus. † t. 7. f. 13.

Poda inf. 101. t. 1 f. 15. *

Scop. carn. 712.

Fab. 3.

Sulz. hist. inf. t. 25. f. 10.

Hab. in Styria, tarde progreditur nempe unco & tibiis complicatis, solis femorum geniculis insistens, quibus explicatis ad adscendendum utitur. Mihi non visa.

Desc. Singulare insectum. Antennæ breves. Oculi magni exserti. Thorax longus, ere cylindricus. Pedes anteriores ab aliis remoti, ex parte antica thoracis oriuntur. Coxæ longæ. Femora valde incrassata, spina valida armata, sinuata, in sinu tibiæ curvæ recipiuntur. Situ & forma pedum anteriorum a præcedenti omnino recedit. Alæ etiam ampliores, macula etiam marginali fusca. Abdomen in utroque sexu falcatum. V.


Obs. Non rara in Delphinatu, in loco vulgo Mion. Sæpe in pinis uti præcedens; præcedenti major. V.

Ex spec. D. Fab.

Notata. 3. R. (la tacherée) thorace cylindrico, alis macula marginali fusca.

Hab. in Anglia. Mus. D. Bancks.

Desc. Affinis raph. ophiopsi, at paullo major. Corpus nigrum. Macula capitis subtestacea. Aculeus exsertus longitudine abdominis. Alæ magnæ, reticulatæ, macula magna fusca marginali. Pedes testacei. Femora nigra.





V.

HYMENOPTERA.

Alæ quatuor, membranaceæ, plerisque.
Aculeus caudæ, sed nullus in maribus.

GENUS PRIMUM.

CYNIPS. *Os maxillis absque proboscide.*
Aculeus spiralis, sæpius reconditus.

Rosæ. 1. C. (de la rose) nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. *

Faun. suec. I. n. 938. tenthredo antennis 12-nodiis nigris, abdomine subtus ferrugineo, pedibus flavis, alis immaculatis.

Blank. inst. t. 16. f. V. Z.

Reaum. inf. 3. t. 46. f. 5.-8. & t. 47. f. 1.-4.

Fab. I.

Enum. n. 637.

Geoff. La diplolepe du bédégua.

Scop. 713.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 811.

Faun. Fridr. n. 583.

Hab. in bedeguar rosarum hispido.

Cynipis Larvæ pleræque intra Gallas plantarum, quas causantur, latent.

Desc. Magnitudo pediculi. *Antennæ* nigrae, rectae, 12-circiter articulis. *Caput* & *thorax* gibbus, niger. *Abdomen* subovatum, alis brevius, carinatum, subtus ferrugineum, versus anum nigrum. *Pedes* ferruginei. *Alæ* albæ absque macula marginali. *Faun.* 1518.

Hieracii. 2. C. (de l'éperviere) hieracii murorum.

Faun. suec. I. n. 950.

It. scan. 280.

Barth. aed. 1671. t. 283.

Chemn. Brunsv. t. 7.

Valent. Virid. t. 328. f. 1.

Heuch. Wittenb. I. t. 1.

Faun. Fridr. n. 584.

Hab. in Hieracii murorum galla caulina hirta.

Glechomæ. 3. C. (du glécome - lierre) glechomæ hederaceæ.

It. Wgoth. 107.

Blank. inf. 186.

Pancow. Herb. 709.

Elshol. March.

Welsch. Hecast. t. 127. f. 1.

Reaum. inf. 3. t. 42. f. 1.-5.

Geoff. paris. 2. p. 303. cynips totus, fuscus., thorace villosus.

Fab. 2. fusca, thorace villosus.

Faun. Fridr. n. 585.

Hab. in glechomæ hederaceæ gallis foliorum globosis, scabris.

Desc. *Thorax* parum villosus. *Tota* nigrofusca. V.

Quercus 4. C. (des baies) nigra, basi antennarum pedibusque flavescentibus.

Uddm. diss. 81. t. 1. f. 14.

Geoff. inf. 2. p. 300. n. 9.

Reaum. inf. 3. t. 192. t. 42. f. 8.

Fab. 3.

Faun. Fridr. n. 587.

Hab. in gallis foliorum quercus pellucidis
subglobosis, paginæ inferiori insertis,
magnitudine pisi, exiens media æstate.

Quercus 5. C. (des feuilles) nigra, thorace
folii. lineato, pedibus griseis, femoribus
subtus nigris.

Rhed inf. 157.

Frisch. inf. 2. t. 3. f. 5.

Sulz. inf. t. 18. f. 108.

Reaum. inf. 3. t. 39. f. 14.-17.

Blank. inf. t. 16. f. A-H.

Ræf. inf. app. t. 52, 53. f. 10, 11.

Leuwenh nat. 217.

Fab. 4.

Geoff. tom. 2. p. 309. *diplolepis* 1. fuscus
gallæ globosæ glabræ & duræ foliorum
quercus.

Enum. n. 738.

Faun. Fridr. n. 586.

Hab. in gallis foliorum quercus globosis,
pagina inferiore, avellanæ magnitu-
dine. *Amæn. acad.* 3. p. 324.

Desc. Longitudo cimicis. *Corpus* atrum.
Caput fuscum. *Antennæ* filiformes,
extrorsum crassiores, 12 articulis.
Thorax fuscus, gibbosus, *Linn.* 3
glabris, elevatis. *Abdomen* subovatum,
atrum, nitidum, gibbum, sessile.
Alæ erectæ, albæ, venis nigris, cor-
pore duplo longiores absque puncto
marginali. *Pedes* grisei. *Femora* subtus
nigra. *Faun.* 1521.

Quercus 6. C. (de l'abrité) atra, antennis pedibus-
inferus. que pallidis.

Fab. 5.

*Hab. in Gallis foliorum quercus globosis ,
opacis , rubris , paginae inferiori innatis ,
magnitudine avellanæ. In Suecia vulgaris.
Magnitudo pulicis , ater. Antennæ pallidæ
uti pedes , fereque subtestaceæ. Alæ
hyalinæ totæ , neque venis neque puncto
obscuriore.*

**Quercus 7. C. (du pétiole) nigra , pedibus albidis ,
petioli.** femoribus fuscis. *

Ræf. inf. app. t. 35 , 36.

*Geoff. parif. tom. 2. p. 301. n. II.
Fab. 6.*

Faun. Fridr. n. 588.

*Hab. in quercus petiolo f. ramulo , galla
cava utrinque convexa.*

*Desc. magnitudo culicis. Corpus nigrum.
Abdomen glabrum. Alæ hyalinæ. An-
tennæ longitudine fere corporis. Pedes
omnes pallidi. Femora crassiuscula ,
nigricantia. Faun. 1523.*

**Quercus 8. C. (du péduncule) grisea , alis cruce
pedunculi.** lineari.

Reaum. inf. 3. t. 40. f. 1.-6.

Fab. 7.

Geoff. tom. 2. p. 302. n. 16.

*Hab. in quercus floribus masculis , gallis
granulatis in catenas nodorum. Amæn.
acad. 3. p. 324.*

**Quercus 9. C. (de l'écorce) corticis quercus
corticis.** roboris.

*Hab. in galla cyathiformi f. pezizæ facie :
disco convexo , cincto punctis ultra
20 concavis , cortici quercus inmersa.
T. Bergman.*

**Quercus 10. C. (des rameaux) pallida , abdomine
ramuli.** oculisque nigris. *

Enum. n. 641.

Faun. Fridr. n. 590.

Hab. in gallis lanatis albis ramulorum quercus Solander.

Desc. Minima. *Antennæ* moniliformes, longitudine abdominis. *Corpus* totum pallidum, exceptis oculis & abdomine nigris. *Faun.* 1527.

Quercus II. C. (des boutons) *gemmae* quercus *gemmae*, roboris. *

Faun. suec. 948. tenthredo gallæ imbricatæ.

Reaum. inf. 3. t. 43. f. omnes.

Frisch. inf. 12. t. 2. f. 2.

Geoff. paris. 2. p. 299. n. 8. cynips nigro-æneus pedibus fuscis.

Faun. Fridr. n. 589.

Hab. in quercus *gemma* terminali, in gallam imbricatam tumefcente.

Desc. Magnitudo pediculi. *Corpus* griseum s. testaceum. *Oculi* fusci. *Antennæ* subfuscae, longitudine corporis. *Alæ* hyalinæ, cruce lineari. *Faun.* 1525.

Fagi. 12. C. (du hêtre) fagi sylvaticæ. *

Faun. suec. 1. n. 946. tenthredo gallæ foliorum fagi.

Frisch. inf. 2. t. 5.

Fab. 9. atra immaculata.

Faun. Fridr. n. 591.

Hab. in fagi sylvaticæ foliis.

Desc. *Alæ* corpore longiores, ut in phalænis deflexæ, puncto marginali terram spectante. *Faun.* 1528.

Viminalis. 13. C. (du faule à feuilles longues) flava, thorace nigro. *

Ræf. inf. 2. *Vesp.* t. 10. f. 5, 6, 7.

Fab. 10.

Fab. 8.

Faun. Fridr. n. 592.

Hab. in falicis viminalis foliis, subcosta.

Desc. Parva. *Caput & abdomen* flava.

Thorax niger. *Faun.* 1529.

Capreæ. 14. C. (du faule-marceau) viridis nitida ,
pedibus pallidis.

Frisch. germ. 4. p. 39. t. 22.

Fab. 11.

Faun. Fridr. n. 593.

Enum. n. 642.

Hab. in falicis gallis ferrugineis, hordei-
formibus, foliorum medio innatis, nec
non in aliis excrefcentiis ramorum.

Salicis 15. C. (du cone du faule) atra , thoracis
strobili, tergo virescente. *

Fab. 12.

Schulz. de rosis falicinis. Ad. Dresd. 1.

Enum. n. 643.

Hab. in falicis glabræ apicibus ramulorum
strobiliformibus e foliolis.

Desc. Magnitudo pulicis. *Corpus* totum,
pedibus & antennis, atrum. *Antennæ*
filiformes, apicem versus minime acu-
tiores sunt, tamen corpore dimidio
breviores. *Abdomen* ovatum, acutum.
Pedibus saltat, licet figura pedum
crassiore non gaudeat. *Caput &*
thorax a tergo virescentia sunt. *Faun.*
1532.

Amerinæ. 16. C. (du faule pentandrique) nigra ,
pedibus pallidis.

Fab. 13.

Hab. in falicis pentandræ gallis inæqua-
libus, ramos terminantibus.

Inanita, 17. C? (le diaphane) nigra , abdomine

- uniarticula antice utrinque macula fenestrata, pedibus ferrugineis.

Hab. Upsaliæ. C. G. Kekeritz.

Corpus Magnitudine formicæ rufæ, toto cælo a reliquis diversum. Antennæ setaceæ, corpore breviores. Thorax scabriusculus. Abdomen oblongum, obtusissimum, opacum, absque ulla incisura, teretiusculum, subtus concavum, ac si visceribus destitutum: macula diaphana, albida, utrinque versus basin. Aculeus exsertus, rigidus, recurvatus, vix abdomine longior. Pedes ferruginei, exceptis tibiis nigris. Palpi filiformes.

Ex Enum.

Quercus 18. C. (des rejetons)
furculi.

Hab. in galla mespiliformi superius circulo spinoso circumdata, ramuli quercus.

Aterrima. 19. C. (le charbon) atra, elevato punctata, tarsis pallidioribus.

Faun. Fridr. n. 595. an?

Hab. in Europa.

Obs. Lecta in tubere quod in caule residuo cujusdam plantæ copiosam inveni. Plantæ autem genus determinare ex solo eoque per hyemen pessime immutato, caule determinare non licuit; crediderim tamen parietariæ fuisse.

Desc. Tota atra, ad lentem elevato punctata. Abdomen ovatum, petiolatum. In fœmina aculei vagina subtus fere in medio affixa, flava. Aculeus ruber. Pedes nigri; tarsi fusci.

Rubi. 20. C. (le porte - or) punctata, sericeo-viridi aurata, seta ani corpore brevior.

Geoff. inf. parif. p. 297. n. 3.

Hab. in rubo cæſio.

Obſ. in caulibus rubi cæſii ejusque ramis tubera gignuntur ſtrumæque. Harum ſtrumarum quafdam, quum tempore verno adperuiſſem, larvam inveni flavam, ejus plane coloris, quem ovi vitellum habet. *Oculi* aurantii. *Alæ* nonnihil protuberantes, nec ita, uti in papilionibus, agglutinatæ. *Aculei* vagina ad dorfum reflexa. Hinc prodiit infectum M. Majo, punctato-ſericeo-viridi auratum, feta ani brevior, quam corpus ſit.

Phragmitis. 21. C. (des roseaux) nigra, antennarum baſi pedibusque teſtaceis, abdomine elongato in caudam porrectam latam.

Hab. in Europa, in arundinibus anni prioris. In inſulis Rhodanenſibus prope Lugdunum. V.

Deſc. Color niger. *Alæ*, venis perceptibilibus nullis, incumbentes, ac ſi unica eſſet. *Antennæ* nigrae, articulo tamen primo longiſſimo teſtaceo pedibusque teſtaceis. *Abdomen* poſtice attenuatur in caudam, ſupra cylindrico-teretem, ſubtus planam, apice leviter deflexam. Si adcurate hæc cauda inſpiciatur, ſemel articulata eſſe videtur.

Ex Faun. Fridr.

Viridis. 22. C. (le verd) antennis clavatis nigris, capite, thorace, abdomine æneo-viridibus, oculis rubris, femoribus nigris.

Hab. in gallis lanatis foliique plicati quercus.

Cardui. 23. C. (du chardon) antennis longitudine corporis , abdomine subtus fusco , supra nigro annulo tenui fusco.

Hab. in lanoso transparenti cardui.

Aurata. 24. C. (le doré) aurata viridis , antennis clavatis rubris , pedibus luteis.

Raf. inf. 3. t. 69.

Hab. in gallis quercus fasciatis.

Obs. Nec inf. parif. nec entom. parif. ad augendum hoc genus nobis utilia fuerunt. Pleraque insecta sub hoc genere in his operibus inscripta ad ichneumonis genus referenda sunt. *Ex. gr. le cynips doré à queue du bédégua lisse ; le cynips des chrysalides des papillons.* Ejusdem docti viri eleuphus verus ichneumon est ; nam , ut optime observavit immortalis Linn. genus proprium constituere non possunt antennæ vel pectinatae vel ramosae ; & , si *D. Geoff.* eleuphi foemina fuisset cognita , genus novum reliquisset , quum antennæ sint fractæ & clavatae. V.

Ex oper. D. de Geer.

Potentilla. 25. C. (de la potentille) capite thoraceque nigris , abdomine pedibusque rufis nitidis. *Retz. 292. - De Geer tom. 2. p. 898. t. 31. f. 12 , 13. t. 7. f. 14.*

Hab. in Europæ potentilla reptante. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput thoraxque aurato-viridia. Abdomen viride , maculis-lutescentibus. Antennæ pedesque lutei.

Ex Mantiss. D. Fab.

Adscendens. 26. C. (le relevé). ænea , abdomine

petiolato conico adscendente. *Mantiss.*
t. 1. p. 251.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Magna in hoc genere. *Antennæ* breves, moniliformes, nigræ. *Thorax* æneus, obscure nitidus, *scutello* acuminato. *Abdomen* petiolatum, æneonitidum, adscendens, compresso-conicum. *Pedes* pallidi, *femoribus* basi nigris.

GENUS II.

TENTHREDO. Os maxillis absque proboscide.
Alæ planæ, tumidæ.

Aculeus laminis duabus, ferratis, vix prominentibus.

Scutellum granis duobus impositis distantibus.

* *Antennis clavatis.*

Femorata. 1. T. (la difforme) antennis elevatis luteis, corpore atro, femoribus, posterioribus maximis. *

Alb. inf. t. 69.

Geoff. paris. 2. p. 263. t. 14. f. 4. capro niger, segmento primo margine inciso lunula flava.

Fab. 1.

De Geer tom. 2. p. 244. t. 34. f. 1. - 8. antennis capitatis, nigra abdomine

Tenthredinis *Larvæ* pleræque folia plantarum exedunt, polypodæ, seu pedibus plus quam XVI communiter instructæ, ita sæpius planam contorquentur; priores itaque antennis capitatis genere naturali non differunt.

macula flava , antennis pedibusque
obscure luteis.

Schæff. icon. t. 104. f. 1, 2.

Scop. Ann. hist. nat. 5. 120. 142.

Sulz. hist. t. 26. f. 4.

Frisch. inf. tom. 4. t. 25.

Hab. in alnetis.

Larva 22 poda viridis , linea dorsali
cærulescente duabusque aliis lutes-
centibus. Frequens in salicibus.

Desc. Major. Corpus atrum. *Antennarum*
clavæ ferrugineæ. *Femora* quatuor
posteriora magna & crassa. *Scutelli*
locus excisus & vacuus. *Faun. 1533.*

Obs. Variat magnitudine.

Marginata. 2. T. (la bordée) antennis clavatis apice
lutescentibus , corpore nigro , abdo-
minis segmentis posterioribus margine
albidis.

Fab. 5.

Enum. n. 649.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 822.

Hab. in Germania. P. Forskæhl. In Gallia
Aust. sed non frequens. Præcedente
multo minor magisque elegans. V.

Corpus magnitudine *apis* , nigrum , tho-
race capiteque villis albis canescentibus.
Abdominis segmentum 2 , macula mar-
ginali albida ; 3 , margine albido ,
medio interrupto ; 4 , 5 , 6 , 7 , margine
toto albido. *Pedes nigri. Tibiæ lutes-*
centes.

Lutea. 3. T. (la jaune) antennis clavatis luteis ;
abdominis segmentis plerisque flavis.

Scop. varn. 719.

Gæd. inf. t. t. 64.

List. Gæd. f. 77. a.

Frisch. inf. 4. t. 25.

Raf. Vesp. t. 13.

Fab. 3.

Albin. inf. t. 59. a. b. c.

De Geer tom. 2. p. 934. t. 33. f. 8.-16.
fusca, antennis capitatis, fasciis strigif-
que nigro-cærulefcentibus.

Schæff. icon t. 103. f. 2, 3.

Enum. n. 649.

Faun. Fridr. n. 599.

Hab. in falice, alno, betula.

Larva 22 poda glabra, viridis, lineâ
dorsali cærulea, nigro marginata. In
falice.

Obs. Errore typographico legitur in *syst.*
Pedibus 28. V.

Desc. Magnitudine crabronis, nigra,
hirsuta articulis 3, 4, 5, abdomina-
libus ferrugineis, reliquis nigris. *Fe-*
mora & tibiæ nigræ, palmis flavis.
Antennæ clavatæ, flavæ, infimo ar-
ticulo nigro. *Alæ*, venis atro-ferru-
gineis, margine postico fuscae. *Faun.*
1534.

Amerinæ. 4. T. (du saule pentandrique) antennis
clavatis, corpore cinereo, ano rufo,
labio albo. *

Scop. carn. 720.

Raf. inf. 2. Vesp. t. 1.

Fab. 4.

De Geer tom. 2. p. 948. t. 33 f. 17. 24.
nigra, antennis capitatis capitulo ferra-
gineo segmentis abdominalibus 4 fla-
vescentibus, primo interrupto.

Schæff. icon. t. 99. f. 8. 9.

Faun. Fridr. n. 600.

Gad. inf. I. t. 64.

Hab. in falice.

Larva rugosa, 22 poda, viridis, albo
irrorata.

Desc.

Desc. Media. *Corpus* nigrum, pube alba, unde cinereum adparet. *Plantæ* pedum ferrugineæ. *Anus* rufo - ferrugineus, ut & *Antennarum* clavæ. *Labium* oris magnum, orbiculatum, niveum. *Faun.* 1536.

Vitellinæ. 5. T. (la fêringue) antennis clavatis, ore elabiato, abdomine rufo, dorso nigro, femoribus posticis dentatis. *

Stroem. sondm. 171. t. 10. f. 11.

Fab. 7. antennis clavatis, abdomine supra nigro, lateribus rufis, femoribus posticis dentatis.

Hab. in salice. T. Bergman. In betula.

Stroem. In Gallia, prope Lugdunum in loco vulgo *Saussaie d'Oulins*. V.

Larva virescens per aperturam ante anum tanquam e siphone aquam expuit.

Fab.

Desc. Statura præcedentis, sed labio caret. *Corpus* nigrum pubescens. *Abdominis* omnia latera, uti subtus, rufa, dorso solo nigro. *Pedes* nigri, tibiis plantisque flavis. *Femora* postica prope apicem dentata. *Antennæ* nigrae. *Alarum* margo tenuior nigricans. *Faun.* 1535.

Lucorum. 6. T. (la sauvage) antennis clavatis nigris, corpore villoso atro. *

Fab. 2.

Hab. in betula, alno. In Gallia Aust. circa Lugdunum. V.

Desc. Magnitudo vulgaris bombylii, obtusissima. *Abdomen* subrotundum, depressum, villosum, atrum, holose- riceum. *Thorax* & *caput* nigra. *Antennæ* clavatae, nigrae, articulis sex, obtusissimæ. *Alæ* ferrugineæ, puncto

marginali nigro , oblongo , venis
rufis reticulatæ. *Variat* antennarum
clava nigra & ferruginea. *Faun.* 1537.

Fasciata. 7. T. (la fasciée) antennis clavatis ni-
gris , abdomine glabro atro , alis su-
perioribus fascia fusca.

Fab. 8. antennis clavatis nigris atra ,
alis anticis fascia fusca.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. aquis ,
sed antennæ flavæ , basi nigræ. V.

Abdominis segmentum punctum alæque ,
excepta fascia , alba.

Sericea. 8. T. (la foyeuse) antennis clavatis lu-
teis , thorace atro , abdomine æneo. †
Schæff. elem. t. 51.

Fab. 9.

Hab. Lipsiæ. In Gallia Aust. V.

Larva brevis , viridis , lineis 2 flavis ,
capite cinereo , fascia brunnea.

Caput æneum , oculis nigris. Thorax
lavis , niger , immaculatus. Abdomen
rotundatum , æneum , segmentorum anti-
corum basi cærulescente. Pedes testacei ,
femoribus nigris. Alarum margo cras-
sior testaceus. J. C. Fabricius.

Americana. 9. T. (l'Américaine) antennis subclavatis ,
thorace luteo , abdomine cæruleo , alis
nigris. *t. 7. f. 15.*

Hab. in America. *Rolander.* Prope Lug-
dunum. V.

Obs. Omnino similis tenth. *Americana*
Linn. An eadem ? Magnitudine tenth.
enodis , sed antennæ diversæ. V.

Nitens. 10. T. (la brillante) antennis clavatis lu-
teis , abdomine viridi - cærulescente
nitente. *

Scop. carn. 721.

Sulz. inf. t. 18. f. 109.

Fab. 9. β .

De Geer tom. 2. p. 1016. t. 38. f. 32.-34.
antennis clavatis 3 articulatis, viridi-
cæruleo nitens, pedibus flavis, alis
flavescentibus, macula fusca.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Larva 20 poda, brevis, viridis, lineis
duabus flavis, capite cinereo, fascia
brunnea.

Desc. Media. Caput & thorax villosus;
nigra. Abdomen viridi-cæruleo nitens.
Alæ ferrugineæ. Tibiæ flavæ. *Maris*
abdomen supra longitudinaliter nigri-
cans, antennis ferrugineis nec ut in
fœmina nigris. In abdominis dorso
macula nigra per 4 segmenta posticæ
extensa. *Pedes* lutei. *Faun.* 1539.

Obs. Hæc tenth. ut fœmina præcedentis
in *D. Fab.* speciebus & *D. de Geer*
n. 26. indicatur. Attamen mas & fœmina
in *Faun.* descripta fuerunt & *D. de*
Geer qui *nitentem* Linn. tenthredinem
indicat, fœminam descripsit. Reipsa in
nostro museo utriusque speciei mas &
fœmina reperiuntur. Ultima verba in
systemate addita dubium solvunt; nam
macula nigra in tenthredonis *nitentis*
dorso, quæ in tenth. *sericea* non vi-
detur; inde patet *D. de Geerum*
fœminam præcedentis descripsisse,
quamvis de macula nigra tacuerit. V.

Ex spec. D. Fab.

Tristis. 11. T. (la triste) nigra, antennis clavatis
luteis, nigra, alis apice fuscis.

Iter. Norwag. 334.

Hab. in insularum Sundmoerenfium betula. D. Stroem.

Larva viridis, linea dorsali azurea, atra & lutea fimbriata.

Obscura. 12. T. (l'obscure) antennis clavatis, corpore glabro nigro.

Hab. in Sueviæ nemoribus.

Desc. Corpus totum nigrum, immaculatum, alis folis albicantibus.

Ex enum.

Connata. 13. T. (l'épaulette) antennis clavatis, nigra, abdomine fasciis flavis.

Beytr. Zur. Nat. p. 83. §. 41.

Geoff. inf. parif. crabro I. p. 262.

Hab. in Europa. In Galliæ alno.

Desc. Major. Antennæ luteæ, clavatæ.

Thorax villosus, nigricans: maculis seu humeris luteis in parte antica ornatur.

Abdominis incisura prima nigra, in medio luteo maculata; 2da. uti 4ta.

nigra, lateraliter flava. Alæ flavæ nigro in medio maculatæ. Femora posteriora difformia quasi ex abdomine orta. inf.

parif. V.

*** Antennis non articulatis.*

Enodis. 14. T. (la violette) antennis clavato-filiformibus exarticulatis lævibus, corpore atro-cærulefcente.

Fab. 12.

De Geer tom. 2. p. 1025. t. 40. f. 1-6.

antennis clavatis 3 articulatis nigris, corpore alisque nigro-cæruleis nitidis.

Iter. Norwag. 64.

Enum. n. 651.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 825,

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Larva viridis, nigro punctata, linea laterali rugosa, flava, cauda acuta.

Obs. Animal pigerrimum, tardissimum. En. Corpus magnitudine tenth. pini, totum, etiam alis, atro-cærulescens. Antennæ subfiliformes, minime articulatae.

Ciliaris. 15. T. (la ciliaire) antennis filiformibus exarticulatis subtus ciliatis, tibiis posticis albis.

Hab. in Europa. In Gallia, prope Lugdunum lecta. Antennis facile distinguitur, imprimis ad lucem inspectis. V.

Corpus magnitudine tenth. enodis, sed totum, exceptis tibiis posticis, nigrum. Antennæ subtus pilis brevissimis ciliatae.

Ustilata. 16. T. (la brûlée) antennis subfiliformibus exarticulatis, corpore nigro, abdomine cærulescente, tibiis pallidis.

Sulz. inf. t. 18. f. 3.

Fab. 11.

Ad. Nidros 3. 373. 39.

De Geer tom. 2. p. 1018. t. 39. f. 14-20. antennis clavatis 3 articulatis, nigro-cærulescens nitida, antennis pedibusque nigris, alis fusco-hyalinis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Larva viridis, lineis duabus albis, capite testaceo, fascia obscura.

Alæ subferrugineæ, macula fusca. (Antennæ exarticulatae mihi, quæ absque geniculis continuæ sunt.)

Ex Enum.

Bicolor. 17. T. (la bédéaude) antennis exarticulatis, nigro-cyanea, abdomine alarumque basi flavis, alis fascia nigra.

F iij

Beytr. Zur. Nat. p. 84. sp. 42.

Hab. in Europa.

Desc. Caput, thorax, antennæ, quæ præter duos baseos articulos brevissimos non amplius articulantur, exteriorumque crassiores fiunt, & femora ac anus, nec non macula magna in alis anticis post medium ad marginem exteriorum, nigra; nervus tamen, cui macula adjacet, niger non est, sed croceus. Cæterum alæ usque ad marginem dilute crocæe sunt; macula sæpe cum opposita fasciam format, post maculam alæ excolores. Abdomen croceum, uti & tibiæ.

Ex Mantiss. tom. I. D. Fab.

Annulata. 18. T. (l'annulée) antennis clavato-filiformibus exarticulatis, nigra, abdomine flavo, tarsis posticis albo annulatis.

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Parva. Caput, cum antennis extrorsum crassioribus, nigrum. Labium pube argentea. Thorax subrus flavus, supra niger. Abdomen flavum, immaculatum. Alæ albæ, costa dimidiata atra. Pedes flavi, tarsis posticis nigris, albo annulatis.

Ex nost. mus.

Furcata. 19. T. (la fourchue) antennis ciliatis, exarticulatis, furcatis in mare, capite thoraceque nigris, abdomine flavescente. *Mas t. 7. f. 16; femina. 17.*

Hab. in Europa. In his regionibus non frequens.

Desc. Fæminæ Magnitudo tenth. ciliaris.

Antennæ ciliatæ. Alæ fuscescentes. Abdomen flavescens. Maris antennæ duplici ramo instructæ, ramis valde ciliatis. Primo intuitu quatuor antennis gaudere creditur. Ramis apice unitis, antennæ spatium ellipticum formant. Fœmina minor, sed similiter colorata.

*** *Antennis pectinatis.*

Pini. 20. T. (du pin) antennis pennatis lanceolatis, thorace subvillosa. *

Uddm. diff. 90. f. 13.

Fab. 17.

De Geer t. 2. p. 971. t. 36. f. 1. - 30. antennis pectinatis, pedibus griseis, mare nigro, fœmina grisea, capite maculisque nigris.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 286. n. 33.

Schæff. icon. t. 68. f. 7, 8?

Hab. in pini foliis.

Larva 22 poda, cærulea, extremitatibus fulvis.

Desc. Magnitudo cimicis. Corpus nigricans. Thoracis dorsum futuris variis. Alæ fuscæ, venis nigris, macula marginali nigra. Femora nigra. Tibiæ pallidæ. Antennæ atræ, corpore dimidio breviores, pectinatae, acuminatae, concavae: radiis circiter 20 subæqualibus, summis apice introrsum antrorsumque flexis. Fœmina duplo major grisea, capite nigro, antennis ferratis, mari dissimilis. Faun. 1540.

Obs. Aliæ species in pino reperiuntur. V.

Pini-minor. 21. T. (la petite) pedibus griseis, mare nigro, abdomine subtus pallide fusco, fœmina testacea abdomine viridi, subtus

nigro-lincato, capite griseo. *Retz.*
318. — *De Deer* 983. tom. 35. f. 24. — 27.
t. 7. f. 18.

Hab. in pino circa Lugdunum. V.

Pini-rufa. 22. T. (la rousse) mare nigro, abdomine
subtus pedibusque rufis, fœmina tota
rufa immaculata. *Retz.* 319. — *De Geer*
tom. 2. p. 986.

Hab. in pino ibid. prope Lugdunum. V.

Juniperi. 23. T. (du génévrier) antennis pennatis
obtusis, thorace glabro. *

Uddm. diff. 91. f. 12.

Sulz. inf. t. 18. f. 110. tenthredo ptero-
phorus.

— *hist. inf.* t. 26. f. 5, 6.

Fab. 16.

Entom. parif. fertilifera.

Hab. in junipero. In Gallia Aust. V.

Larva viridis, adspersa punctatis nigris.

Desc. Simillima tenthredini *pini* *syst.* sed
minor. *Corpus* nigrum. *Thorax* glaber.

Antennæ maris pectinatae, *tibiæ* &
femora fulva. *Fœmina* grisea, oculis

nigris, *antennis* ferratis, facie a mare
diversissima. *Syst. Faun.* 1541.

Ex spec. D. Fab.

Cephalotes. 24. T. (la tête noire) atra, antennis
pectinatis, abdominis quatuor flavis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Magna. *Caput* grande, atrum,
punctis tribus inter oculos lunulisque
duabus posticis flavis. *Antennæ* breves,
pectinatae, testaceae. *Thorax* ater, striga
antica interrupta glauca. *Abdomen* gla-
brum, atrum, cingulis quatuor flavis,
antere majore. *Pedes* ferruginei.

Dorsata. 25. T. (le dos noir) albida, antennis subpeffinatis, capite, thoracis abdominisque dorso nigris.

Hab. in Anglia. Mus. D. Bancks.

Desc. Statura tenthred. sericeæ. Antennæ multiarticulatæ, nigræ, pilis brevibus fasciculatis ferratæ. Caput nigrum. Thorax albidus, maculis tribus fere totum abdomen occupantibus. Abdomen albidum, dorso fusco, basi apiceque tamen albido. Pedes albi, femoribus intus linea atra.

**** *Antennis subclavatis, articulatis.*

Rustica. 26. T. (la rustique) antennis subclavatis, abdomine nigro, cingulis tribus flavis, posticis duobus interruptis. t. 7. f. 19.

Geoff. paris. 2. p. 276. n. II. t. 14. f. 5. antennis filiformibus 9 nodiis, nigra, fasciis abdominis flavis, pedibus flavis.

Fab. 35.

De Geer tom. 2. p. 951. t. 34. f. 9.-19.

Enum. n. 653.

Hab. in Europa. In caprifolio.

Larva 22 poda, albida, maculis undecim fasciis dorsalibus.

Os albicans. Thorax scutello & humeris singulis macula lutea. Fasciæ in abdominis segmento 2, 5, 6, utrinque. Pedes flavi. Genua postica nigra.

***** *Antennis filiformibus, articulis 7 l. 8, excepta basi.*

Scrophula- 27. T. (de la scrophulaire) antennis septennodiis luteis, abdomine cingulis quinque flavis, primo remotiore. *

Reaum. inf. tom. 5. t. 13. f. 12.-23.

Blackw. herb. t. 87. f. 10.

Geoff. paris. 2. p. 277. n. 13.

Fab. 18.

Enum. n. 663.

Faun. Fridr. n. 601.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 827.

Hab. in *scrophularia* varia.

Desc. *Caput* nigrum. *Maxillæ* nigrae, dentatae. *Oris* labium superius flavum; sub singulo oculo linea flava. *Antennæ* ferrugineæ sive fulvæ, clavatae, septem articulis, excepto infimo. *Thorax* niger, a basi ad alas utrinque linea flava; ad latera baseos punctum utrinque flavum & sub alæ insertionem macula flava; apex thoracis puncto flavo gemino, altero post alterum; ad basin femoris tertii parvis macula flava. *Abdominis* nigri segmenta 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lineis flavis terminantur, non vero 2, 3; ergo spatium latius inter lineam primam & secundam flavam tergi: subtus omnia segmenta margine flava sunt. *Femora* omnia nigra, sed tibiæ rufæ. *Alæ* hyalinae, puncto marginali ferrugineo & margine exteriori alarum majorum ferrugineo. *Facies* & magnitudo vespæ. *Mas* femoribus posticis subtus linea flava. *Fœmina* aculeo brevi.

Puppa pedibus instructa jacet intra terræ glebam (ad radices *scrophulariæ*) excavatam uti *scarabæi* puppa, ubi delitescit a præcedenti anno per hyemem in primum Junii.

Larva nivea, longitudine digiti transversa, crassitie pennæ anserinæ, capite nigro, pedibus 6 & 16 seu 22; tota superna superficie punctis nigris notata, quorum intermedia dorsalia paullo majora. *Faun.* 1545.

Abietis, 28. T. (du sapin) antennis septemnodis,
corpore nigro, abdominis segmentis
quatuor ferrugineis. *

Frisch. inf. 2 t. I. f. 21.-24.

Syst. nat. 10. n. 13, 27.

Fab. 28.

Geoff. parif. tom. 2. p. 285. n. 29.

Enum. n. 658?

Hab. in pino, abieti.

Desc. *Alæ* incumbentes, nigricantes,
diaphanæ. *Abdominis* tres vel quatuor
anteriores articuli rufescentes. *Corpus*
reliquum nigrum. *Pedes* rufi. *Faun.*
1546.

Obs. sub eodem nomine speciem diversam
descripsit. *D. de Geer.*

Padi. 29. T. (du prunier à grappe) antennis
septemnodis atra, femoribus tibiisque
albis. *

Hab. in pruni padi foliis. In Gallia, prope
Lugdunum. V.

Desc. *Antennæ*, caput, thorax, abdomen
atra. *Alæ* glaucæ, puncto marginali
oblongo, atro. *Femora* & *tibiæ* albæ,
sed *palmæ*, præsertim posticæ, nigræ.
Antennæ antrorsum exsertæ, 7 vel 8
articulis acuminatæ. *Faun.* 1544.

Obs. Parva est hæc species. V.

Cerasi. 30. T. (du cerisier) antennis septemno-
dis, corpore nigro, pedibus scutello-
que flavis. *

Scop. carn. 735.

Reaum. inf. 5. t. 12. f. 1.-5.

Fab. 22.

Faun. Fridr. n. 602.

De Geer tom. 2. p. 1007. t. 38. f. 16.-25.
antennis filiformibus 9 nodis, nigra,
pedibus fuscis, alis nigrescentibus.

Hab. in cerasi foliis, quæ involvit, ut mutetur.

Larva 20 poda, gelatinosa, nigra.

Desc. Corpus & omnia nigra, exceptis pedibus omnibus pallidis. *Scutellum* in hac flavescens est, & punctum sæpius flavum ante alas. *Faun.* 1547.

Salicis. 31. T. (du faule) antennis septemnodiiis, corpore flavo, vertice capitis thoracisque nigro. *

Reaum. inf. 5. t. 11. f. 10.

Fab. 19. antennis septemnodiiis, corpore variegato.

Enum. n. 683.

Geoff. parif. tom. 2. p. 272. n. 3.

De Geer tom. 2. p. 991. t. 37. f. 12.-22. antennis filiformibus 9 nodiis, abdomine pedibusque flavis, capite, antennis thoraceque nigris.

Faun. Fridr. n. 612.

Hab. in salicibus variis.

Larva per phalanges parallelas pascens, plana, hirsuta, flava, lineis utrinque duabus lateralibus e punctis nigris, capite nigro, pedibus 20. *Fab.*

Desc. *Abdomen* absque petiolo thoraci adnatum, totum flavum. *Thorax* flavus, sed in medio tergi macula magna nigra & subtus inter pedes primarios & secundarios macula magna nigra. *Caput* pone oculos nigrum.

Antennæ fuscae, 7 articulis, subulatae.

Alæ incumbentes, membranaceae, reticulatae, cum puncto marginali nigro,

Pedes flavi, sed *palmae* posteriores nigricantes. *Faun.* 1548.

Tenthredines coloribus variant sæpe. secundum sexum. Scop.

Obs. Variat. *Alia* omnino croceæ. *Alia* modo cum puncto marginali fusco, modo nigro marginatæ in margine exteriori: modo *thorax* croceus, modo in medio niger. Affinis *rosæ* tenthredini. V.

Mesomela. 32. T. (la mésomele) antennis septemnodiiis, abdomine subflavo, dorso nigro arcubus flavescentibus. *

Scop. carn. 723.

Sulz. inf. t. 18. *f.* 112.

Fab. 46. antennis septemnodiiis nigra, ventre pedibusque flavis.

Hab. in falice fragili. *Kækeritz.* In Gallia Aust. non rara. V.

Desc. *Alia* membranacæ; majores, margine exteriori nigro punctoque nigro oblongo. *Femora* & *tibiæ* pallidæ, postice nigræ. *Oculi* atrii. *Abdomen* subtus flavum, a tergo nigrum, lineis ad latera retrorsum flexis pallidis f. singulo segmento macula nigra semicirculari tecto, margine postico & laterali pallido. *Scutelli* apex flavo-albicans, intra quem macula flava & ad ejus latera puncta duo minima pallida. *Antennæ* nigræ, septem articulis. *Faun.* 1549.

Punctum- 33. T. (le point blanc) antennis septem-
album. nodiis, corpore nigro, abdomine lateribus albo, femoribus posticis rubris.

Fab. 44.

Enum. n. 669.

Beytr. Zur. Nat. p. 86. *§.* 47.

Hab. in Europa. In Bressiæ sepibus. V.

Similis *tenth.* rufipedi; macula alba ante alas. Abdominis segmenta lateribus alba. Pedes albidii: posteriorum femora sanguinea. Tibiæ vero luteo-annulatæ

in quibusdam , macula alba antè femora.

Rufipes. 34. T. (la rufipede) antennis septemnodiiis , corpore nigro , abdomine cingulis duobus luteis , pedibus rubris. *

Scop. carn. 728 ?

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis. V.

Desc. Media. Corpus nigrum. Antennæ filiformes. Oris labium flavum , acuminatum. Abdomen cingulis duobus ; priore fulvo , posteriore flavo. Pedes fulvi , plantis nigris ; posticæ tibiæ basi nigræ. Faun. 1550.

Campestis. 35. T. (la champêtre) antennis septemnodiiis , corpore nigro , abdomine cingulo flavo inæquali , antennis tibiisque flavis. *

Hab. in Europa. Prope Lugdunum frequens. V.

Desc. Media. Corpus nigrum. Antennæ flavæ ; punctum ferrugineum ante oculos. Scutellum flavum. Abdomen luteum , apice & basi atrum. Femora nigra. Tibiæ & plantæ flavæ. Alæ , macula ferruginea. Faun. 1551.

Atra. 36. T. (le velours noir) antennis septemnodiiis , corpore atro , pedibus rubris. *

Scop. carn. 729.

Fab. 33.

Geoff. parif. tom. 2. p. 283. n. 25.

Enum. n. 660.

Hab. in Europa.

Desc. Media. Corpus atrum. Os flavum. Pedes ferruginei. Faun. 1552.

Viridis. 37. T. (la verte) antennis septemnodiiis , corpore viridi , abdomine supra fusco. *

Fab. 21.

Faun. Fridr. n. 603.

Geoff. parif. tom. 2. p. 271. n. 1. viridis ,
capite thoraceque supra characteribus
nigris.

Sulz. inf. t. 18. f. 112.

Enum. n. 674.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 830.

Hab. in betula.

Desc. Media. *Corpus* flavo - virens.

Antennæ nigræ , fetacæ. *Oculi* nigri.

Caput inter oculos nigrum. *Thoracis*

dorsum nigrum. *Abdomen* dorso ni-

grum. *Femora & tibiæ* linea longitu-

dinali exteriori nigra. *Faun.* 1554.

Obs. Color variat : mox magis viridis ,
mox magis fuscus. *Fab.*

Ovata. 38. T. (l'ovale) antennis septemnodis ,
corpore atro , thorace supra rubro. *

Fab. 24.

Ad. nidros 4. 292. 64.

Enum. n. 688.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 830.

De Geer tom. 2. p. 955. t. 55. f. 1.-13.

antennis filiformibus , macula magna
rufescente in thorace.

Hab. in alni foliis larva lanata , discum

folii edens. *T. Bergman.* Pedibus 22. V.

Larva virefcens , pulvere albido fari-
naceo tefta.

Puppa intra folliculum duplicem. V.

Antennæ articulis 8 , *sub apice palli-*

diores. *Caput & thorax scabra.* *Thorax*

supra antice ruber. *Pedes anteriores*

pallidiores.

Alni. 39. T. (de l'aulne) antennis septemnodis ,
corpore nigro , thorace capiteque
rubris,

Reaum. inf. 5. t. II. f. 1, 2?

Fab. 25.

Faun. Fridr. n. 611.

Hab. in alni foliis larva, discum folii exedens, evitans adspectum spectatoris.

T. Bergman. In Gallia Aust. V.

Corpus simile tenthredinis, ovatae. Caput & thorax supra rubra. Pedes antici testacei. Videtur magis quam sexu a praecedente diversa.

Rosæ. 40. *T. (du rosier) antennis septemnodis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. **

Scop. carn. 722.

Raf. inf. 2. vesp. t. 2.

Reaum. inf. 5. t. 14. f. 10-12.

Geoff. paris. 2. p. 272. n. 4.

Fab. 39. antennis septemnodis nigra; abdomine flavo, alarum anteriorum costa nigra.

Merian. inf. Eur. t. 144.

Gæd. inf. 2. t. 3.

Ad. nidros 4. 290. 60.

Schæff. icon. t. 55. f. 10, 11.

Faun. Fridr. n. 604.

Podu gr. p. 103.

Enum. n. 684.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 830.

De Geer tom. 2. p. 1021. t. 39. f. 21.-29. antennis clavatis 3 articulatis, capite thoraceque nigris, alis superioribus nigro marginatis.

Hab. in rosa.

Obs. Ad hanc divisionem non pertinet; nam antennæ 3 articulatae. V.

Desc. Abdomen flavum. Thorax flavus, in medio tergi & medio sterni niger. Oculi & caput nigra. Pedes flavi, sed palmæ omnes articulis nigris. Antennæ nigrae,

nigræ, filiformes, 7 articulis; singulare est quod punctum marginale alarum, non ovatum sit, sed extensum longitudinaliter cum margine exteriorè alæ ad ipsam basin, nigrum. *Faun.* 1555.

Obs. Differt a *salicis* tenthredine: 1°. quod thorax totus niger; 2°. quod costa alarum superiorum basi fulva. *Enum.*

Bicincta. 41. T. (la double ceinture) antennis septemnodiiis, corpore atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flavis.

Enum. n. 664.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 831.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Lugdunum ubique. V.

Abdominis cingulum, in medio, e segmentis duobus flavis, sed in posteriore segmento interruptum.

Obs. 1. In *D. Fab.* speciebus tenthredo n. 31. *syst.* tenthredo livida n. 32; sub nomine tenthredinis cinctæ, pro una eademque specie enumerantur; sed mas tenthredinis bicinctæ cingulis flavis caret daturque alia quæ descripta est in *Faun.* sub nomine tenthredinis cinctæ n. 1556: hæc est *Syst. livida.* V.

Obs. 2. Mas totus niger cum foemina in *syst.* descripta, n. 31. copulatus, frequenter obvius est. *Pedes* ut in foemina, sed minus luteo variegati. V.

Cincta. 42. T. (la ceinture) antennis septemnodiiis, corpore atro, abdomine cingulo albo. *

Fab. 34. antennis septemnodiiis, nigra; abdominis cingulo tibiisque flavis.

Enum. n. 667.

Müll. *Lin. Nat. cl. v. p. 831.*

Hab. in rosa. In Bressia frequens. V.

Desc. Minor. Corpus atrum. Antennæ filiformes. Abdomen cingulo albo. Femora nigra, basi alba. Tibiæ rufæ, basi albæ. Faun. 1556.

Obs. Nomen cinclæ restitui, D. Schrank exemplum fecutus. V.

Livida. 43. T. (la livide) antennis septemnodis, corpore atro, abdomine supra infraque livido. *

Fab. 30.

Geoff. inf. tom. 2. p. 282. n. 22. nigra, antennarum apice albo, abdominis macula utrinque alba, apice fulvo.

Enum. n. 657.

Müll. *Lin. Nat. cl. v. p. 831.*

Faun. Fridr. n. 605.

Hab. in Europa.

Desc. Caput nigrum. Os album. Antennæ filiformes, nigrae, versus apicem nigrum albæ. Femora rufa, a tergo fusca. Thorax niger. Abdomen livido-ferrugineum, basi nigrum. Plantæ posticæ nigrae. Alter sexus antennis annulo albo utrinque ad basin abdominis, alter vero hac albedine caret. Syst. Faun. 1557.

Nigra. 44. T. (la noire) antennis septemnodis, corpore toto nigro.

Fab. 49. Panz: Faun. Germ. 52 t 11.

Enum. n. 677.

Müll. *Lin. Nat. cl. v. p. 831.*

Hab. Upsaliæ. Fabricius. In Galliæ arvis. Circa Lugdunum. V.

Desc. Magnitudo mediocris. Tota nigra; sed alæ hyalinæ. Superiorum costa nigra punctumque marginale nigrum.

Rapæ. 45. T. (de la rave) antennis septennodiis, corpore atro, ventre, pedibus scutelloque albidis.

Enum. n. 676.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 831.

Hab. in rapæ foliis. Ibid. in Gallia Aust. V.

Corpus nigrum, minus. Alarum margo usque ad stigma niger. Caput & thorax nigra, albo variegata. Abdomen nigrum, margine segmentorum tenuissime flavo. Abdomen subtus ad maximam partem album. Pedes albidī, extus nigri. Antennæ nigræ.

Septentrio-46. T. (la septentrionale) antennis septennodiis, pedibus posticis compressis dilatatis. * t. 7. f. 20.

Fab. 42.

Enum. n. 672.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 832.

De Geer tom. 2. p. 995. t. 37. f. 24.-28. antennis filiformibus 9 nodiis nigra, abdomine rufo, ano nigro, pedibus posticis longis, latis compressisque.

Schæff. icon t. 167. f. 5, 6.

Hab. in alno. T. Bergman. In Gallia Aust. Lugdunum prope. V.

Desc. Minor. Caput & thorax nigra. Antennæ nigræ, setaceæ, longitudine fere corporis. Abdomen ferrugineum, basi nigrum. Pedes ferruginei. Tibiæ posticæ basi albidæ, apice dilatato nigræ, uti etiam tarsus niger dilatatus. Faun. 1558.

Carbona- 47. T. (la charbonniere) antennis septennodiis atra, ore albo, tibiis anticis testaceis.

Fab. 48.

Hab. in Europa Australi. In Germania. Fab.!
Desc. Media labio flavescente. Pedes pos-
tice ante apicem albi. Fab.

Nassata. 48. T. (l'écussonnée) antennis septemno-
diis, corpore luteo, scutello albo,
alis fusco reticulatis.

Fab. 23. antennis septemnodiiis lutea,
scutello punctoque alarum albis.

Hab. in Europa. In Bressia frequens. V.
Corpus totum, exceptis oculis & stemma-
tibus nigris, flavum. Antennæ sub-
ferrugineæ. Alæ stigmatate pallido.

12-Puncta-49. T. (la ponctuée) antennis septemno-
*diis, corpore atro, punctis 12 albis. **

Fab. 43.

Hab. in Europa.

Desc. Corpus totum nigrum. Macula alba
utrinque ante alas in thorace. Scutel-
lum album. Tria segmenta abdominis
macula utrinque alba. Ultimum segmen-
tum abdominis apice album. Femora
secundi paris macula alba. Tibiæ an-
nulo flavo. Labia flava. Faun. 1559.

Ex Enum.

Pœcile- 50. T. (l'arlequine) antennis septemno-
diis pedibusque croceis, abdomine
flavo, apice nigro, alis flavescentibus,
apice fuscis, thorace rubro.

Scop. carn. n. 731.

Poda gr. p. 103.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra. Os flavum. Antennæ cro-
ceæ; reliquum caput nigrum. Thorax
ruber; pectus & latera nigra. Pedes
toti crocei. Ad basin apophyseos
femorum posticorum macula alba.

Abdomen flavum , apice late nigrum.
Alæ flavescentes , apice fusco.

Annularis. 51. T. (l'annulaire) antennis septemnodiiis atra , nitens , antennis apice albis , tibiis omnibus ferrugineis.

Beytr. Zur. Nat. p. 85. §. 44.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Omnibus ad basin apophyseos femorum posticorum macula alba & alia utrinque ad basin *abdominis*.

Fors var. *tenth. livida*.

α Variat labio superiori puncto albo notato.

β . . . Labio toto maxillarumque basi albis.

γ . . . Labio toto maxillisque basi albis.

Ferruginea. 52. T. (la ferrugineuse) antennis septemnodiiis nigris , albo annulatis , corpore saturate ferrugineo , thorace , pectore verticeque nigris.

Beytr. Zur. Nat. p. 84. §. 43.

Hab. in Europa.

Desc. Collum tegitur clypeo nigro albo marginato.

Solitaria. 53. T. (la solitaire) nigra , segmentis abdominalibus intermediis aliquot rufis.

Scop. carn. n. 738.

An *tenth. abietis* Linn.?

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Variat admodum hæc species.

α Labio superiore nigro , apice flavescente ; femoribus omnibus supra nigris. *Abdominis* annulis tertio , quarto , quinto rufis , linea flava ante exortum alæ.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 284. n. 26.

β *Antennis* totis nigris , ore albo , pedibus ferrugineis , femoribus omnibus supra nigris ; ad basin apophyseos femorum

posticorum macula alba; ad exortum
alæ lineola alba; cætera nigra. *Ab-*
dominis segmentum 3, 4, 5, tota
 ferruginea, 2 & 6 ad maximam partem.

γ *Labio* superiore albo, *maxillarum* quo-
 que parte exteriori alba. Ante oculos
 lineola alba & alia ante alas. *Thoracis*
 apice pustula *scutello*que albis, aliaque
 macula trigona, *scutello* obversa punc-
 tumque album ad utrumque latus, ita,
 ut *scutellum* cum macula obversa punc-
 tisque crucem formet. *Femorum omnium*
 apophyses, apice superno, puncto im-
 presso albo notantur; *femora postica*
 nigra, reliqua cum tibiis ferruginea.
Abdomen nigrum, segmentum 1 & 2
 utrinque puncto albido notantur, 3, 4,
 5 integra, 6 basi tantum ferruginea.

Obs. 1. Ad hanc varietatem retulit D.
Schrank species sequentes.

Geoff. inf. tom. 2. p. 279. n. 16.

—— *p. 284. n. 27.*

—— *p. 285. n. 28.*

—— *ibid. . . . n. 29.*

—— *p. 283. n. 24.*

Obs. 2. *Abictis tenthredinis* *fyst.* forsan
 omnes varietates. V.

Craffa. 54. T. (l'épaisse) nigra, pedibus punctif-
 que binis sub *scutello* elevatis rufis.

Scop. carn. 730.

Hab. in Europa.

Albicincta. 55. T. (la cordeliere) antennis septem-
 nodiis nigra, abdomine ad basin cin-
 gulo tibiisque omnibus annulo lacteo.

Beytr. Zur. Nat. p. 85. §. 45.

Geoff. tom. 2. p. 282. n. 23.

Hab. in Europa.

Obs. Variat annuli color : sæpe luteus.

Vespifer- 56. T. (la vespiforme) antennis septem-
nodis, flavis, segmentis abdominis
omnibus flavo marginatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. non
frequens. V.

Desc. *Antennæ* flavæ. *Caput* nigrum. *Os*
flavum totum. *Thorax* niger, linea
flava utrinque ante alas scutelloque
flavo. *Pedus* nigrum. *Pedes* flavi. *Femora*
parte postica & ultimi paris in-
tegra, nigra. Ad basin apophyseos
femoris postici macula flava. *Abdomen*
nigrum, segmentis omnibus apice
flavis.

Obs. Adeo *vespæ* similis coloribus abdo-
minisque structura, ut non sine metu
apprehendatur. V.

Semincta. 57. T. (la demi-ceinture) nigra, abdo-
mine cingulo postico fracto, flaves-
cente, pedibus abdominisque subtus
flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra, *subtus* tota flavo-albida.
Os flavum. *Thorax* supra niger. *Ab-*
domen supra nigrum, segmento tertio
toto, quarto lateribus anoque fla-
vescentibus. *Pedes* flavi, *femoribus*
superne linea tibiisque posticis totis
nigris.

Viennensis. 58. T. (la Viennoise) antennis septem-
nodis nigra, abdomine cingulis quin-
que flavis, antennis subclavatis fulvis
prope basin.

Hab. Viennæ. In Bressia frequens. V.

Desc. Nigra. *Antennæ* basi fascia fulva
cinguntur. *Pedes* flavi, *femoribus*
nigris. *Abdomen* fasciis quinque angustis
flavis, quarum una prope basin ; tum

post majusculum interjectum spatium duæ approximatae; tum aliæ duæ prope apicem. In *thorace*, ad basin alarum, puncta duo flava & ad apicem, *scutelli* loco, puncta duo flava approximata. Margo *alarum* exterior fuliginosus & punctum marginale subobsoletum.

Ribis. 59. T. (du groseiller) antennis septem-nodiis nigra, tibiis apophysisque femorum posticorum latere externo albis.

Scop. carn. 734.

Hab. in ribe rubro. *Ibid.* prope Lugdunum. V.

Desc. *Tota* nigra, sed pedum apophyses latere externo albæ. *Femora* basi alba. *Tibiæ* latere externo cum genubus albæ; *posticæ* basi, etiam latere externo, nigrae, genu tamen album. *Femorum* posticorum apophyses latae, albæ latere externo & in medio albedinis puncto nigro notantur. *Alarum anticarum* costa punctumque marginale nigra.

Larva folia exedit more phalænarum.

Puppa latitat intra folliculum diebus 12.

Obs. Similis tenth. *padi*, sed larvæ, saltem moribus, diversæ. V.

Fuliginosa. 60. T. (la fuligineuse) antennis septem-nodiis atra, alis fuliginosis.

Hab. in Europa. In Austria superiore. In Bressia. V.

Desc. Minor. *Tota* atra, pedibus exceptis, saltem in nostris. V.

Dealbata. 61. T. (la blanche) antennis septem-nodiis nigra, abdomine utrinque lateribus albo maculato, femoribus posticis clavatis flavicantibus.

Hab. in Europa. In Austria.

Desc. Atræ. Alæ hyalinæ; ante harum originem macula alba. Abdominis segmenta omnia lateribus albo marginata. Pedes ferruginei. Femora basi nigra. Femora postica crassa alba, basi nigra. Abdomen subtus cingulis aliquot albis.

Alneti. 62. T. (des aulnées) antennis septem-nodiis flava, abdomine supra nigro.

Hab. in alnetis.

Desc. Flava. Pedes & thorax fulva. Abdomen supra nigrum, lateribus flavum segmentique secundi apice toto flavo.

Obs. An tenth. viridis varietas.

Hæmato- 63. T. (l'ensanglantée) antennis septem-nodiis nigra, thorace antice utrinque rubro.

Hab. in Europa. In Austria. In Bressia. V.

Desc. Tota nigra. Thorax utrinque ante alas ruber. Alæ hyalinæ: superiores, costâ punctoque marginali nigris.

Fulviven- 64. T. (la précoce) antennis septem-nodiis atra, abdomine rubro fulvove.

Scop. carn. 736.

Hab. in Europa. In Austria Superiore. In Gallia Aust. V.

Desc. Thorax niger, modo fulvus, modo vero fulvo nigrove varius. Pedes colore abdominis, sed femora nigra. Alæ anticæ costâ punctoque nigris. Scop.

Obs. Variat pedibus nigris.

Erythrogo- 65. T. (l'érythrogone) antennis septem-nodiis nigra, femorum apicibus tibiarumque basibus rubris.

Fab. 32. gonagra. Antennis septemnodiis, corpore atro nitido, genibus testaceis.

Geoff. parif. tom. 2. p. 285. n. 31.

Hab. in Europa. Viennæ. In Gallia.

Desc. Nigra, in cinereum colorem vergens. Femora a medio ad apicem rubra. Tibiæ vero basi rubræ.

Fulvivenia. 66. T. (l'entourée) antennis septemnodiiis nigra , alarum margine exteriori fulvo.

Hab. in Europa. Viennæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra. Apices segmentorum abdominis colore lactis aqua diluti. Labium superius, margo alæ anticæ exterior & punctum marginale, crocea. Antennæ nigrae, basi fulvæ. V.

Ex entom. carn.

Montana. 67. T. (la montagnarde) antennis septemnodiiis nigra , tuberculis binis flavescens sub scutello, alis anticis costa nigris.

Hab. in Europa.

Desc. Mas inermis, totus niger. Tubercula scutello subdita, albida. Lamina maxillotega alba. Palpi albi. Pedes antiqui mediique toti pallide flavi; postici, femorum basi lutea. Abdominis apex lineola alba terminatur. Liguli bini albi genitalia protegentes.

Fœmina aculeata major. Linea thoracis utrinque flava, a basi alæ anticæ sursum tendens. Lamella maxillotega. Palpi albi. Pedes flavi ubi in mare albidii. Abdomen, basi fascia flava maculisque binis lateralibus utrinque. Tubera bina flava genitale protegentia.

Obs. In hac specie & in plurimis aliis

mas a foemina differt; nam color variat ratione sexus; inde calamitas descriptionis quæ, nisi utrinque sexus intuitu, nec felix nec accurata est. Cave igitur ne speciem pronunties, ignoto utroque sexu. V.

Temula. 68. T. (du perfil) antennis septemnodis nigra, ore punctis duobus sub scutello, abdominis cingulo tertio tibiisque flavis.

Hab. in Europa. In floribus petroselini temuli frequens. In Gallia, prope Lugdunum. V.

Desc. Abdomen subtus nullibi flavum, segmento quarto macula laterali flava, cingulo adjacente. Femora antica & media supra flavescentia, subtus nigra; postica tota nigra. Alæ anticæ, linea nigra marginali, costa antice ferruginea.

Cingulata. 69. T. (la mandarine) antennis septemnodis nigra, punctis binis sub scutello abdominis basi macula trigona cinguloque quinto flavis.

Hab. in Europa. In Bressiæ arvis. V.

Desc. Os nigrum. Palpi flavi. Cingulus abdomen totum ad-instar annuli amplexans. Femora postica subtus nigra, supra flava. Tibiæ rufæ.

Signata. 70. T. (la marquée) antennis septemnodis, nigra, punctis infra scutellum binis manibusque posticis flavescentibus.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Tota nigra. Macula albida ad bases femorum posticorum. Tibiæ anticæ & posticæ flavescentes. Alæ hyalinæ; anticæ costa nigra.

Impura. 71. T. (la mulâtre) antennis septemnodiiis tota nigra , alarum costa , tibiis , manibus antennarumque apicibus rufis , alis apice fuscis.

Hab. in Europa.

Desc. Corpus nitidulum atrum. Antennarum articuli tres ultimi rufi. Femora postica longiora & crassiora.

Ex spec. D. Fab.

Luteicornis. 72. T. (la lutéicorne) antennis septemnodiiis nigra , antennis , ore , abdominis basi tibiisque flavis. *Mantiss. tom. I. p. 254.*

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Statura & magnitudo sequentis. Caput atrum , ore toto flavo. Thorax niger , immaculatus. Abdomen basi flavum , apice nigrum. Alæ albæ , costa testacea , apice fuscae. Pedes flavi , femoribus quatuor anticis basi , posticis totis nigris. Punctum albidum supra basin femorum posticorum.

Flavicornis. 73. T. (la flavicorne) antennis septemnodiiis flava , capite caudaque nigris.

Hab. in Germania. In Italia. Dr. Allioni. In Galliæ Aust. pinis. V.

Desc. Caput atrum , antennis flavis. Thorax niger disco flavo. Abdomen subpellucidum , flavum , apice nigrum. Alæ hyalinæ apice fuscescentes. Pedes flavi.

Obs. Maris abdomen nigrum. V.

Cærulef- 74. T. (la violette) antennis septemnodiiis violacea , abdomine flavo , alis macula fusca.

Hab. in Angliæ nemoribus.

Desc. *Antennæ* breves, nigræ. *Caput* & *thorax* obscure violacea, immaculata, nitida. *Abdomen* flavum, ano violaceo. *Alæ anticæ* hyalinæ, macula magna marginis exterioris fusca, quæ fere fasciam constituit, at postice obsoletior. *Costa alæ* a basi ad maculam flavescens. *Pedes* nigri, tibiis femorumque posteriorum basi ferrugineis. *Affinis* tenth. *rosæ*.

Pavida. 75. T. (la craintive) antennis septemnodiiis nigra, abdomine segmentis tribus pedibusque ferrugineis.

Gæd. inf. 2. t. 17.

Reaum. inf. 5. t. 12. f. 19.-21.

De Geer tom. 2. p. 967. t. 35. f. 14.-18. antennis filiformibus novem articulatis, abdomine cylindrico nigro, medio rufo pedibusque rufis.

Hab. in Europæ rosis. *Ibid.* In Gallia, prope Lugdunum. V.

Larva viridis, pulvere albo farinaceo adspersa, capite flavo, pedibus 22.

Desc. Major tenth. *abietis*. *Caput* nigrum, ore albicante. *Scutellum* nigrum, utrinque puncto minimo ferrugineo. *Abdomen* nigrum, segmentis 3, 4, 5, ferrugineis. *Pedes* ferruginei, femoribus extus nigris.

Obs. *Alæ* abdomine breviores. V.

Germanica. 76. T. (l'Allemande) antennis septemnodiiis, corpore nigro, thorace antice abdomineque rufis.

Hab. in Germaniæ nemoribus. In Bressia. V.

Desc. *Statura* omnino tenth. *abietis*. *Thorax* antice & totum *abdomen* rufum.

Albicornis. 77. T. (l'albicorne) antennis septemnodiiis apice albis atra , tibiis testaceis , alis apice fuscis.

Geoff. tom. 2. p. 282. n. 23. an?

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Magna & brevis. Antennæ apice omnino albæ. Corpus atrum , immaculatum. Pedes testacei , femoribus nigris. Alæ albidæ costa testacea apiceque fusca.

Obs. In nostris speciminibus antennarum apices pedibus concolores , scilicet testacei , cætera similia. V.

Lateralis. 78. T. (la latérale) antennis septemnodiiis nigra , dorso medio rufo lateribusque albis. *It. Norwag.*

Hab. in Sueciæ floribus. In Bressia , propè Lugdunum. V.

Desc. Media. Antennæ magnæ , flavescentes , articulis longis , sed septem. Caput & thorax nigra. Scutellum luteum. Puncta tria lutea sub scutello. Pedes posteriores fusci , anteriores pallide testacei. Dorsum in medio lateribusque testaceum. V.

Costalis. 79. T. (la liserée) antennis septemnodiiis nigra , alarum costa ferruginea.

Hab. in Germania. D. de Hattof. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura brevis tenth. rosæ. Corpus nigrum , ano. strigis aliquot albidis. Costa alarum anteriorum , a basi ad punctum ordinarium ferruginea.

4-Macula- 80. T. (la quadrimaculée) antennis septemnodiiis nigra , pedibus posticis rufis.

maculisque duabus baseos albis. *Mantiss.*
tom. 1. p. 255.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorf.*

Desc. Caput, thorax, abdomen atra, nitida, immaculata. Alæ hyalinæ, puncto marginali nigro. Pedes nigri, posticis femoribusque nigris. Maculae duæ albæ supra basin femorum posticorum.

Morio. 81. T. (la Négresse) antennis septemnodis atra, pedibus pallidis.

Hab. in Germania, *D. de Hattorf.* In Gallia Aust. V. *Panz:* 49. tab: 17.

Desc. Statura brevis. Corpus totum atrum, immaculatum. Pedes omnes pallidi.

Obs. Variat pedibus variegatis. An morio nigra?
D. Fab. 49. species diversa? V. *vide*
p. 90 n. 44 hujus libri.

Blanda. 82. T. (l'agréable) antennis septemnodis atra, abdomine medio rufo, femoribus posticis macula alba.

Hab. in Anglia. *Mus. D. Banks.*

Desc. Magna. Caput nigrum, macula pallida sub antennis. Thorax niger. Abdomen nigrum, segmentis, 2, 3, 4, 5, antice nigris. Pedes nigri, femoribus posticis basi macula oblonga, nivea.

Obs. Adeo numerosæ sunt tenthredines nigrae quarum abdomen in medio rufum est, ut non sine errore species pro varietatibus aut varietates pro speciebus determinantur, omnes modo describam. V.

Opaca. 83. T. (l'opaque) antennis septemnodis atra, thorace utrinque macula apicis rufa.

Hab. in Sueciæ hortis.

Desc. Statura præcedentis, tota atra, at macula triangularis rufa utrinque in apice thoracis.

Ex oper. D. de Geer.

Papillofa. 84. T. (la mamelonnée) antennis filiformibus, capite thoraceque nigris, abdomine flavo, superne serie punctorum nigrorum. *Retz.* 306. — *De Geer tom. 2. p. 982. t. 37. f. I. — II.*

Hab. in salice. Prope Lugdunum in loco dicto Saussaie d'Oulins. V.

Larva viridis, nigro lineata, pedibus 20 facta, quinque papillæ exeunt ex quibus transudat liquor foetidissimus.

Betulæ. 85. T. (du bouleau) antennis filiformibus, abdomine pedibusque flavis, capite, antennis thoraceque nigris. *Retz.* 308. — *De Geer tom. 2. p. 994. t. 37. f. 23.*

Hab. in betula.

Larva viridis, lateraliter lutea, pedibus 20.

Obs. Adeo affinis *salicis* tenthredinis, ut vix distinguatur; species tamen diversa, ut larvis adparet.

Nigrata. 86. T. (la noircie) antennis filiformibus rufa, abdomine annulis nigris. *Retz.* 310. — *De Geer tom. 2. p. 1000. t. 38. f. 2. — 4.*

Hab. in salice. In Gallia. Aust. V.

Larva nigra, pedibus 20.

Desc. Rufa sunt caput, thorax & abdomen: nigra oculi, thorax supra: Pedes obscure lutei. Alarum nervi nigri. V.

Pini. 87. T. (du pin) antennis filiformibus nigra;

nigra, pedibus viridi-nigroque variegatis, thorace maculis 2 lateralibus viridibus. *Retz.* 311. - *De Geer tom.* 2. p. 1001. t. 38. f. 5.-7.

Hab. in pinis. In Gallia. *Aust.* V.

Larva viridis, pedibus 20.

Desc. Parva. *Caput & corpus* supra nigra. *Thorax abdomenque* infra virescentia. *Antennæ* nigræ. V.

Salicis 88. T. (du faule pentandrique) antennis pentandræ. filiformibus nigra, pedibus flavis, alis superioribus nigro marginatis. *Retz.* 314. - *De Geer tom.* 2. p. 1009. t. 39. f. I.-II.

Hab. in salice pentandra.

Larva albida, capite nigro, pedibus 20.

Salicis 89. T. (du faule cendré) antennis filiformibus nigra, pedibus abdomineque subtus testaceis.

Hab. in salice cinerea. *Ibid.* in Gallia. *Aust.* V.

Larva griseo-albida; pedibus 20.

Desc. Parva. *Tota* nigra. *Pedes* fusci. *Alæ* diaphanæ opali coloribus nitentes. V.

Ex hist. inf. parif. entom. que parif.

Crocea. 90. T. (la safranée) crocea, antennis oculisque nigris.

Hab. in floribus.

Desc. Variant *antennæ*, modo nigræ, modo apice crocææ. *Thorax* croceus, sed linea nigra transversa signatus, duobus punctis nigris notata. V.

Ochroptera. 91. T. (l'ochroptere) nigro-cærulescens; tibiis alisque exterioribus crocæis; macula marginali fusca.

Insect. Tomus III,

H

114 INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo.

Hab. in Europa.

Desc. Tota cæruleo-nigra. Pedibus alisque flavis mox dignoscitur. Variat magnitudine. V.

Maculata. 92. T. (la tachetée) nigra, thorace maculis flavis, abdomine luteo basi & apice nigro, pedibus variegatis.

Hab. in Europa. In Gallia.

Obs. Variat magnitudo; nam, licet thorax sit aliquoties omnino niger, mera varietas mihi videtur. V.

Punctata. 93. T. (la ponctuée) nigro-cærulea, alis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus primo & ultimo macula lutea.

Hab. in Europa.

Bifasciata. 94. T. (la bifasciée) nigra, segmentis abdominalibus primo & quinto luteis.

Hab. in umbelliferis.

Trifasciata. 95. T. (la trifasciée) nigra, pedibus abdominalisque segmentis primo, quinto, sexto & ultimo margine flavis.

Hab. in Europa.

Obs. Minor. Præcedentibus affinis. V.

Virgata. 96. T. (la vergée) nigra, pedibus segmentorumque abdominalium marginibus, excepto, 2, 3 & 5, flavis.

Hab. in floribus.

Obs. Forte varietas præcedentium.

Multifasciata. 97. T. (la rayée) nigra, segmentorum abdominalium annulis omnibus flavo cinctis.

Hab. in Europa. In his regionibus non frequens. V.

Desc. Tenth. vespiformi similis, sed

magis elongata corpusque arctius. *Alæ* lutescentes. *Antennæ* nigrae basi rufæ. *Pedes* rufi. V.

Cordata. 98. T. (le porte-cœur) nigra , thoracis apice maculis albis , pedibus anticis abdominisque postica parte ferrugineis. *Hab.* in Europa. Frequens in Gallia Aust. nemoribus. V.

Obs. Colore nec antennis minime determinanda est hæc tenthredo , sed punctis thoracis apicis quæ semper quatuor sunt : antè majus : alia quatuor cruciata , modo albida , modo flava. V.

Stellata. 99. T. (l'étoile) nigra , thoracis apice macula flava , segmentis abdominalibus utrinque maculis flavis.

Hab. in Europa.

Obs. Inter magnas numeranda. *Abdomen* depressum lateraliter flavo maculatum. *Pedes* lactei , supra nigri. V.

Labiata. 100. T. (la labiée) nigra , thorace , maculis tribus abdominisque apice flavis , pedibus flavo nigroque variegatis.

Hab. in umbelliferis.

Obs. *Alæ* flavescentes. Maris femora posteriora ut suspicatur. *D. Geoff.* V.

Cærulef- 101. T. (la bleuâtre) tota nigro-cærulea , alis
cens. nigricantibus , margine exteriori nigro:

Hab. in Europa.

Obs. Tristi colore facile dignoscenda. Margo alarum crassa. V.

Vernalis. 102. T. (la printanière) nigra , thorace rubro. *Hab.* in Europa , primo vere.

Desc. *Corpus* nigrum. *Thorax* ruber. *Alæ* nigricantes. *Pedum* genua pallida. V.

116 INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo¹

Astroites. 103. T. (l'étoile d'or) nigra , humeris ; thoracis apice tibiisque luteis.

Hab. in Europa.

Obs. In nostris speciminibus punctum alarum marginale luteum , abdominisque incisuræ viridi variegatæ. V.

Perlata. 104. T. (la perlée) nigra , thoracis apice flavo , pedibus abdominisque medio ferrugineis , palmis posticis albo maculatis.

Hab. in Europa.

Obs. Margo alarum anticarum prope punctum marginale albicans. V.

Palmata. 105. T. (la palmée) nigra , humeris thoracisque apice flavis , pedibus abdominisque medio ferrugineis , palmis posticis albis.

Hab. in Europa.

Apicaris. 106. T. (la ferrugineuse) ferruginea , thoracis apice flavo , oculis nigris.

Hab. in Europa.

Thoracica. 107. T. (la variée) nigra , thoracis apice maculis albis , pedibus ferrugineis.

Hab. in Europa.

Obs. Frequens prope Lugdunum. Pedes variegati. V.

Viridescens. 108. T. (la verdâtre) nigra , pedibus , lateribus thoracis abdominisque viridescentibus.

Hab. in Europa.

Desc. Antennæ lutescentes. Caput nigrum. Labium superius viridescens. Thorax & abdomen nigra , segmentis omnibus lateraliter viridi marginatis. Alæ fuscæ , venosæ , absque puncto marginali ,

margine exteriori minime crasso. *Pedes* viridi-lutescentes. V.

Ex nost. mus.

Tibialis. 109. T. (la tibiale) tota nigra , tibiis posticis luteo-albis.

Hab. in Europa.

Desc. Major inter mediocres. *Alæ* luteo-fuscæ. *Tibiæ* posticæ solæ albæ.

Annula- 110. T. (l'annulaire) nigra , thorace antice ris. viridi maculato , abdominis segmentis viridi cinctis.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* nigrae , basi viriscentes , *Caput* nigrum. *Labium* viride. *Thorax* niger , lateribus viridibus , maculis magnis viridibus in apice. *Abdominis* incisuræ omnes nigrae , margine viridi. *Subtus* albo-virescens. *Pedes* postice elongati supra nigri , infra virescentes.

Semi- 111. T. (la femi-annulaire) nigra , seg- annularis. mentis *abdominis* semiannulis viridibus cinctis.

Hab. in Europa.

Desc. Minor præcedenti cui affinis , sed *thorax* niger. Incisuræ *abdominis* , supra segmentis viridibus in medio oneratae. *Subtus* maculae curvæ virides longitudinaliter & lateraliter in duplici serie digestæ.

***** *Antennis setaceis , articulis plurimis.*

Erythro- 112. T. (l'érythrocéphale) antennis seta- cephalis. ceis , corpore cæruleo , capite rubro. *

Puncta 2 elevata , tamquam petiolorum rudimenta , in plerisque tenthredinibus , pone scutellum prodeunt.

Uddm. diff. 89.

Fab. 51.

Sulz. inf. t. 18. *f.* 113.

Schæff. icon. t. 96. *f.* 9.

De Geer tom. 2. p. 1038. *t.* 40. *f.* 19, 20.
antennis setaceis 24 nodiis, corpore
cæruleo-viridescente nitido, capite
flavo.

Hab. in pino sylvestri. In Gallia prope
Lugdunum, in loco vulgo *Francher-*
ville. V.

Desc. Media. Corpus, alæ & omnia
cærulescentia. Caput rubrum. Antennæ
& oculi rubri. Mas totus ater, ore
tibiisque anticis luteis. Faun. 1560.

Sylvatica. 113. T. (la sauvage) antennis setaceis,
corpore nigro, pedibus thoracisque
characteribus flavis. *

Fab. 52.

De Geer tom. 2. p. 1040. *t.* 40. *f.* 23.
antennis setaceis 30 nodiis flavis,
corpore nigro, pedibus fulvis.

Hab. in pado. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput nigrum, postice duabus
lineolis flavis; maxillæ rufo bidentatæ.
Thorax niger, apice flavo, lateris-
que basi tuberculo flavo. *Abdomen*
nigrum. *Pedes* flavi, sed femora 1, 2.
versus basin nigra. *Alæ* nigro-nitidæ
venis atris, macula marginali ovata,
atra. *Antennæ* setacæ, articulis plus-
quam triginta. *Faun.* 1561.

Nemora- 114. T. (la faune) antennis setaceis, cor-
lis. pore atro, abdominis segmentis lateri-
bus albis.

Enum. n. 680.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 883.

Hab. in Europa.

Cynobasti. 115. T. (du rosier) antennis setaceis , corpore atro , pedibus ferrugineis , posticis albo nigroque annulatis. *

Reaum. inf. 5. t. 15. f. 1.-6.

Geoff. paris. 2. p. 287. n. 36.

Fab. 53.

Faun. Fridr. n. 606.

Enum. n. 689.

Hab. in rosa.

Desc. Inter parvas est : facies ichneumonis. *Abdomen* lineare , totum atrum. *Femora & tibiæ & palmæ* omnes ferrugineæ , exceptis posticis albo-nigroque variis. *Antennæ* atræ 18 articulis. *Faun.* 1563.

Populi. 116. T. (du peuplier) antennis setaceis atro-cærulescens , ore , palpis tibiisque anticis flavis.

Fab. 55.

Hab. in populo. T. Bergman. In Gallia Aust. V.

Corpus mediocre. Antennæ multis articulis. Alæ fuscescentes. Thorax niger , pectore utrinque colore luteo contaminato , marginibus flavis. Abdomen luteum , dorso maculis atris , transversis , opacis.

Vasfra. 117. T. (la rusée) antennis setaceis , capite nigro albo-variegato , pedibus testaceis.

Fab. 56.

Hab. in Suecia. T. Bergman.

Simillima tenthred. reticulatæ , sed paullo minor. Caput simillimum , sed scutellum lateribus flavum. Alæ fuscescentes , nec maculatæ. Pedes testacei , nesi nigri.

Reticula- 118. T. (la reticulée) antennis setaceis ,
ta. alis pallido fuscoque variis , venis
elevatis albis reticulatis. *

Hab. in Finlandia. T. Holm.

Desc. Media. Caput flavum , nigro va-
riegatum. Antennæ setaceæ , nigræ.
Thorax niger , antice lamina trans-
versa flava. Abdomen flavum , ano
nigro. Pedes nigri. Alæ fuscæ , albo
variegatæ , venis etiam elevatis albis
reticulatæ. Faun. 1564.

Betulæ. 119. T. (du bouleau) antennis setaceis ,
corpore rubro , thorace , ano , oculis
nigris , alis postice fuscis. *

Fab. 57.

Enum. n. 690.

De Geer tom. 2. p. 1039. t. 40. f. 21.
antennis setaceis 24 nodiis , abdomine
fulvo , oculis , thorace anoque nigris ,
macula alarum fusca.

Hab. in betulis. D. C. Solander. In Gallia
Aust. V.

Desc. Magnitudo & statura tenthr. ery-
throcephalæ. Antennæ setaceæ , rubræ ,
apice fuscæ , articulis 24. Caput ru-
brum , tinea 2 longitudinalibus. Oculi
nigri ; puncta 3 conglobata verticis.
Thorax niger , antice ruber. Abdomen
rubrum , postico segmento nigro. Pedes
rubri. Alæ glaucæ , versus apices
fuscæ. Faun. 1565.

Salicium. 120. T. (la bizarre) antennis setaceis ,
corpore nigro , abdomine luteo.

Fab. 58.

Enum. n. 687.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 834.

Hab. in Suecia.

Desc. Insectum totum , etiam pedibus ,

atro-cæruleum. *Abdomen* totum croceum. *Alæ* fuscæ; *superiores* margine maculaque nigris. Tardum animal. *En.*

Flava. 121. T. (la jaune) flava, macula alarum ferruginea. *

Scop. 731?

Reaum. inf. 5. t. 10. f. 6, 7.

Fab. 60.

Faun. Fridr. n. 607.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo formicæ minoris. *Corpus* ventricosum, totum flavum. *Oculi* nigri. *Alæ* flavo-griseæ, in medio macula ferruginea obsoleta. *Faun.* 1567.

Intercus. 122. T. (la mineuse) nigra, pedibus flavis, antennis subclavatis. *

Hab. in foliis arctii, atropæ, *Chenopodii* vulvariae, subcutanea.

Corpus statura & magnitudine ichneumonis globati s. glomerati, atrum totum. *Abdomen* exacte ovatum, acutiusculum, non longum. *Pedes* toti albi. *Antennæ* subclavatæ, breviores, profunde articulatæ, hyalinæ. *Sequentium metamorphosin* non vidi.

Rumicis. 123. T. (de la patience) rumicis lapathi.

Reaum. inf. 5. t. 10. f. 13, 14.

Faun. Fridr. n. 609.

Hab. in rumicibus lapathis dictis.

Ulni. 124. T. (de l'orme) ulmi campestris.

Reaum. inf. 5. t. 10. f. 14.-16.

Faun. Fridr. n. 610.

Hab. in ulmi campestris foliis.

Larva 22 poda, linea fusca longitudinali in medio dorsi.

Pruni. 125. T. (du prunier) pruni.

Reaum. inf. 5. t. 12. f. 13.-16.

Hab. in pruno.

Larva viridis, spinosa, spinis albis.

Desc. Corpus luteum, alæ virescenti-fuscæ.

Obs. Tacta, rore viscoso tegitur. *Reaum.*

Lonicæræ. 126. T. (du chevre-feuille) fusca, tomentosa, nitens, antennis subclavatis, alis ferruginescentibus.

Enum. n. 692.

Reaum. inf. 5. t. 13. f. 8.-10.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 836.

Hab. in lonicera.

Capreæ. 127. T. (du faule-marceau) falicis.

List. Gæd. 125. f. 49.

Gæd. inf. 1. t. 19.

Alb. inf. t. 59. f. g. h.

Frisch. inf. 6. t. 4.

Reaum. inf. 5. t. 11. f. 5, 6.

— 1. t. 1. f. 18.

Geoff. parif. 2. p. 281. tenthredo novemnodia flava, capite thoraceque supra nigro.

Faun. Fridr. n. 612.

Enum. n. 685.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 836.

Hab. in falicibus, fragili, caprea.

Larva cyanea, segmentis tribus primis ultimisque corporis fulvis, maculis nigris ordinibus 9. Pedes 20; ad metamorphosin absolutam perducere hanc non potui.

Obs. Differt a tenth. rosæ, quod costa tota nigra & ante alam tumor longitudinalis fulvus; quod etiam pectus totum flavum, quod in priori nigrum. Cæterum hæ differentię tantæ non sunt, ut non

recte existimare videatur ille, qui tenthredinisque *rosæ*, fere non nisi loco differentes, suadere videntur. *Enum.*

Ex spec. D. Fab.

Signata. 128. T. (la marquée) antennis fetaceis pallida, thorace maculis tribus dorsalibus longitudinalibus nigris.

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Corpus pallidum. Antennæ supra fuscæ. Caput vertice puncto nigro. Thorax maculis tribus dorsalibus longitudinalibus atris. Abdomen basi litura nigra. Pedes pallidi.

Hæmorroi-129. T. (l'hémorroïdale) antennis fetaceis atra, ano pedibusque testaceis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus parvum atrum. Antennæ fetacæ, nigræ, longitudine corporis. Abdomen atrum, ano rufo. Pedes testacei, femoribus basi nigris.

Lucorum. 130. T. (la Sibylle) antennis fetaceis, abdomine medio rufo, scutello punctoque alarum albis.

Hab. in Angliæ nemoribus. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo tenthredinis abietis. Caput & antennæ nigræ, ore flavescente. Thorax ater, lineola ante alas scutelloque albis. Abdomen nigrum, segmentis 3, 4, 5 rubris. Pedes rufi. Alæ hyalinæ, puncto ordinario marginali nigro & in hoc stigma album.

Ex Enum.

Depressa. 131. T. (l'aplatie) capite thoraceque nigro ;
 caracteribus flavis , pedibus abdomi-
 neque ferrugineis.

Geoff. tom. 2. p. 281. n. 21.

De Geer tom. 2. p. 1040. t. 40. f. 22.

Hab. in Europa.

Desc. Tenth. *betulæ* simillima eodemque
 modo depressa. *Antennæ* setaceæ , fulvo-
 testaceæ , articulis plurimis. *Caput*
 subquadrangulum , margine omni mac-
 culisque flavis ; lineæ duæ longitudi-
 nales excavatæ. *Os* flavum. *Thorax*
 niger , flavo varie maculatus. *Alæ* fere
 reticulatæ , subcroceæ , puncto margi-
 nali croceo. *Abdomen* fulvum. Subtus
pedus nigrum , linea utrinque obliqua
 flava , lata. *Pedes* flavo-ferruginei.

Obs. Primo intuitu , *mas* & *fœmina*
 separatim lecti ut diversæ species vi-
 derentur ; inde hujus generis specie-
 rum calamitas & incertitudo , nisi
 copula junctæ sumantur saltem non-
 nullæ. In uno sexu *antennæ* fulvæ ,
 in altero nigræ caputque antennis
 concolor. In utroque sexu *abdomen*
 nigrum , at in *fœmina* prima segmenta
 nigra. Tenth. *betulæ* affinis. Capitis
 structura singularis. V.

Linearis. 132. T. (la linéaire) antennis multinodiis
 nigra , tibiis abdominisque filiformis
 cingulis quinque flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Ex hist. inf. parif. entom.que parif.

Rubi. 133. T. (de la ronce) nigra , puncto tho-
 racis , luteo , pedibus abdominisque
 medio ferrugineis.

Hab. in Europa.

Obs. An species, an tendr. cynobasti
varietas?

Longicor-134. T. (la longicorne) nigra, segmentis
abdominalibus margine flavis, antennis
duas tertias corporis partes æquan-
tibus.

Hab. in Europa.

Desc. Antennæ nigræ. Caput nigrum,
maxillis luteis. Thorax niger, macula
apicis lutea triangulari. Abdominis
incisuræ nigræ, citrino marginatæ.
Pedes variant : modo citrini unico-
lores, modo femora nigra; modo
toti fulvi. V.

Obs. Nomen triviale fallax; nam in
plurimis hujus divisionis speciebus,
antennæ duas tertias corporis partes
æquant.

Longicol-135. T. (l'extraordinaire) nigra utrinque
lis. luteo maculata, collo elongato.

Hab. in Europa.

Prolonga-136. T. (la prolongée) nigra, pedibus
abdominisque medio fulvis, collo
elongato.

Hab. in Europa.

Ex nost. mus.

Inanita. 137. T. (la diaphane) nigra, antennis
fulvis setaceis, abdomine fulvo, dia-
phano, apice nigro. tom. 7. f. 21.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud
frequens.

Desc. Tenth. *betulæ* affinis, sed diversa.
Caput nigrum. Labium luteum. Sub
oculis puncta duo flava. Abdomen

fulvum , diaphanum , basi apiceque
nigrum.

Scutellata. 138. T. (l'écussonnée) nigra , thorace
rubro , scutello prolongato , apice
nigro.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Parva & crassa. Nigra sunt an-
tennæ , caput , abdomen femoraque
posteriora. *Thorax* ruber , prolongatus
ut in cimicibus scutellatis , acuminatus ;
acumine nigro. *Pedes* thoraci con-
colores , exceptis femoribus posticis
nigris.

GENUS III.

SIREX. Os maxillis 2 validis. Palpi 2 truncati.

Antennæ filiformes , articulis ultra 24.

Aculeus exsertus , rigens , ferratus.

Abdomen sessile , mucronatum.

Alæ lanceolatae , planæ omnibus.

Gigas 1. S. (le géant) abdomine ferrugineo ;
segmentis 3 , 4 , 5 , 6 nigris , thorace
villosa. *

Scop. carn. 739.

Linn. act. Stockh. 1739. t. 3. f. 7.

Reaum. inf. 6. t. 31. f. 1 , 2.

Ræf. inf. 2. *Vesp.* t. 8 , 9.

Sulz. inf. t. 18. f. 114.

Poda inf. t. 1. f. 6.

Ichneumonis Larvæ plerumque intra alia insecta , & imprimis intra
larvas lepidopterorum aliorumque vivunt , quas intus consumunt ;
siticis vero rodunt & perforant ligna , sunt que hexapodæ tantum.

Geoff. parif. 2. p. 265. t. 14. f. 3. urocerus.

Fab. 1. abdomine basi apiceque flavo, corpore nigro.

Schæff. elem. t. 1. f. 2. & t. 13. f. 8. & t. 132.

— *icon.* t. 53. f. 15.

Faun. Fridr. n. 613.

Seb. mus. 4. t. 53. f. 15.

De Geer tom. 1. p. 564. t. 36. f. 1.-5. abdomine dimidio nigro, thorace nigro, antennis pedibusque flavis.

Enum. n. 694.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 837.

Hab. in arboribus coniferis.

Desc. Major reliquis. *Caput* nigrum, pone oculos flavum. *Thorax* niger totus, hirtus, basi utrinque flavescens, puncto prominulo. *Alæ* ferrugineæ. *Antennæ* corpore dimidio breviores, luteæ 22 articulis. *Abdomen* cylindrico-oblongum, incisuris tribus posticis duabusque primis luteis, at 3, 4, 5, 6, maxima ex parte nigris. Ultimum segmentum obtusum, terminatum corniculo recto, tereti acuto; abdomen subtus atrum, e cujus medio rima versus posteriora fissa, e qua exit aculeus rectus, niger, corniculo abdominis longior, rigidus, compositus e tribus setis conjunctis. *Femora* brevia, nigra. *Tibiæ* & *palmæ* omnes luteæ.

Faun. 1573.

Obs. *Fæminæ* hæc est descriptio. *Maris antennæ* longiores. *Caput*, *thorax*que uti in *fœmina*; sed *abdomen* aliter est coloratum coloresque inverse dispositi: in medio supra fulvum est apice basique nigrum; subtus nigrum aut fuscum. *Alæ* multo minus flavescens.

Femora nigra. Tibiæ nigræ, basi apiceque fulvæ. Anus corniculo armatus, sed absque aculeo. V.

Spectrum. 2. S. (le spectre) abdomine atro, thorace villoso, litura ante alas lutea. *

Scop. carn. 740.

Amæn. acad. 3. p. 325.

Fab. 5.

De Geer tom. I. p. 567. t. 36. f. 6. niger; pedibus ferrugineis.

Schæff. icon. t. 4. f. 9, 10.

Faun. Fridr. n. 613.

Hab. in lignis putridis antiquis pini & abietis. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudine cum præcedenti certat.

Tota atra. Thorax & caput hirsuta.

Abdomen glabrum, novem articulis; extimus articulus sive ani terminatur spina crassa, acuta; depressa, non vero, ut in præcedenti, cylindrica.

Aculeus triplex incipit sub medio abdominis & protenditur ultra ani spinam.

Alæ subfuscæ. Antennæ nigræ, versus basin fuscæ, articulis 20. Femora, tibiæ, palmæ ferrugineæ. Faun. 1574.

Juvenus. 3. S. (le taureau) abdomine atro-cæruleo, thorace unicolore villoso. *

Scop. carn. 741.

Fab. 6.

Schæff. icon. t. 205. f. 3.

Sulz. hist. inf. t. 26. f. 9, 10.

De Geer tom. I. p. 568. t. 36. f. 7. nigro-cæruleus nitidus, pedibus luteis.

Hab. in sylvis.

Desc. Mediæ magnitudinis. *Alæ* longitudine abdominis, latiores, margine exteriori fusco. *Corpus* atrum, cæruleo-lescens. *Antennæ* corpore dimidio breviores;

breviores, basi testaceæ. *Pedes* testacei, *Faun.* 1575.

Obs. Similis firici *speculo*, sed caret litura ante alas lutea aculeoque abdomine longe brevior instructur.

Camelus. 4. S. (le chameau) abdomine atro lateribus albo maculato, thorace lævi. *

Scop. carn. 742.

Uddm. diff. 82.

Fab. 10.

Schæff. icon. t. 207. f 5, 6.

Hab. in ligno putrido. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. *Corpus* nigrum. *Caput* versus occiput lunulis duabus albis & punctum album ante oculos. *Antennæ* nigrae, basi ferrugineæ, thorace breviores. *Thorax* lævisculus, litura alba ante alas. *Abdomen* atrum, segmentis singulis utrinque macula acuta alba. *Pedes* ferruginei. *Faun.* 1576.

Mariscus. 5. S. (l'enflé) abdomine testaceo, segmentis duobus ultimis nigris, thorace villoso. *

Fab. 11.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura & facies *S. gigantis*, sed dimidio minor. *Antennæ* flavæ, longitudine dimidii corporis. *Caput* nigrum, sed ad latera postica luteum. *Thorax* niger; subvillosus. *Pedes* quatuor priores flavi; duo postremi nigri, geniculis flavis. *Abdominis* flavi segmentum primum & duo ultima nigra. *Faun.* 1577.

Pygmeus. 6. S. (le Pygmée) abdomine nigro punctis duobus fasciisque tribus luteis, media interrupta.

Fab. 12.

Hab. in Europa. In Suecia.

Corpus nigrum, magnitudine *culicis*.

Abdomen apice acutum, segmento 1 punctis duobus paribus; 2, fascia integra; 3, fascia interrupta; 4, immaculata; 6, macula una, luteis. *Alæ* margo exterior ad medium nigricans.

Obs. *Antennæ* extrorsum crassiores fere longitudine corporis. *Fab.*

Ex spec. D. Fab.

Magus. 7. S. (le magicien) thorace villoso niger, antennis apice, abdomine maculis lateribus, tibiis tarsisque basi albis.

Mantiss. tom. I. p. 257.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Statura & magnitudo *S. gigantis*.

Caput & thorax villosa, atra, immaculata. *Antennæ* nigrae, apice albæ.

Abdomen cylindricum, atrum, maculis utrinque septem marginalibus albis, duabus baseos ultimaque majoribus, linearibus, reliquis parvis, subtus in medio album. *Femora* nigra.

Tibiæ tarsisque basi alba. *Alæ* obscuræ.

Fuscicornis. 8. S. (le fuscicorne) thorace villoso niger, abdomine fasciis octo pedibusque flavis, antennis nigris. *Mantiss.* ibid. p. 257.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Magnitudo *S. gigantis*. *Antennæ* nigrae. *Caput & thorax villosa*, nigra, immaculata. *Abdomen nigrum*, fasciis octo; 1, 2 majoribus; 3, 4, 5, 6 angustioribus; 7, 8 maximis. *Aculeus* niger, vagina flava. *Corniculus* subulatus, flavus, apice niger.

Pedes flavi, femoribus nigris. Alæ subtestaceæ.

Pantoma. 9. S. (le fantôme) abdomine supra flavo, annulis atris, capite pedibusque luteis.

Schæff. icon. t. 205. f. 1.

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput cum antennis flavum, ore atro. Thorax obscurus, antice flavicans, subtus niger. Abdomen subtus nigrum, supra flavum, in medio annulis atris. Pedes flavi.

Dromeda- 10. S. (le dromadaire) abdomine atro, medio rufo, puncto utrinque albo, tibiis basi albis.

Mantiss. ibid. t. 7. f. 22.

Hab. Kiliæ. D. Daldorff. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura & summa affinitas S. cameli. Caput globosum, nigrum, lineolis duabus verticalibus albis. Thorax antice angustatus, niger, puncto ante alas albo. Alæ obscuræ. Abdominis segmentum 1, 2 nigra; 3, 4, 5, 6, 7 rufa; 8 nigrum macula utrinque alba; 9 nigrum, immaculatum. Corniculus brevissimus. Aculeus brevis, niger.

Pacca. 11. S. (l'étoile) abdomine atro, segmento secundo tertioque rufis, reliquis punctis albis.

Mantiss. ibid.
Hab. Kiliæ. D. Daldorff. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura & magnitudo præcedentis. Antennæ extrorsum paullo crassiores, longitudine thoracis, nigræ. Thorax villosus, niger, margine antico punctis duobus albis minutis. Abdomen subcylindricum, segmento primo nigro;

2, 3 rufis marginibus nigris ; 4, 5 nigris utrinque puncto parvo albo ; ultimo nigro puncto apicis albo. *Corniculus* brevis, flavescens. *Aculeus* corniculo longior, exsertus, rufus. *Pedes* compressi, nigri.

Troglodyta. 12. *S.* (le troglodyte) lævis ater, abdomine punctis septem fasciisque duabus flavis. *Mantiss.* ibid.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Statura omnino *S. Pygmai*, at duplo fere major. *Caput* & *thorax* atra, nitida, immaculata. *Antennæ* cylindricæ, nigræ. *Abdomen* compressum, atrum, puncto dorsali bascos flavo ; tunc punctis utrinque duobus lateralibus, tandem fasciæ duæ & denique punctum utrinque ante apicem, flava. *Corniculus* vix ullus & *aculeus* abbreviatus. *Pedes* flavi, femoribus nigris.

Tabidus. 13. *S.* (le foible) niger, abdominis lateribus flavo punctatis, tibiis anticis testaceis.

Hab. in Angliæ floribus. *Mus. D. Banks.*

Desc. Parvus, linearis. *Antennæ* filiformes, corpore breviores. *Thorax* ater, postice macula scutellari virescente. *Abdomen* subcompressum, segmentis posticis utrinque puncto flavo. *Pedes* nigri ; tibiis anticis testaceis.

Ex nost. Mus.

Struthio-camelus. 14. *S.* (l'autruche) fuscus, antennis fuscis, capite thoraceque nigris, abdomine fusco, pedibus fulvis,

Hab. in Europa. In Gallia Aust. semel lectus.

Desc. Magnitudo S. gigantis. Alæ breves. Thorax antice quadratus. Antennæ nigræ. Pedes fulvi. Fæminam non vidi.

Reflexus. 15. *S. (le réfléchi) niger, pedibus fulvis, aculei vaginis fere continuo ad abdominis latera reflexis. t. 7. f. 23.*

Hab. in Europa, prope Nemausum lectus.

Desc. Statura S. marisci. Antennæ pedibus concolores. Thorax niger, lineis duabus flavis in medio. Pedes fulvi. Scutellum flavum. Alæ margine exteriori flavescentes.

Obs. Aculeo ferrato genus hoc a sequentibus præcipue separatur: abdomine sessili mucronato differt adhuc; præterea firicum larvæ nunquam in aliorum insectorum larvis reperiuntur. Ab antennarum articulorum numero nota sumta, minus felix videtur. In nonnullis enim ichneumonibus antennæ articulis non ultra 30; non mirum igitur, si illust. Scopoli firices ab ichneumonibus non separaverit, licet moribus larvæ differant. Uterque sexus sæpius dissimilis, ut in genere sequenti. V. D. Scop. nota characteristica sequens, alis posticis placatis, abdomine mucronato, aculeum subtus circa medium proferente.



G E N U S I V.

ICHNEUMON. Os maxillis absque lingua.

Antennæ articulis ultra 30.

Abdomen petiolatum plerisque.

Aculeus exsertus vagina cylindrica, bivalvi.

* *Scutello albido, antennis fascia albida annulatis.*

Sugillatorius. 1. I. (l'athlete) scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro, segmentis tribus utrinque puncto albo. *

Fab. 1.

Enum. n. 695.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 843.

Geoff. inf. tom. 2. p. 345. n. 54.

Sulz. hist. inf. t. 26. f. 11.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Antennæ nigræ, annulo albo. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, immaculatus, scutello albo. *Abdomen* nigrum, segmentis tribus primis margine laterali puncto albo. *Pedes* nigri. *Tibiæ* anticæ antèrius pallidæ. *Faun.* 1578.

Raptorius. 2. I. (le ravisseur) scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine segmento secundo tertioque luteis, reliquis apice albis. *

Fab. 2.

Enum. n. 696.

Geoff. inf. parif. tom. 1. p. 342. n. 49.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 844.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Caput nigrum. *Thorax*

niger, immaculatus, vel callo tantum ad basin alæ. *Scutellum* albidum. *Antennæ* basi undique flavæ. *Pedes* lutei, sed femora quatuor posteriora nigra. *Abdominis* segmentum 1 nigrum; 2, 3 ferruginea; 4, 5 atra; macula ferruginea. *Faun.* 1579.

Variat puncto dorsali albo ultima abdominis segmenta terminante. *Fab.* Variat femoribus omnibus nigris tibiisque basi albis, apice nigris. V.

Sarcitorius. 3. I. (le charpentier) scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento tertio posterius secundoque ferrugineis, sexto flavo. *

Sulz. inf. t. 18. *f.* 15.

Fab. 3.

Ræf. inf. 255. 15.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ*, *caput*, *thorax* nigra; sed *scutellum* albido-flavum & punctum flavum sub basi alæ. *Abdominis* petiolus niger, duo segmenta prima ferruginea, ita tamen, ut basis posterioris ferruginei segmenti nigricans sit; hinc pars abdominis ferruginea quasi linea transversa notata: quatuor reliqua abdominis segmenta nigra sunt. *Pedes* ferruginei, sed postici femoribus & tibiis apice nigris. *Antennæ* luteo annulatæ, apice nigræ. *Faun.* 1580.

Extenforius. 4. I. (le coureur) scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis apice albidis. *

Fab. 4.

Enum. n. 698.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 845.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 344. n. 52.

Hab. in Europâ.

Desc. Antennæ nigræ, cingulo albo. Caput nigrum. Thorax niger, apice flavo. Pedes lutei, femoribus nigris. Alæ glaucæ. Abdomen nigrum, segmento & tertio ferrugineis, reliquis immaculatis. Faun. 1581.

Variat antennis ante annulum album rufis. In mare segmenta duo abdominis ultima albo maculata. V.

Quæstorius. 5. I. (le furet) scutello flavicante, thorace maculato, abdominis tribus ultimis segmentis dorsalibus macula flava. *

Fab. 5.

Hab. in Europa. In Gallia, circa Lugdunum. V.

Desc. Medius. Corpus totum nigrum. Thorax immaculatus, puncto minutissimo albo sub basi alæ. Pedes omnes ferruginei. Antennæ annulo albo. Abdominis tria ultima segmenta supra macula parva sulphurea. Faun. 1582.

Culpatorius. 6. I. (le méchant) scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris. *

Fab. 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Inter medios major. Antennæ nigræ, albo dimidiatæ. Thorax, qui in syst. maculatus est, in nostris immaculatus. Alæ flavescetes. V.

Infractorius. 7. I. (le destructeur) scutello flavo, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus margine albis, pedibus ferrugineis. *

Fab. 9.

Enum. n. 699.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 845.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Minor. Corpus nigrum. *Antennæ* annulo albo. *Oculi* margine flavi. *Thorax* lineola flava ante alas, puncto flavo supra pedes. *Scutellum* duplex, flavum. *Abdominis* segmenta margine flava. *Pedum* posticorum genua nigra. *Faun.* 1584.

Obs. In nostris specimenibus *antennæ* in maxima parte flavescentes. V.

Constrictorius. 8. I. (l'enchaîné) scutello flavicante, thorace bidentato submaculato, abdominis segmento secundo ferrugineo. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Medius, niger. Antennæ longitudine thoracis, nigræ, albo semiannulatae. *Thorax* puncto sub basi alarum & scutello flavo f. albido. *Abdominis* segmentum secundum ferrugineum f. rufum. *Faun.* 1585.

Saturatorius. 9. I. (le gourmand) scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis nigri segmento ultimo albido. *

Fab. 11.

De Geer tom. I. p. 332. t. 23. f. 16.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus nigrum, immaculatum. *Antennæ* annulo albo. *Scutellum* album. *Pedes* ferruginei, *tibiis* posticis nigris. *Anus* albus sesqui-altero segmento. *Faun.* 1586.

Molitorius. 10. I. (l'entrepreneur) scutello albo, thorace immaculato, abdominis apice tibiarumque basi albis. *

Fab. 12. scutello albo, corpore atro.
Hab. in Europa. Prope Lugdunum. V.
Desc. Medius, totus niger. *Antennæ*
 medio albæ. *Abdominis* summus apex
 puncto albo. *Tibiæ* omnes basi albæ.
Alæ hyalinæ. *Faun.* 1587.

Crispato- 11. I. (le friseur) scutello flavicante ,
 rius. thorace submaculato , abdomine toto
 luteo-ferrugineo , apice subfuscescente.*

Fab. 13.
Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.
Desc. Medius. *Corpus* nigrum. *Antennæ*
 versus basin flavo annulatæ. *Thorax*
 vix maculatus, nisi puncto ferrugineo
 ad basin alarum. *Scutellum* flavum.
Pedes flavi. *Femora* nigricantia, api-
 cibus flava. *Abdominis* segmentum 1
 flavum; 2, flavum basi ferruginea;
 3, ferrugineum; 4, 5 ferrugineo-
 fuscescentia. *Faun.* 1588.

Pisforius. 12. I. (le reclus) scutello flavicante , tho-
 race maculato , abdomine toto lateo.*
Faun. suec. 966. 968.

Fab. 15. scutello albo , thorace lineato ,
 abdomine testaceo , petiolo nigro.
Mantiss. tom. 1.

Schæff. elem. t. 12. *f.* 1.

— *icon. t.* 6. *f.* 12.

Hab. in larva phalænæ pisi.

Desc. Est hic e majoribus generis. *Caput*
 nigrum. *Oculi* nigricantes. *Antennæ*
 nigrae, spiraliter inflexæ, in medio
 albi instar annuli, licet vix perfecti,
 qui cingit antennas. *Thorax* niger;
 a capite versus alas utrinque linea
 albida; sub alarum insertionibus punc-
 tum albicans. *Femora* nigra omnia,
 sed *tibiæ* & *palmae* omnes pallide

ferrugineæ. *Abdomen* ferrugineum totum, sed petiolus abdominis niger est. *Alæ* membranacei coloris, puncto marginali ferrugineo. *Faun.* 1589.

Obs. 1. Petiolus abdominis niger est. Variat abdomine toto, antennis femoribusque ferrugineis. *Syst.*

Obs. 2. Fœminam non vidi. Variat mas antennis nigris; ergo divisio ex antennis annulatis sumpta, incerta est. Variat pedibus omnino ferrugineis. *V.*

Obs. 3. Orbita oculorum alba. *Fab.*

Ex spec. D. Fab.

Ambulato- 13. I. (le vagabond) scutello flavicante, riu.
thorace maculato, abdominis segmento secundo ferrugineo, reliquis margine albis.

Schæff. icon. t. 43. f. 1, 2?

Hab. in Anglia. *Mus. D. Banks.* In Gallia Aust. *V.*

Desc. Affinis ichn. *infraclorio.* Caput nigrum, antennis ultra medium flavis. Thorax niger, linea antica, puncto ante alas scutelloque, flavis. Abdomen atrum, segmento secundo rufo; 3, 4, 5 margine albis. Pedes rufi.

Moratorius. 14. I. (l'inconstant) scutello albo, thorace immaculato, abdomine rubro apice nigro, puncto albo.

Hab. Hafniæ. In Gallia, prope Lugdunum. *V.*

Desc. Parvus. Antennæ nigræ, albo annulatæ. Caput & thorax atra, immaculata, scutello solo albo. Aculeus abdominis brevissimus.

Obs. In uno sexu femora nigra; in altero, rufa, saltem in nostris. *V.*

Porrectorius. 15. I. (le mécanicien) scutello flavo , thorace maculato abdomine atro , segmentis tribus apice rufis albo marginatis. *Mantiff. tom. 1. p. 260.*

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Parvus. *Antennæ* porrectæ , nigræ , ante apicem albæ. *Caput* nigrum , labio puncto sub antennis orbitaque oculorum flavis. *Thorax* niger , linea utrinque ante alas , puncto duplici loco scutelli lituraque postica flavis. *Abdomen* petiolatum , incurvum , nigrum , segmento primo apice albo ; 2 , 3 , 4 apice ferruginea , albo marginata ; reliqua nigra. *Aculeus* exsertus , brevis. *Alæ* hyalinæ. *Pedes* rufi , basi albi tarsisque posticis nigris , ante apicem albis.

Armatorius. 16. I. (le fourbisseur) scutello albo , niger , thorace immaculato , postice bidentato , abdomine pedibusque ferrugineis. *Mantiff. 1. p. 262.*

Hab. Kiliæ. D. Daldorff. In Gallia Aust. V.

Desc. Parvus. *Antennæ* nigræ , albo annulatæ. *Caput & thorax* nigra , immaculata , scutello solo albo. *Thorax* postice utrinque dente valido acuto. *Abdomen* totum , uti & *pedes* , ferrugineum.

Ex Enum.

Bimaculatus. 17. I. (le bimaculé) niger , scutello flavicante , antennis albo annulatis , segmentis duobus postremis supra , macula gypsea.

Beytr. Zur. Nat. p. 86. §. 48.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. rarior. V.

Tyrannus. 18. I. (le tyran) scutello albido , antennis fascia annulatis , abdominis segmentis plerisque margine albis , pedibus testaceis.

Hab. Viennæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis ichn. *infraclorio*. Niger , abdomine lanceolato , parte tenuiore thoracem spectante. *Antennæ* albo annulatæ. Ante oculos utrinque lineola alba. Sub alis utrinque lineola alba & apices segmentorum abdominis , dentis primis duobus , albi. *Scutellum* constat punctis duobus albis. Macula marginalis *alæ anticæ* alba , nigræ juncta. *Genua* omnia alba. *Os* palpique pallidi coloris. *Pedes* rufi & intima posticorum femora , seu potius femorum apophyses , mobilia , clavata , utrinque linea insculpta.

Pictus. 19. I. (le peint) scutello flavicante , antennis ferrugineis medietate nigris , abdominis segmentis duobus fulvis , reliquis apice albis.

Beytr. Zur. Nat. p. 88. §. 51.

Hab. in Europa.

Ferrugi 20. I. (le rouillé) fulvo-ferrugineus scutello flavo , thorace fulvo maculato , oculis abdominisque apice nigris. t. 8. f. 1.

Beytr. Zur. Nat. p. 88. §. 52.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. sed major. V.

Ex inf. paris. entom. que paris.

Funereus. 21. I. (le funebre) niger , thoracis apice antennarumque medio albis.

Hab. in Europa.

Desc. Niger nitidus, macula alba in femorum origine.

Obs. Quot ichneumones funerei dicerentur? V.

Basilaris. 22. I. (le basilaire) niger, humeris, thoracis apice abdominisque basi flavo maculatis, antennis medio albis.

Hab. in Europa.

Cælestis. 23. I. (le céleste) niger, abdomine ferrugineo, basi nigro, thoracis apice antennarumque medio albis.

Hab. in Europa.

Bipartitus. 24. I. (le mi-parti) niger, antennarum medio thoracisque apice flavi, pedibus fulvis, abdomine antice fulvo, fascia nigra, postice nigro, fascia flava.

Hab. in Europa.

Ex entom. carn.

Deceptorius. 25. I. (le trompeur) niger, scutello punctoque sub alis anticis flavicante, abdomine fulvo, apice nigro albidoque puncto terminato.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. passim. V.

Desc. Minor. *Alæ* anticæ, puncto marginali ferrugineo. *Pedes* fulvi, sed *femora* nigra. *Aculeus* vix exsertus. Entomologum facile decipit, ut pro *sphege* adsumatur.

Ex nost. Mus.

Atratorius. 26. I. (le noir) niger, scutello flavicante, pedibus rufis. t. 8. f. 2.

Hab. in Europa. In Gallia, Lugdunum circa.

Desc. Inter majores numerandus. *Antennæ* nigræ, albido annulatæ. *Caput* nigrum, postice prope oculos, duobus punctis flavis. *Thorax* niger, lineola flava utrinque ante alarum ortum. *Abdomen* nigrum. *Pedes* tarsique rufescunt.

Inflamma- 27. I. (l'enflammé) scutello albido, tho-
torius. race rubro, abdomine fulvo, apice albo.

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis.

Desc. Magnitudo media. *Caput* nigrum. *Thorax* antennis ruber, postice niger. *Abdomen* fulvum. Anus *fæminæ* albus. *Aculeus* brevissimus. Anus *maris* apice nigricans, *subtus* vix conspicue albus.

Croceato- 28. I. (le safrané) scutello albo, thorace
rius. nigro, duobus punctis lateralibus flavis, abdominis segmento secundo tertioque croceis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori captus.

Desc. Major. *Antennæ* convolutæ, subtus fulvescentes. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, puncto nigro minime utrinque prope alarum insertionem. *Alæ* flavo-fulvescentes. *Abdominis* segmentum secundum fere totum croceum, tertium dimidiato croceum, ultimum annulo albo. *Pedes* crocei.

Apparito- 29. I. (le bédeau) scutello flavicante,
rius. capite, thorace pectoreque nigris, abdomine pedibusque fulvis.

Hab. in Europa. Circa Lugdunum captus.

Desc. Omnino bicolor. *Antennæ* nigræ, albo annulatæ. *Abdomen*, *pedes* *scutellumque* fulva; reliqua nigra.

Fraudato- 30. I. (le courtisan) fuscus totus , scu-
rius. tello flavicante.

Hab. in Europa. Prope Lugdunum haud frequens.

Desc. Magnus. Triste & inquietum animal, continuo avolans, spem continuo illudens, inde nomen.

**** Scutello albido. Antennis nigris totis.**

Luctato- 31. I. (le lutteur) scutello flavicante ,
rius. thorace maculato , abdominis segmento secundo tertioque luteis. *

Enum. n. 727.

Geoff. tom. 2. p. 247. n. 59. niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominisque medio flavis.

Hab. in Europa. In Nova Zelandia. Mus. D. Banks. In his regionibus frequens. V.

Desc. Caput; thorax, antennæ, nigra: ante oculos macula flava. Apex thoracis flavus: punctum flavum sub basi alarum. Abdominis primum segmentum est petiolus niger; reliqua segmenta depressa, quorum secundum & tertium flava; reliqua nigra; sed quartum duabus maculis obsoletis, ferrugineis. Femora nigra. Pedes flavi, geniculis nigris. Faun. 1590.

Obs. 1. Zelandicus puncto albo sub alis, vix tamen distinctus. Fab.

Obs. 2. Variat scutello nigro. Mares descriperunt. DD. Linn. Geoff. sed scutelli varietas non sexus varietas. Descriptus in Enum. sub nomine ichn. elegantuli. V.

Sexus distinctus sæpe colore disperso gaudet, unde calamitas specierum in hoc genere.

Volutatorius.

Volutato- 32. I. (le tourneur) scutello flavicante ; thorace variegato , abdominis segmentis omnibus dorso flavis. *

Fab. 18.

Enum. n. 704.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 847.

Hab. in Europä. In Gallia Aust. V.

Desc. Medius. *Caput* flavum , nigro varium. *Thorax* niger flavo variegatus ; maculae 2 supra basin , e sub alis , inferiore majore ; 3 posticae , intermedia lunata. *Abdominis* segmenta dorsalia flava , basi nigra. *Pedes* ferruginei. *Antennae* nigrae , subtus longitudinaliter flavae. *Faun.* 1591.

Vaginato- 33. I. (le gâtnier) scutello flavicante , thorace maculato , abdominis segmentis margine flavis , primo quintoque unicolore.

Fab. 19. scutello albo , thorace maculato , abdomine nigro , fasciis 5 albis , tertia interrupta.

Enum. n. 705.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 847.

Hab. in Europa. In Gallia , prope Massiliam. V.

Desc. Medius. *Corpus* nigrum , macula flava ante singulum oculum. *Thorax* puncto flavo sub basi alarum. *Abdominis* segmenta margine flava. *Pedes* anteriores lutei ; posteriores duo , femoribus & tibiis basi ferrugineis. *Antennae* nigrae , subtus longitudinaliter pallidae. *Faun.* 1592.

Variat abdominis segmento etiam puncto quarto nigro. *Variat* pedibus rubris , posticis nigro fasciatis. *Syst.*

Persuasorius. 34. I. (l'attrayant) scutello albo , thorace

maculato, abdomine atro, segmentis omnibus utrinque punctis duobus albis.*

De Geer inf. I. t. 36. f. 8.

Fab. 22.

Sulz. hist. inf. t. 26. f. 12.

Schæff. icon. t. 80. f. 2.

Hab. in Europa. Rarius in Gallia Aust. V.

Desc. Niger. *Antennæ* nigræ. *Caput* nigrum, *fronte* flavo-albida, *lineola* alba ante & pone oculos. *Thorax* niger utrinque *lituris* 3 albis. *Scutellum* punctis 2 albis, anteriore majore. *Abdomen* cylindricum, longum, nigrum, sessile, incisura 1 alba, 2 alba interrupta, reliquæ punctis 4 albis. *Pedes* ferruginei. *Tibiæ* posticæ nigræ. *Alæ* parum glaucæ cum puncto marginali oblongo atro. *Aculeus* niger, longitudine corporis vel longior. *Statura* ichn. manifestatoris. *Faun.* 1593.

Obs. Variat hoc insectum, ut patet ex *syst.* & *Faun.* descriptionibus. In nostris pedes omnino rufi. *Aculeus* pedibus concolor. Mas fæminæ fumilis. *Antennæ* minus fuscæ. V.

Liturato- 35. I. (l'effacé) scutello flavicante, thorace maculato, abdomine nigro, segmentis quatuor medio flavis, pedibus ferrugineis.*

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. *Corpus* nigrum. *Antennæ* subtus pallidiores. *Frons*, versus os, flava. *Thorax* scutello minutissimo flavo, *lineola* lutea inter caput & alas utrinque. *Abdomen* subsessile, incisuris quatuor margine medio, nec ad latera se extendente, *lineola* lutea. *Pedes* ferruginei, plantis posticis fuscis. *Faun.* 1594.

Obs. In nostris *aculeus* brevissimus. *Pedes* postici nigro flavoque variegati. V.

Designato-36. I. (l'ordonnateur) scutello flavicante ;
rius. thorace maculato , abdomine atro ,
segmentis primis quatuor utrinque
puncto albo. *

Fab. 23.

Hab. in Europa.

Desc. *Corpus* totum nigrum sive atrum ,
sed macula utrinque ante oculos duo ,
alba puncta supra os. *Thorax* ante
alarum basin utrinque linea alba a
capite ducta cum puncto albo & subtus
puncto albo. *Apex thoracis* albus cum
lineola alba transversa. *Abdomen* lon-
gum , segmentis 1 , 2 , 3 , 4 utrinque
macula sive puncto albo : horum 1
segmentum petiolus est. *Aculeus* nullus
manifestus. *Faun.* 1595.

Edictorius. 37. I. (le crieur) scutello flavicante , tho-
race maculato , punctis utrinque duobus
abdomineque toto atro. *

Fab. 24.

Hab. in Europa.

Desc. *Mediæ* est magnitudinis , *totus*
ater. *Antennæ* etiam nigrae. *Apex*
thoracis in tergo solus albus. *Femora*
nigra. *Tibiae* omnes albæ , uti & *palmæ*
in primis pedibus. *Abdomen* sublun-
datum. *Punctum* marginale alarum
pallidum. *Faun.* 1596.

Delirato-38. I. (l'extravagant) scutello flavicante ,
rius. thorace maculato , punctis utrinque
tribus , abdomine toto atro , tibiis
albis. *

Fab. 28.

Enum. 706. *fæmina* n. 708.

Beytr. Zur. Nat. p. 87. §. 49. §. 50. fæm.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 848.

Geoff. tom. 2. p. 345. n. 55.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Corpus nigrum. Labium albidum. Thorax niger; puncta tria vix conspicua albida ad basin alæ. Scutellum album. Abdomen oblongum, nigrum. Pedes nigri. Tibiæ & tarsi basi albid.
Faun. 1597.

Fuscus. 39. I. (le brun) scutello flavicante , thorace maculato , abdomine luteo , petiolo nigro. *

Hab. in Europa.

Obs. An varietas sequentis?

Fuforius. 40. I. (le fondeur) eadem. *Faun. 1598.*

Fab. 27.

Schæff. elem. t. 12. f. 1.

— *icon. t. 6. f. 12.*

Hab. in Europa. In Gallia Auf. V.

Desc. Magnitudo ichn. pisorii. Corpus nigrum. Frons linea lutea ante singulum oculum; puncta duo lutea ad exortum alarum. Abdomen luteum, petiolo s. primo segmento nigro. Femora nigra. Tibiæ luteæ. Faun, 1598.

Obs. Sub eodem nomine ichn. pisorium junxit D. Fab. & certe optimo jure, nam differentia vix assignari potest. V.

Fossorius. 41. I. (le fossoyeur) scutello flavicante , thorace immaculato , abdomine toto atro , pedibus rufis. *

Fab. 29.

Hab. in Europa. Passim prope Lugdunum. V.

Desc. Medius. Antennæ nigræ. Caput nigrum; fronte flava duabus maculis.

Thorax niger. *Scutellum* albidum. *Abdomen* nigrum. *Pedes* ferruginei. *Faun.* 1599.

Ex entom. Carn.

Cunctato- 42. I. (le temporiseur) niger villosus ;
rius. antennis pedibusque rufis, aculeo brevi,
valvis subelavatis.

Hab. in puppa pap. Cratægi.

Obs. Affinis ichn. *compundori*, sed *scutellum* thoraci non concolor *antennæ*que corpore dimidio breviores subtusque luteæ.

Ex spec. D. Fab.

Fasciato- 43. I. (le fascié) scutello albo, thorace
rius. maculato, abdomine nigro, segmento
secundo basi tertio sextoque flavis.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo ichn. *luctatorii*. *Caput* nigrum, sub antennis flavum. *Antennæ* supra nigræ, subtus flavæ. *Thorax* niger, puncto ante alas & sub alis flavo. *Abdomen* nigrum, segmento secundo dimidiato flavo, 3 toto flavo, 4 nigro, 5 margine flavo, 6 toto flavo. *Pedes* flavi, anticis quatuor macula femorum nigra, posticis femoribus tibiisque apice nigris.

Annulato- 44. I. (le jouailler) scutello flavicante,
rius. thorace maculato, abdominis segmentis
quatuor anticis margine flavis.

Hab. in Anglia. Mus. D. Banks. In Gallia, circa Lugdunum. V.

Desc. Medius. *Caput* nigrum, fronte flava. *Antennæ* supra nigræ, subtus flavæ. *Thorax* lineola ante alas, puncto sub alis maculisque duabus sub scutello

flavis. *Abdominis* segmenta 1, 2, 3, 4 atra, margine albido, reliqua atra immaculata. *Pedes* ferruginei, femoribus tibiisque posticis apice nigris.

Bidento- 45. I. (l'armé) scutello flavicante, thorace rufus. submaculato, abdominis secundo tertioque segmento flavis, pedibus rufis. *Hab.* in Europa. Circa Lugdunum frequens. V.

Desc. *Antennæ* supra nigrae, subtus flavescens. *Caput* nigrum, fronte flava. *Thorax* niger, puncto sub alis scutelloque flavis, postice utrinque unidentatus. *Abdomen* nigrum, segmento secundo tertioque antice flavis.

Latatorius. 46. I. (le gai) niger, scutello albo, thorace maculato, abdomine rufo apice nigro, tibiis posticis annulo albo.

Enum. n. 710?

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In Gallia Aust. V.

Desc. Parvus. *Antennæ* supra nigrae, subtus fulvae. *Caput* nigrum, orbita oculorum alba. *Thorax* ater, scutello punctis duobus ante alas & unico sub scutello albis. *Abdomen* rubrum apice atrum. *Pedes* rufi, tibiis posticis nigris, annulo albo.

Obs. In nostris *antennæ* supra & infra fulvae. *Aculeus* brevissimus. V.

Sponsorius. 47. I. (le fiancé) scutello albo, thorace immaculato, abdomine testaceo, basi nigro, apice flavo.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. Parvus. *Antennæ* elongatae, supra nigrae, subtus flavae. *Caput* atrum, ore

late flavo. *Thorax* ater, immaculatus, *scutello* albo. *Abdomen* testaceum, basi nigrum, apice flavescens. *Pedes* flavi.

Falcatorius. 48. I. (le faucheur) *scutello* flavicante, thorace variegato, abdomine subfalcato ferrugineo, basi apiceque nigro. *Hab.* Ahfniæ. In Gallia, prope Lugdunum in salicetis lectus. V.

Desc. *Antennæ* nigræ, subtus flavæ. *Caput* nigrum, sub antennis flavum, linea media punctisque duobus nigris. *Thorax* nigro flavoque varius. *Abdomen* breve, ferrugineum, basi apiceque nigrum. *Pedes* flavi.

Cinctorius. 49. I. (le ceinturonnier) *scutello* albo, thorace immaculato, abdomine atro, fascia anali nivea.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* nigræ, basi subpiceæ. *Caput* & *thorax* atra immaculata. *Abdomen* atrum, secundo segmento puncto dorsali obsoleto piceo & sexto fascia nivea. *Aculeus* brevis, exsertus. *Pedes* ferruginei.

Osculato- 50. I. (l'osculateur) *scutello* albo, thorace maculato niger, abdominis segmento secundo tertioque rufis. *Mantiss.* tom. I. p. 261.

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. *Medius.* *Caput* atrum, ore flavo. *Antennæ* porrectæ, nigræ immaculatæ. *Thorax* ater, *scutello* lineaque ante alas flavis. *Abdomen* nigrum, segmento secundo rufo fascia media nigra, tertio toto rufo. *Pedes* rufi, tarsis posticis albidis.

Maculato- 51. I. (le tacheté) scutello flavicante
 rius. ater, flavo maculatus, abdomine cy-
 lindrico, segmentis quatuor anticis
 margine flavis, alis apice fuscis.
Mantiff. tom. I. p. 261.

Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.

Desc. Medius. Antennæ setaceæ, nigræ.
Caput atrum, ore orbitaque oculorum
 flavis. *Thorax* ater, flavo maculatus.
Scutellum flavum, interdum macula
 media atra. *Abdomen* cylindricum,
 atrum, nitidum, segmentis quatuor
 anticis margine flavis, subtus rufes-
 cens. *Aculeus* exsertus longitudine
 abdominis. *Alæ* apice fuscæ. *Pedes*
 flavi, femoribus posticis nigris.

Segmenta- 52. I. (le partagé) scutello flavicante,
 rius. thorace immaculato, abdomine nigro,
 segmento secundo tertio quartoque
 rufis.

Hab. Kilix. D. Daldorff.

Desc. Medius. Caput nigrum, *fronte*
 albida. *Thorax* niger immaculatus,
 scutello albo. *Alæ* hyalinæ. *Abdomen*
 clavatum, segmento primo nigro, 2,
 3, 4 rufis, reliquis nigris. *Pedes* rufi,
 femoribus posticis nigris.

Lutorius. 53. I. (le jauni) scutello flavicante,
 thorace lineato, abdomine toto pe-
 dibusque luteis. *Mantiff. ibid. p. 262.*

Hab. in agro Pedemontano. Dr. Allioni.
In Gallia Aust. V.

Desc. Distinctus omnino ab ichn. fusorio.
Caput flavum, vertice nigro. *Antennæ*
 nigræ, basi flavæ. *Thorax* niger,
 antice lineis quatuor flavis, quæ
 per paria coeunt. *Abdomen & pedes*
 lutea.

Punctorius. 54. I. (le ponctué) scutello flavo , thorace immaculato , segmento primo secundoque rufis , tertio puncto utrinque albo. *Ibid.*

Hab. Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

Desc. Medius. *Caput* nigrum , orbita oculorum argentea. *Thorax* niger , immaculatus. *Abdomen* atrum , nitidum , primo secundoque segmentis rufis & in tertio punctum utrinque album. *Aculeus* brevis. *Alæ* anticæ , fascia fusca.

Ex Enum.

Cirrogafter. 55. I. (le cirrogastrique) scutello flavicante , antennis , pectore thoraceque nigris , abdomine petiolato pedibusque rufis.

Geoff. tom. 1. p. 330. n. 20.

Hab. in Europa. In his regionibus haud frequens. V.

Desc. Major , niger , *collum* linea fulva. Ante alas linea fulva & propter eas ad latus inferius alia. *Scutellum* flavum. *Abdomen* pedesque ex ferrugineo testacea. *Abdomen* depressiusculum. *Alæ* ferruginescentes , etiam venis & costa & puncto marginali.

Obs. Variat multum. *Caput* modo atrum , modo fuscum , modo testaceum. In omnibus *pectus* nigrum. In nostris *antennæ* fulvæ , apice nigræ. *Fæminam* non vidi. V.

Superbus. 56. I. (le superbe) antennis nigris , scutello flavo , abdominis segmentis utrinque macula flava.

Geoff. tom. 2. p. 335. n. 32.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. maximus. V.

Desc. Caput flavum. Antennæ nigræ. Oculi rubri, sed tam futurare, ut nigri videantur. Thorax niger, supra lineis duabus longitudinalibus flavis & utrinque ad basin linea alia nitenti fulva; sub alis punctum flavum. Scutellum flavum. Ad basin abdominis utrinque squamula flava. Abdomen falcatum saturatissime rubrum ac fere nigrum: annulus primus, qui insecto petioli instar est, apice flavus; secundus dorso flavo & lateribus saturate flavis; reliqui annuli utrinque habent maculam subrotundam flavam sulphuream. Pedes flavi, sed postici fulvi. Aculeus cum vaginis niger est. Alæ superiores subferrugineæ, macula marginali saturatiore. Fœmina.

Brachy- 57. I. (le court) fulvus, thorace, oculis;
rus. antennis abdominisque basi nigris, scutello fulvo, abdomine lineari.

Hab. in Europa.

Desc. Abdomen sublineare, sessile, testaceum apice & subtus, supra basi late nigrum. Pectus, antennæ, thorax cum oculis, nigra. Pedes flavi. Caput ex flavo-testaceum. Fœmina.

Ex Hist. inf. paris. Entom. que paris.

Inguinalis. 58. I. (l'alongé) scutello flavicante,
niger; pedibus rufis, femorum basi puncto albo.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Antennæ corpus æquantes. Corpus nigrum, elongatum. Femorum basis albo punctata. Variat, teste D. Geoff. scutello thoraci concolore. V.

Scutellatus. 59. I. (l'écuffonné) flavo , rufo nigroque variegatus , apice flavo.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Medius. Antennæ fulvæ , corpore minores. Caput fulvum , postice nigro maculatum. Thorax lineatus. Abdomen fulvum , incisuris in medio , nigro maculatis. Alæ fuscescentes , puncto marginali fulvo. Pedes fulvi. Femora interius nigra.

Obs. Nomen triviale infelix. V.

Scirpi. 60. I. (du scirpe) niger , pedibus ferrugineis , thoracis abdominisque apice albo.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Minor. Antennæ superne nigræ , infra fulvæ. Abdominis setæ breves. Alæ nigricantes.

Obs. Ova fortan in aquaticorum insectorum deponit , inquit clar. Geoff. cur in entom. paris. legitur : Larva habitat scirpum palustrem ? V.

Junci. 61. I. (du jonc) niger , fronte thoracisque apice flavis , pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Hab. in Europa. In Gallia.

Hæc duo nomina sequensque omnino rejicienda sunt.

Tiphæ. 62. I. (de la massette) niger , fronte flava , antennis , pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Medius. Antennæ , caput , thorax , nigra. Os basisque antenarum flava. Abdominis primum segmentum nigrum , tertium quartumque flava , ultima nigra , quartum macula flava

utrinque. *Pedes* lutei, at *femora* posteriora parſque tibiſque inferior, nigra. V.

Ex noſt. Muſ.

Albatorius. 63. I. (le blanchi) ſcutello flavicante, antennis, capite thoraceque nigris, fronte tarſiſque poſterioribus albis.

Hab. in Europa. In Breſſiæ nemoribus.

Deſc. Magnus inter mediocres. *Alæ* diaphanæ. *Abdomen* cylindricum, rubellum, elongatum. *Pedes* 4 primores ruſi, at eorum femora baſi alba. *Femora* poſteriora baſi nigra. *Tibiæ* in maxima parte nigricantes. *Tarſi* poſteriores albi. *Aculeus* breviffimus. *Mas* ut *fœmina*,

Conſecuto- 64. I. (le découpé) niger ſcutello flavicante, abdomine in triangulis diſſecto.

Hab. in Europa. In Gallia Auſt.

Deſc. *Antennæ* nigrae, convolutae, longitudine corporis. *Totus* niger, pedibus tibiſque exceptis. *Abdominis* inciſuræ quatuor triangulariter diſſectæ. *Pedes* quatuor primores flavi, poſteriores variegati. *Aculeus* ruſus, vaginis nigris.

Deſenſo- 65. I. (le ſpadaffin) ſcutello flavicante, antennis nigris, puncto flavo ſubtus in baſi.

Hab. in Europa.

Deſc. *Caput* nigrum, *fronte* flava. *Thorax* niger, punctis flavis minimis ad exortum alarum, poſtice duabus ſpinis armatus. *Abdomen* falcatum, antice & poſtice nigrum, in medio fulvum fuſco maculatum. *Pedes* fulvi. *Femora* poſteriora in medio nigricantia. *Mas*,

Macerato- 66. I. (le jeûneur) scutello flavicante ,
 rius, antennis nigricantibus , pedibus tenui-
 bus , subtus albicellis.

Hab. in Europa. Rarior prope Lug-
dunum.

Desc. Minor. Antennæ fere corpori
æquales. Caput nigrum , ore albedo.
Thorax niger. Abdomen tenue , fusi-
forme. Pedes supra rufi , subtus albi-
cantes. Tarsi posteriores albi. Mas.

Ambiguo- 67. I. (l'équivoque) scutello thoraci
 rius, concolore & non concolore , thorace
 rubro antice , postice nigro , alis
 flavescentibus.

Hab. in Europa. Prope Nemaufum lectus.

Desc. Antennæ nigræ. Caput thoraxque
postice nigra. Thorax antice ruber.
In regione scutelli tria puncta rubra.
Abdomen , pedes , aculeusque rubi-
cunda ; vaginæ nigræ abdominis
longitudine. Fæmina.

Lotorius. 68. I. (le baigneur) niger , scutello fla-
 vicante , abdomine fulvo , tarsis
 omnibus albis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Magnitudine medius. Labium album.
Caput , thoraxque nigra. Abdomen
fulvum. Pedes nigri. Tarsorum omni-
num phalanges ultimæ nigræ.

Lineatorius. 69. I. (le rayé) scutello flavicante ,
 capite nigro , thorace rubro flavo
 lineato , abdomine nigro.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Admodum elongatus. Antennæ
nigræ , subtus flavæ. Caput nigrum ,
fronte flava. Oculi supra linea flava
incti. Maxillæ luteæ. Thorax ruber ,

lineis duabus flavis, parallelis, post mortem vix conspicuis. *Abdomen* nigrum, incisuris elevatis, apice rubrum. *Pedes* fulvi, tarsis variegatis.

Obs. Variat apex abdominis in eodem sexu, aliquotiesque abdomini concolor.

Corculato-70. I. (le porte-cœur) scutello flavicante, abdominis segmento secundo macula lutea cordiformi. t. 8. f. 2.

Hab. in Europa. Prope Massiliam captus.

Desc. Medius. *Antennæ* nigræ, subtus rufæ. *Caput* nigrum, fronte maculis fusco-flavis labioque flavo. *Thorax* niger, punctis duobus flavis antice. *Petiolus* niger; macula flava triangulari. *Abdominis* segmentis secundi dimidium flavum; e medio flavedinis exsurgit macula cordiformis lutea; incisuræ aliæ postice in medio flavo lineatæ. *Femora* nigra, præsertim posteriora. *Tibiæ* in maxima parte flavæ, in infima nigræ. *Mas.*

Acutorius. 71. I. (l'angleux) scutello flavicante; maculis duabus angulatis, pedibus fulvis.

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Minor, niger. *Antennæ* subtus rufescentes. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, punctis duobus flavis in parte antica, in postica maculis duabus minimis acutissimis. *Abdomen* nigrum. *Pedes* quatuor anteriores rubelli. *Tibiæ* posteriores nigræ.

Incrassato-72. I. (le crassicorne) niger, antennis nigris apice incrassatis, scutello flavicante, abdomine flavo maculato.

Hab. in Europa. In Bressiæ umbraticis.

Desc. Minor. niger. *Antennæ* quod singulare in hoc genere, incrassatæ. *Caput* nigrum, labio luteo. *Thorax* niger, scutello luteo. *Abdomen* nigrum, falcatum, in medio gibbum, annulis duabus flavis maculaque minima flava. *Aculeus* brevis, niger. *Alæ* diaphanæ, macula marginali nigricante. *Pedes* nigri. *Tibiæ* anteriores tarsique flavi. *Mas* fæminæ similis.

Variat abdomine immaculato.

Notato- 73. I. (le marqueur) niger, scutello rubro, abdomine nigro, thorace bidentato cingulis flavis.

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis.

Desc. Magnus. *Caput*, *thorax*que bidentatus, nigra. *Scutellum* rubrum. *Alæ* diaphanæ. *Abdomen* nigrum falcatum, petiolo nigro, secundo & tertio segmento, basi, flavo annulatis. Color flavus lateraliter extenditur. Reliqua segmenta in margine inferiori flava.

*** *Scutello thorace concolore, antennis fascia annulatis.*

Comitator. 74. I. (le suivant) ater totus, antennis fascia alba. *

Reaum. inf. 6. t. 29. f. 1.-4.

De Geer inf. t. 24. f. 10.

Geoff. inf. 2. p. 338.

Fab. 37.

Enum. n. 712.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 849.

Hab. in Europa. *D. C. Solander.*

Desc. *Corpus* totum nigrum, immaculatum. *Alæ* etiam obscuriores. *Antennæ* in medio, ab uno latere, albæ. *Faun.* 1600.

Peregrina- 75. I. (le voyageur) niger , pedibus sub-
tor; clavatis abdomineque ferrugineis ,
 segmentis duobus ultimis nigris , ano
 albido: *

Geoff. paris. 2. p. 343.

Hab. in Europa.

Desc. Pediculo duplo major. Faun.
1601.

Obs. Nostra paullo major , licet cætera
sint similia. V.

Incubitor. 76. I. (le paresseux) niger , abdomine fer-
 rugineo , apice nigro macula alba ,
 alis hyalinis , antennis fasciatis: *

Scop. carn. 745.

Geoff. paris. 2. p. 341. t. 16. f. 1.

Fab. 45.

Enum. n. 714.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 850.

Hab. in Europa.

Desc. Caput & thorax nigra. Antennæ
nigræ , annulo albo. Pedes omnes
rufi. Abdomen obverse ovatum , fer-
rugineum , ultimo articulo nigro.
Aculeus parvus triplex. Alæ mem-
branaceæ. Faun. 1602.

Obs. Maris , in nostris antennæ basi
fulvæ. V.

Reluctator. 71. I. (le vaporeux) niger , abdomine
 medio piceo , tibiis anticis clavatis.

Fab. 35.

Hab. in Europa. In Gallia , circa Lug-
dunum. V.

Desc. Medius. Corpus nigrum. Antennæ
niveo annulo. Abdomen nigrum , in
medio reluscens obsolete ferrugineo.
Tibiæ piceæ. Aculeus abdomine lon-
gior. Faun. 1603.

Obs. Abdomen elongatum. V.

Ex entom. Carn.

Usurpator. 78. I. (l'usurpateur) niger , abdomine fulvo, incisuris quatuor ultimis nigris, femoribus fulvis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Scutellum thoraci concolor. Oculi rufi. Abdomen basi & apice nigrum. Aculeus rufus, lin. $6\frac{1}{2}$, longus. Maris alæ hyalinæ, statura minor, abdomen ano duplo tenuius.

Gladiator. 79. I. (le gladiateur) niger , femoribus fulvis, aculeo corpore duplo longiore.

Hab. in Europæ cultis. In Gallia Aust. V.

Desc. Antennæ corporis longitudine, annulo albo. Scutellum thoraci concolor. Tibiæ nigræ; palmæ posticæ albidæ, unguibus unigris. Abdomen petiolatum, lin. $2\frac{1}{2}$ longum, non computato petiolo. Alæ hyalinæ.

Ex spec. D. Fab.

Restaurator. 80. I. (le restaurateur) niger , abdominis striga alba, pedibus ferrugineis, antennis fasciatis.

Hab. Hafniæ.

Desc. Parvus. Antennæ longitudine corporis, nigræ, annulo albo. Caput & thorax atra. Abdomen atrum, postice striga alba. Aculeus exsertus brevis niger. Pedes ferruginei.

Debellator. 81. I. (le conquérant) niger , abdominis quatuor segmentis intermediis rufis, femoribus clavatis nigris.

Hab. in Suecia. D. Solander.

Desc. Major. Antennæ basi flavescentes. Abdominis segmentum primum & ultima nigra. Femora omnia brevia, clavata.

Migrator. 82. I. (le passager) niger , abdomine ferrugineo apice nigro , antennis fasciatis.

Geoff. tom. 2. inf. p. 347. n. 50.

Hab. in Europa. In Bressia vulgaris. V.

Desc. Affinis ichn. peregrinatori Linn. at apex abdominis concolor & pedes haud clavati.

Dimidiator. 83. I. (le Tailleur) niger , thorace postice abdomineque antice ferrugineis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Antennæ nigræ , basi rufæ , medio albo annulatæ. Thorax niger postice cum scutello ferrugineus. Abdomen antice ferrugineum , postice nigrum. Pedes rufi , postici apice rufi.

Exhortator. 84. I. (l'incitateur) ferrugineus , capite abdominisque apice nigris , ano albo.

Mantiss. t. 1. p. 264.

Hab. Kilix. D. Daldorff. In Bressia V.

Desc. Medius. Antennæ nigræ , albo fasciatæ , basi ferruginæ , primo articulo nigro. Caput atrum , immaculatum. Thorax ferrugineus. Abdomen basi ferrugineum , apice atrum , ultimo segmento albo. Pedes ferruginei , geniculis nigris. Alæ albæ , puncto marginali nigro.

Ex Enum.

Semiannu- 85. I. (le semiannulaire) niger , antennis nigris , medio fascia dimidiata alba , abdominis petiolati segmento secundo tertioque rufis.

Beytr. Zur. Nat. p. 89. §. 53.

Geoff. inf. tom. 2. p. 341. n. 47.

Hab. in Europa. Variat antennis non annulatis. V.

Desc. Minor. *Caput*, *thorax*que nigra.
Abdomen fulvum, aliquoties nigrum,
 segmentis 2, 3, rufis. *Aculeus* brevis.
Femora clavata, nigra. *Pedes* fulvi. V.

Cothurna- 86. I. (le comédien) niger, abdominis
 medio pedibusque rufis, tarsis pos-
 ticeis antennisque medio albis.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Desc. Medius, niger. *Antennæ* insecto
 longiores, nigrae, medio albæ. *Ab-*
dominis petiolus niger; segmentum
 secundum, tertium quartique dimidium
 fulva. *Pedes* fulvi. *Femora* postica
 nigra. *Tibiæ* posticæ albo annulatæ.
Mas.

Curtus. 87. I. (le raccourci) niger, antennis albo
 annulatis, tibiis testaceis, extimo ano
 albo.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Desc. Minor. *Totus* niger. *Alarum* an-
 ticarum margo ad basin puncto albo.
Tibiæ tarsique testacei coloris. *Anus*
 extimus albus. *Antennas* arietis instar
 gerit mortuus. *Abdomen* petiolatum,
 ovatum. *Fœmina.*

Viator. 88. I. (l'errant) niger, femoribus fulvis.

Enum. n. 715.

Geoff. inf. tonl. 2. p. 340. n. 43.

Hab. in Europa.

Desc. *Abdomen* petiolatum, tres lineas
 longum, aculeo longius. *Alarum* an-
 ticarum costa nigra. *Antennas* in morte
 spirales gerit. Posticorum duorum pa-
 rium tibiæ dimidio annulo flavo an-
 nulatæ. *Ex entom. Carn. & Enum.*

Fischeri. 89. I. (le Fischer) niger, antennarum

basī , tibiis , tarsis abdomineque ,
dento petiolo & apice , rufi , femo-
ribus omnibus clavatis.

Beytr. Zur. Nat. p. 89. §. 54.

Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Insignitor. 90. I. (le remarquable) niger , antennis
nigris albo fasciatis , abdomine nigro ,
pedibus fulvis.

Hab. in Europa.

Desc. Majusculus , niger. *Petiulus* niger ,
longus. *Pedes* fulvi. *Aculeus* corpore
sesquialongior : affinis ichn. *manifesta-*
tori ; sed *antennæ* in utroque sexu
annulatæ.

Falsator. 91. I. (le déguisé) antennis annulatis ,
aculeo brevissimo. t. 8. f. 4.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. *Antennæ* longitudinem
corporis æquant. *Caput* , *thorax*
pectusque nigra. *Petiulus* & *abdomen*
fusca. *Aculeus* adeo brevis , ut sine
lente vix conspiciatur ; inde nomen :
nam fœmina pro mare facile fumeretur.

Ex Hist. inf. paris. Entom. que paris.

Dumeto- 92. I. (des buissons) ater , femoribus
rum. testaceis , antennis medio albis.

Hab. in Europa.

Desc. Niger. *Antennæ* annulatæ , corporis
fere longitudine. *Alæ* fuscae. *Femora*
rubella. *Abdomen* longum. *Aculeus*
abdomine minor. V.

Tibialis. 93. I. (le bigarré) niger , pedibus rufis ,
tibiis antennisque medio albis.

Hab. in Europa.

Desc. Abdomen basi albicans. *Pedes* rubri, tarsis tibiærumque apicibus nigris. *Tarsi* posteriores albo annulati. *Setæ* abdominales corpore longiores, nigræ. *Aculeus* fuscus. V.

*** *Scutello thorace concolore, antennis nigris setaceis,*

Denigra- 94. I. (le ramoneur) corpore atro, alis
tor. nigris lunula hyalina, abdomine testaceo subseffili. *

Fab. 58.

Sulz. hist. inf. t. 26. f. 16.

Geoff. inf. t. 2. p. 352. n. 69.

Enum. n. 737.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 850.

Hab. in Europa. G. T. Holm. M. D. In Gallia Aust. V.

Desc. Medius. Corpus atrum, læve. *Antennæ* vix longitudine corporis. *Abdomen* subseffile, flavum. *Aculeus* niger, longitudine corporis. *Alæ* nigræ: superiores in medio lunula albida. *Alium* vidi simillimum absque alarum lunula albida, aculeo corpore dimidio brevior. *Faun.* 1664.

Obs. Ambo in Gallia. *Maris* varietas *femina* multo minor. V.

Desertor. 95. I. (le déserteur) corpore luteo, alis
fuscis, fasciis duabus albis. *

Fab. 46. luteus, alis fuscis, fascia alba.

Schæff. icon. t. 20. f. 1. 2.

Enum. n. 738.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Massiliæ lectus. V.

Desc. Parvus. Corpus totum flavum. *Oculi* & *antennæ* corpore breviores, nigra.

Alæ fuscescentes , medio litura alba.
Aculeus corpore brevior. *Faun.*
 1605.

Rutilator. 96. I. (le doreur) corpore nigro immaculato , antennis subtus , abdomine pedibusque quatuor anterioribus ferrugineis. *

Fab. 6.

Enum. n. 742.

• *Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 851.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Medius. *Antennæ* subtus longitudinaliter flavescentes. *Caput* fronte quadrata lutea. *Thorax* immaculatus. *Abdomen* , excepto petiolo nigro , ferrugineum. *Scutellum* immaculatum. *Pedes* quatuor priores subferruginei , postici duo nigri. *Faun.* 1607. *Mas.*

Obs. *Fæminæ* aculeus brevis , frons nigra. V.

Coruscator. 97. I. (le brillant) corpore artubusque atris , alis fusco-hyalinis. *

Fab. 59.

Hab. in Europa. In agris , circa Lugdunum. V.

Desc. Major inter medios. Lineola flava oculos inter & labium. *Tibiæ* anticæ fulvæ in maribus. *Fæminam* non vidi. V.

Manifesta- 98. I. (le glorieux) corpore atro immaculato , abdomine sessili cylindrico ,
 tor. pedibus rufis. *

Scop. carn. 751.

Raj. inf. 256. n. 18. b.

Reaum. inf. 6. t. 29. f. 16.

Geoff. paris. 2. p. 323. n. 5.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 9.

Fab. 62.

Schæff. icon t. 10. f. 3.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 851.

Enum. n. 719.

Faun. Fridr. n. 615.

Poda gr. t. 105.

Hab. in locis glareosis. In fasciculo foliorum falicis foramen dentibus rodebat; antennis insertis recognoscebat latentem larvum. Rolander.

Desc. Corpus totum, cum antennis, capite, thorace, abdomine, aculeo, nigrum. Aculeus filiformis, niger, constans setis tribus (intermedio rubro) corpore sæpe duplo longioribus. Abdomen cylindricum. Pedes longi, toti rufi. Alæ macula nigricante marginali. Faun. 1608.

Obs. Variat magnitudine. Variat color abdominis, sed in omnibus structura cylindrica. Mas adhuc mihi incognitus. V.

Compunc- 99. I. (le piqueur) corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis setaceis. *

Fab. 65. ater ore pedibusque rufis, abdomine petiolato.

Schæff. icon. t. 49. f. 4.

Geoff. inf tom. 2. p. 324. n. 6.

Enum. n. 720.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 851.

Hab. in Europa. In puppis papilionum. Rarior in his regionibus. V.

Desc. Minor. Corpus nigrum. Antennæ corpore dimidio breviores.

Palpi setacei, lutei. Pedes omnes ferruginei; postremi plantis fuscis. Tibiæ posticæ apice nigræ. Abdomen nigrum. Aculeus brevis. Antennæ subtus luteæ. Faun. 1609.

Delusor. 100. I. (le moqueur) corpore nigro ; abdomine ferrugineo basi apiceque nigro , femorum posteriorum patellis folis nigris.

Fab. 67.

Enum. n. 734.

Geoff. inf. tom. 2. p. 351. *n.* 66.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 852.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Caput , thoraxque nigra. Abdomen nigrum , exceptis segmentis 2 , 3 , quæ fulva in omnibus. Tibiæ tarsisque postici nigri. Pedes quatuor anteriores fulvi. V.

Titillator. 101. I. (le tâteur) corpore nigro , abdomine ferrugineo basi apiceque nigro , pedibus posticis nigris , plantis albis. *

Fab. 70.

Geoff. inf. tom. 2. p. 350. *n.* 65.

Enum. n. 723.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Corpus , caput , thorax , pedes antennæque nigra immaculata. Abdomen ferrugineum , petiolo & apice nigrum. Pedes anteriores ferruginei , posteriores nigri , plantis albis. Faun. 1611.

Obs. Fœmina nigra ; aculeus brevissimus. Pedes similes.

Venator. 102. I. (le chasseur) corpore atro immaculato , abdominis basi subtus incarnata , pedibus rufis , aculeo retractili.

Fab. 71. niger , abdomine subfalcato , basi subtus incarnata , pedibus rufis.

Enum. n. 724.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 852.

Hab. in Europa. In Bressiæ nemoribus. V.

Desc. Aterrimus. *Palpi* oris flavi. *Tibiæ* flavæ, posticæ apice nigræ, *tarsis* flavis. *Abdomen* petiolatum, nigrum, sed subtus primum, demto petiolo, flavum. *Aculeus* ruber; *vaginæ* nigræ. V.

Extenfor. 103. I. (le filiforme) corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico, pedibus rufis, palpis fetaceis. *

Fab. 74. niger, abdomine subcylindrico, pedibus rufis, aculeo corpore longiori.

Geoff. inf. tom. 2. p. 359. n. 86.

Faun. Fridr. n. 616.

Hab. in Europa.

Desc. Est longitudine culicis, valde tenuis & oblongus. *Pedes* testacei. *Femora* clavata. *Abdomen* clavatum. *Antennæ* longitudine corporis. In *cauda* tres setæ longitudine corporis. *Alæ* complicatæ sive incumbentes, macula ferruginea marginali. Duæ setæ sive *tentacula* ad *os* longitudine thoracis, albæ. Alter sexus caret fetis in cauda. *Faun.* 1613.

Exarator. 104. I. (le traceur) corpore piceo immaculato, abdomine femoribusque clavatis, palpis fetaceis, alis macula nigra albaque.

Geoff. inf. tom. 2. p. 330. n. 19.

Hab. in Europa. In Gallia V.

Parvus, angustus, longiusculis pedibus, aculeo corpore longiore.

Turionel- 105. I. (des larves) niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albæ inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *

Fab. 76. niger, pedibus rufis, tibiis posticis nigris albo annulatis.

Hab. in larvis phalænæ turionellæ. Ibid.
In Gallia Aust. V.

Antennæ longitudine corporis. Aculeus abdomine brevior. Pedes ferruginei; quatuor posteriores tibiæ fuscæ, annulo albo; sed mas hac nota destituitur.

Strobilel- 106. I. (des cônes) niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus lutescentibus, postica tibia digitoque nigris albo annulatis. *

Fab. 77.

Hab. in larva phalænæ strobilellæ & turionellæ.

Desc. Antennæ, caput, thorax nigra. Abdomen ovatum, ferrugineum, ultimo articulo nigro. Pedes ferruginei, sed femora postica nigra. Aculeus triplex, longitudine fere abdominis. Alæ glaucæ. Faun. 1616.

Moderator. 107. I. (le modérateur) niger, abdomine petiolato compresso, ore palpato pedibusque pallidis, aculeo corpore subbreuiore. *

Fab. 78.

Faun. Fridr. n. 617.

Hab. in larva ichneumonis strobilellæ, qua consumpta, folliculum cranio superstiti inædificat. Rolander.

Desc. Parvus. Corpus nigrum. Pedes pallide ferruginei. Antennæ longitudine corporis. Aculeus vix corporis longitudine; alius vero prodiit aculeo corpore duplo longiore, pedibus quatuor prioribus ferrugineis. Faun. 1617.

Refinellæ. 108. I. (de la résine) niger, pedibus flavis, abdomine subcylindrico fessili, antennis basi luteis. *

Fab. 81.

Hab. in phalænæ *resinellæ* larva. *Rolander.*

Desc. Minutus, oblongus, immaculatus.

Corpus atrum. *Antennæ* corpore longiores, basi flavæ. *Pedes* toti lutescentes. *Syst. Faun.* 1618.

Præroga- 109. I. (le privilégié) niger, pedibus
tor. flavis, abdomine oblongo obtuso.

Fab. 82.

Enum. n. 739.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 854.

Hab. in larva phalænæ *salicis*. In Gallia
Aust. V.

Desc. Parvus. *Alæ* hyalinæ, puncto
marginali nigro. *Antennæ* totæ nigræ,

Fab. vix corporis longitudine nec basi
flavæ. *Syst.*

Manda- 110. I. (l'instituteur) niger, abdominis
tor. segmento secundo tertioque ferrugineis, apice supra albo, antennis unicoloribus.

Hab. in Europa.

Fomenta- 111. I. (le baigneur) niger, abdomine fal-
tor. cato, segmentis tertio quartoque basi flavescentibus, pedibus testaceis.

Fab. 83.

Hab. in prædio meo *Sæffa.*

Corpus vix pediculo majus. *Antennæ*
corpore breviores. Abdomen clavatum,
falcatum, basi angustum. Os quasi
tomentosum.

Enervator. 112. I. (le languissant) niger, abdominis
tribus primis segmentis rufis, apice
supra albo, antennis albo fasciatis. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput nigrum, immaculatum.

Thorax immaculatus, niger. *Abdominis* segmentum primum nigrum; secundum & tertium ferruginea; reliqua nigra cum macula alba in tergo. *Pedes* rufi. *Femora* postica nigra. *Faun.* 1621.

Gravida- 113. I. (le fécond) niger, abdominis primo segmento ferrugineo abdomen dimidium obtegente.

Fab. 86.

Hab. in Europa.

Inculcator. 114. I. (le paveur) niger, abdomine falcato toto ferrugineo. *

Reaum. inf. 6. t. 30. f. 9.

Geoff. paris. 2. p. 357. n. 80.

Fab. 87.

Faun. Fridr. n. 618.

Enum. n. 735.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 854.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput, antennæ, *thorax*, nigra.

Alæ membranaceæ. *Abdomen* obverse ovatum, ferrugineum. *Pedes* omnes ferruginei. *Faun.* 1623.

Pugillator. 115. I. (le champion) niger, abdomine falcato, segmentis secundo, tertio quartoque rufis, pedibus tenuibus ferrugineis. *

De Geer inf. 1. t. 6. f. 12.

Raj. inf. 255. n. 17.

Geoff. paris. 2. p. 332. n. 24.

Fab. 89.

Enum. n. 732.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 856.

Hab. in phalænæ *χικzac* larva.

Desc. Convenit facie cum proxime præcedentibus, est tamen paullo minor.

Abdomine antèrius luteo & postèrius

duobus tribusque segmentis nigro convenit cum prioribus duobus; *thorace* undique nigro & petiolo abdominis etiam nigro a prædictis differt. *Pedes* maxima parte nigri sunt. *Aculeo* pungit & dolorem excitat. *Frons* albida est. *Faun.* 1624.

Ruspator. 116. I. (le furet) niger, abdomine subcylindrico, pedibus ferrugineis, femoribus clavatis, posticis dentatis. *

Geoff. parif. tom. 2. p. 326. n. 12.

Fab. 91.

Enum. n. 722.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 856.

Hab. in Europa.

Desc. Medius. Corpus totum nigrum immaculatum. *Antennæ & palpi* nigri. *Pedes* ferruginei. *Femora* brevissima, clavata: postica subtus dente armata & basi fusca. *Aculeus* longitudine corporis. *Faun.* 1625.

Obs. In *Enum.* sub eodem nomine alius describitur.

An varietas, an species? Dubium reliquit. *D. Schrank.* Cujus descr. sequens: *Niger. Caput* longiusculo collo a thorace separatum. *Abdomen* petiolatum, annulo primo, qui petiolus, toto secundoque fere toto testaceis, quarto & quinto nigris. Plura segmenta abdomen non habet. *Tibiæ* omnes testaceæ; *femorum* posticorum apophyses longæ, nigrae, quibus junguntur femora, crassiuscula illa, basi testacea, latere interiore tridentata. *Fæmina.*

Jaculator. 117. I. (l'archer) niger, abdomine falcato, segmento secundo, tertio quartoque rufis, tibiis posticis clavatis. *

Mouff. inf. t. 121.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 10.

Geoff. paris. 2. p. 328. n. 16.

Reaum. inf. 4. t. 10. f. 14.

Fab. 92. niger, abdomine falcato medio rufo, tibiis posticis clavatis, basi apiceque albis.

Faun. Fridr. n. 619.

Hab. in apibus truncorum, florifomniæ sphegisque figuli larvis. *T. Bergman.* antennis perquirat, ubi sphex figulus in pariete habitat, observato eo avolat reditque & ovum ei imponit.

Desc. Caput, thorax, pedes, antennæ, nigra. *Aculeus* in scœmina triplex, niger (intermedio rubro) piliformis, longitudine corporis vel longior, apice albus. *Abdomen* falcatum, petiolo thoraci adfixum, nigrum, sed versus basin rufum. *Pedes* posteriores constant femoribus parvis, his proximus articulus est tibia nigra, minus crassa, & tertius articulus sive tibia inferior crassissima, nigra, clavata; ultimus articulus tenuis basi albus. *Faun. 1626.*

Affectator. 118. I. (le cambré) niger, abdomine falcato, segmento secundo, tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clavatis. *

Scop. carn. 756.

Fab. 93. niger, abdomine falcato, maculis tribus lateralibus rufis, tibiis posticis clavatis nigris.

Geoff. inf. tom. 2. p. 329. n. 17. niger, tibiis posticis clavatis, abdomine tenui falcato, circa medium fulvo.

Hab. in Europa.

Desc. Similis antecedenti, at dimidio minor. *Corpus* totum nigrum. *Abdo-*

minis tria segmenta medio ad latera ferruginea. *Tibiæ* ad basin annulo lutescente; *posticæ* clavatæ. *Aculeus* brevissimus nec corpus æquans. *Faun.* 1627.

Agricola- 119. I. (le laboureur) niger, capite ferrugineo, abdomine sessili.

Hab. in fecale.

Obs. An varietas ichn. *secalis*?

Corpus magnitudine *culicis*, totum nigrum. *Caput* rufo-ferrugineum, oculis nigris. *Pedes* picei. *Femora antica* clavata. *Aculeus* longitudine abdominis.

Ex spec. D. Fab.

Arroga- 120. I. (le vernisseur) ater, abdominis segmento secundo tertioque fulvis, alis atris, macula costali testacea.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Magnus. *Caput* cum antennis, *thorax*, *pedes*, atra immaculata. *Abdomen* ovatum, atrum, segmento secundo tertioque rufis. *Alæ* atræ nitidæ, macula parva costali testacea.

Obs. In nostris, quæ foeminæ sunt, macula alarum fusca. V.

Fasciator. 121. I. (l'interrompu) ater, abdomine fasciis tribus albis, alis apice fuscis.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Parvus. *Corpus* nigrum immaculatum, abdomine solo fasciis tribus albis, quarum prima interrupta, tertia remota, fere analis.

Elongator. 122. I. (l'alongé) niger, abdominis seg-

mento secundo , tertio , quarto pedibusque rufis.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. Medius. Abdomen longum , cylindricum nigrum , segmentis 2 , 3 , 4 , rufis. Pedes rufi , femoribus posticis nigris.

Latrator. 123. I. (l'importun) niger , abdominis segmento secundo , tertio , quarto , ore Pedibusque rufis , posticis nigris , rufo annulatis.

Hab. in Anglia. Mus. de Banks.

Desc. Triplo minor præcedenti. Os , uti & antennæ , subtus rufum. Abdomen petiolatum basi apiceque nigrum. Pedes rufi , postici nigri , femoribus tibiisque basi rufis.

Fornicator. 124. I. (le voulté) ater , abdomine clavato , fornicato , immaculato , tibiis rufis.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Bressia , prope Lugdunum lectus. V.

Desc. Magnitudo ichn. venatoris. Corpus totum atrum. Abdomen apice incrassatum , subtus fornicatum. Pedes rufi , plantis posticis nigris.

Obs. Aculeus brevissimus. Marem non vidi. V.

Lineator. 125. I. (le régleur) ater , abdomine petiolato , fronte flavo lineata , pedibus anticis ferrugineis.

Hab. in Anglia. Mus. de Banks. In Bressia. V.

Desc. Corpus medium totum atrum. Caput atrum , fronte lineis duabus flavis vel potius orbita oculorum flava. Thorax immaculatus. Pedes quatuor anteriores ferruginei , postici nigri.

Maculator.

Maculator. 126. I. (le barbouilleur) niger , abdominis lateribus pedibusque rufis.

Hab. in Germania. D. de Hattorff.

Desc. Statura ichn. *turionellæ* , cujus forte varietas :

Saltator. 127. I. (le sauteur) ater , abdomine clavato brevissimo , aculeo cylindrico , pedibus posticis elongatis.

Hab. in Anglia. Mus. D. Banks. Prope Lugdunum V.

Desc. Parvus: *Corpus* totum atrum , exceptis solis tibiis anticis femorumque basi testaceis. *Abdomen* breve , compressum ; petiolatum terminatur *aculeo* brevi , cylindrico , obtuso. *Pedes* postici elongati , nigri.

Oculator. 128. I. (l'oculiste) ater , abdominis basi utrinque puncto flavo ; thorace postice bidentato.

Hab. in Anglia. Mus. D. Banks.

Desc. Minutus. *Antennæ* porrectæ nigræ ; longitudine corporis. *Thorax* ater , maculatus , scaber , postice retusus , utrinque denticulo valido armatus. *Scutellum* elevatum , gibbum , triangulare. *Abdomen* oblongum , nigrum , basi utrinque puncto magno orbiculato , flavo. *Alæ* hyalinæ , puncto marginali flavo. *Pedes* rufi.

Mensura- 129. I. (le mesureur) niger , abdominis secundo tertioque ferrugineis , triangulo dorsali nigro.

Hab. in Saxonia. In Gallia Aust. V.

Desc. Medius. *Caput* & *thorax* nigræ , immaculata. *Abdomen* nigrum , segmento secundo tertioque rufis & in singulis hisce segmentis triangulum

dorsale nigrum. *Aculeus* niger, corpore longior. *Pedes* ferruginei. *Alæ* hyalinæ, stigmate flavescente.

Obs. Noster mas est; alarum stigma potius fuscum quam flavescens. V.

Variegator. 130. I. (le moucheté) niger, thorace variegato, abdomine clavato, fasciis tribus flavis.

Hab. in Europa Boreali. In Bressia. V.

Desc. *Antennæ* nigræ, subtus flavescentes. *Caput* nigrum, *fronte* flava, lineola media nigra. *Thorax* nigro flavoque varius. *Abdomen* breve, clavatum, atrum, supra infraque fasciis tribus flavis. *Alæ* hyalinæ. *Pedes* flavi.

Obs. Primo intuitu ad hanc divisionem non pertineret. V.

Falcator. 131. I. (le faucheur) niger, thorace maculato, abdomine falcato, segmentis secundo, tertio quartoque rufis.

Hab. in Europa Boreali.

Desc. Affinis ichn. *pugillatori*, at duplo major. *Antennæ*, *caput*, *thorax*, nigra, puncto parvo ante alas. *Abdomen* falcatum, nigrum, medio rufum. *Pedes* rufi, femoribus nigris.

Irrorator. 132. I. (le jardinier) ater, alis anticis apice nigris, puncto albo, abdomine clavato, apice macula villosa aurea.

Geoff. inf. tom. 2. p. 337. n. 36.

Hab. in Europa Australiori.

Desc. *Corpus* atrum, *tibiis* posticis basi ferrugineis. *Abdomen* subreticulatum, clavatum, apice macula nitente aurea. *Alæ* hyalinæ, anticæ apice fuscae, puncto minutissimo albo.

Obs. Macula abdominis pilosa certo situ variat colore. V.

Necator. 133. I. (le meurtrier) niger , abdomine flavo , apice nigro , pedibus flavis.

Ræf. inf. 2. *vesp.* 4. *t.* 4.

Hab. in phalænarum larvis , quas folliculis associatis , numerosis , albis obtegunt.

Desc. Minutus. *Antennæ* setaceæ , nigræ. *Thorax* niger , nitidus , immaculatus. *Abdomen* flavum , apice nigrum. *Pedes* flavi. *Alæ* hyalinæ , macula costali nigra.

Mandator. 134. I. (l'ordonnateur) ater , thorace immaculato , abdominis segmento secundo , tertio pedibusque flavis. *Mantiff.* tom. 1. p. 266.

Hab. Halæ. *D. Hibner.*

Desc. Medius. *Caput* & *thorax* atra , immaculata. *Antennæ* nigræ , subtus rufescentes. *Abdomen* ovatum , primo segmento atro margine flavo , secundo flavo macula dorsali distincta nigra , tertio flavo , immaculato , reliqua nigra. *Pedes* flavi , femoribus nigris.

Moschator 135. I. (le parfumeur) niger , pedibus ferrugineis apice albis. *Mantiff.* ibid.

Hab. in Dania moschum spirans. *D. Pflug.*

Desc. Medius. *Antennæ* nigræ , albo annulatæ. *Caput* nigrum , interdum sub antennis album. *Thorax* & *abdomen* nigra , immaculata. *Pedes omnes* rufi apice albi , angulis nigris ; præterea *tibiæ* posticæ apice nigræ , unde color albus apicis distinctior apparet.

Cylindra- 136. I. (le rouleur) niger , abdomine
tor. fessili cylindrico incurvo , segmentis
tribus rufis , margine nigro maculato.
Mantiss. ibid.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorff.*

Desc. Medius. *Caput* & *antennæ* por-
rectæ , nigra immaculata , labio pube
argentea. *Thorax* niger , nitidus , punc-
to flavo ante alas. *Abdomen* fessile ,
cylindricum , incurvum , nigrum , seg-
mentis 2 , 3 , 4 rufis utrinque macula
triangulari nigra. *Alæ* hyalinæ. *Pedes*
rufi , tarsis posticis nigris.

Acumina- 137. I. (l'aiguiseur) ater , thorace imma-
culato , abdomine compresso clavato ,
segmentis tribus margine flavis , scu-
tello acuminato. *Mantiss.* ibid.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Statura & summa affinitas ichn.
variegatori. *Antennæ* setaceæ , nigræ.
Caput flavum , vertice nigro. *Thorax*
ater , immaculatus , scutello postice
acuminato. *Abdomen* atrum , com-
presso-clavatum , segmentis tribus su-
pra subtusque margine flavis. *Pedes*
flavi , femoribus intermediis extus
posticis totis nigris.

Ex Enum.

Compunc- 138. I. (le dangereux) corpore atro im-
maculato , abdomine subpetiolato ,
tator. oblongo , pedibus rufis , alis macula mar-
ginali nigra , aculeo antennis brevior.

Poda gr. p. 106.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Major inter medios. *Totus* ater.
Abdominis incisuræ elevata. *Aculeus*
longitudine corporis , niger. V.

Tarsoleu- 139. I. (le poudreux) niger , antennis nigris setaceis , scutello thoraci concolore , pedibus ferrugineis , tarsis posticorum albis , unguibus nigris , abdomine falcato.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. Mares numerosi in his regionibus , sed , uti *D. Schrank* , nullam fœminam vidi. V.

Latro. 140. I. (le voleur) niger , scutello thoraci concolore , pedibus abdomineque testaceis , abdomine petiolato , subcompresso , apice nigro , aculeo brevissimo.

Hab. Viennæ.

Desc. Femora basi & tibiæ apice cum reliquo pede , nigra , Apex femorum & basis tiliarum , testacea. Abdominis petiolus , 2 , 3 , 4 segmentum , omnia testacea , reliqua nigra ; immo in dorso quoque secundi segmenti macula longitudinalis & in quarto utrinque ad latus nigra. Linea alba ante oculos. *Fœmina.*

Elegantu- 141. I. (l'élégant) niger , scutello thoraci concolore , tibiis abdominisque secundo & tertio segmentis flavis.

Hab. in Europa.

Desc. Totus ater. Alarum anticarum punctum baseos flavum. Abdomen petiolatum , non compressum , secundum tertiumque segmentum , quin & petioli apex supra subtusque flava. Femora omnia clavata nigra. Tibiæ omnes cum tarsis flavæ. Antennæ subtus flavo-fuscæ.

Vespifor- 142. I. (le vespiforme) niger , scutello thoraci concolore , abdomine singulis quatuor flavis.

Hab. Viennæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Niger dense punctatus, punctis elevatis. *Frons* sulphurea. Ante exortum *alæ* cujusvis *anticæ* lineola sulphurea. *Abdomen* basi & apice segmentorum, secundi, tertii, quarti quintique paris cingulo sulphureo, ut adeo omnia segmenta apice flava sint, demto primo, quod ejus loco basi flavum est. *Femora* atra, basi sulphurea. *Tibiæ* & *tarfi* primi paris sulphurei, reliquorum pedum fuscescentis coloris. *Mas.*

Obs. In nostris frons nigra, attamen eadem & mas. V.

Surratus. 143. I. (l'ankilosé) niger, scutello thoraci concolore, abdomine petiolato nigro, segmento secundo luteo.

Hab. Viennæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Niger. Alarum anticarum apophyses, tibiæ & primum a petiolo segmentum abdominis flava sunt, reliqua omnia nigra.

Flavi- frons. 144. I. (le distingué) niger, fronte flava, pedibus rufis, antennis subtus pallidis.

Geoff. inf. 2. p. 326. n. 10.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Frons* cum ore flava. *Antennæ* nigræ, subtus ferrugineæ. *Pedes* fulvi. In macula marginali punctum album. *Abdomen* fere sessile. *Famina* fere similis.

Macropus. 145. I. (l'étiqne) niger, antennis apice, abdominis medio pedibusque ferrugineis, pedibus posticis nigro ferrugineoque variis.

Beytr. Zur. Nat. p. 90. §. 55.

Hab. in Europa. Fœmina.

Abroga- 146. I. (le destructeur) niger , abdomine
tor. ovato , pedibus ferrugineis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Aculeus vix lente visibilis , adeo brevis. Abdomen ovatum. Ichn. prærogatori simillimus.

Obs. In nostris qui fœminæ sunt , tibiæ tarsisque postici , nigra. V.

Impugna- 147. I. (le hardi) niger , antennis extror-
tor. sum subcrassioribus , abdomine cingulis duobus flavis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Omnia ut in nomine. Adde tibiae quatuor anticas testaceas , posticas fuscas. Aculeus minutissimus.

Impræгна- 148. I. (l'ébaucheur) niger , tibiis quatuor
tor. anticis ferrugineis , abdomine ferrugineo , apice primoque segmento nigro , secundo quinquepunctato.

Hab. in Europa.

Desc. Puncta nigra segmenti secundi locata sunt in lineis transversis duabus , ad basin segmenti , hoc ordine , 3 , 2.

Myrtaca- 149. I. (le grenadier) palpis longis , ti-
tus. biarumque basi flavis.

Hab. in Europæ fenestris primo vere.

Desc. Totus , etiam antennis rufo-fuscus. Oculi nigri , uti & tibiae medium , abdominis petiolati apex & lituræ in thorace. Palpi valde longi , albi , hos inter ambulandum motitat , ad latus exsertos motitat , myrtacum more. Tibiarum basis alba. Alæ subfuligi-

nosæ, macula marginali nigra; *femora*
subclavata.

Debella- 150. I. (le conquérant) antennarum basi
tor. pedibusque flavis, abdomine petio-
lato, cingulo fulvo.

Hab. in Europa.

Desc. Totus niger. Basis antennarum,
primus articulus & tibiæ omnes flavæ.

Abdomen ovatum, petiolatum, seg-
mentum secundum apice fulvum.

Insectator. 151. I. (l'insecteur) ore palpisque flavis,
antennis fuscis, pedibus citrinis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Abdomen subfalcatum, petiolatum.
Fæmina.

Occisor. 152. I. (le boucher) niger, abdomine
falcato, fascia ferruginea.

Beytr. Zur. Nat. p. 90. §. 56.

Hab. in Europa. In Gallia, circa Lug-
dunum captus. Fæmina. V.

Ex entom. Carn.

Terebra- 153. I. (le menuisier) niger, pedibus fulvis,
tor. posticis crassioribus fulcratisque, ab-
domine subtus spina canaliculata.

Hab. in Carniolia media.

Desc. Medius. Scutellum nigrum. Aculeus
abdomine gibbo lucido brevior. Fe-
mora postica crassa, longiora, nigræ
basi imposita. Alarum apices fuli-
ginosi.

Visitator. 154. I. (le visiteur) niger, pedibus fulvis,
aculeo longitudine abdominis, valvis
pilosis,

Hab. in Europa. Super arborum & plantarum folia jugiter discurrens. In Gallia Aust. V.

Desc. *Abdomen* apice subtus quasi dente notato. *Femora* æqualia. *Scutellum* nigrum.

Excitator. 155. I. (l'excitateur) niger, abdomine supra lineis quatuor transversis albidis, subtus lamina vomeriformi.

Hab. in Europa.

Desc. *Caput* & *thorax* villosus, absque maculis; punctum rufum ad basin thoracis. *Palpi* rufi. *Alæ* costa fuscescente lineaque rufa marginali. Squama concava, acuminata, vomeri similis, sub abdomine. *Aculeus* corpore brevior lin. 9 longus. *Pedes* rufi, medii & antici basi nigri.

Speculator. 156. I. (l'espion) totus rufus & nitens, aculeo abdomine duplo brevior.

Hab. in Europa. In corylo lectus.

Desc. Ad lentem villosus. *Femora* postica clavata, longiora reliquis & crassiora. *Antennæ* abdomine longiores, toto corpore breviores. *Alæ* ferrugineæ.

Inquisitor. 157. I. (l'enquêteur) niger, alis hyalinis, pedibus fulvis, tibiis posticis flavis, nigro annulatis.

Hab. in Europa. Passim in Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* totæ nigrae, abdomine breviores. *Alæ* anticae puncto ferrugineo marginali. *Abdomen* subsessile, aculeo antennis brevior. *Tibiæ* posticae fasciis binis atris.

Victor. 158. I. (le vainqueur) niger , antennis longis , pedibus segmentisque abdominis 2 , 3 . 4 fulvis.

Hab. rure , super folia discurrens , obvia insecta cuncta depellens.

Desc. *Antennæ* corpore longiores. *Palpi* longi , antennis concolores. *Abdomen* fulvum , basi & apice nigrum. *Aculeus* similineam longus. *Alæ* hyalinæ puncto nigro marginali. *Femora* postica nigricantia.

Obs. An varietas *D. Fab.* ichneumonis necatoris ? V.

Impositor. 159. I. (l'impositeur) niger , alis fuscis , abdomine ovato rubro.

Enum. n. 736.

Geoff. inf. tom. 2. p. 352. n. 69.

Hab. in Europa. Prope Nemausum captus. V.

Desc. *Antennæ* nigrae , alarum anticarum longitudine. *Oculi* fulvi. *Thorax* nitens , villosulus. *Alæ* omnes nigricantes , anticae longitudine corporis. *Abdomen* miniatum , ovatum , aculeo brevi nigro. *Pedes* nigri.

Obs. *Ichn. denigratoris* an mera varietas , an species propria ? V.

Vagator. 160. I. (le coureur) niger , abdomine subtus fulvo , alis fuscescentibus.

Hab. in Europa. Prope Lugdunum non rarum , inquietissimum animal super arborum folia continuo discurrens.

Desc. *Antennæ* corporis longitudine. *Aculeus* lineam longus. *Abdomen* ovatum , supra fuscum subtus fulvum. *Alæ* hyalinæ , fuscescentes , apice pallidiores.

Ex oper. D. de Geer.

Nigrocæu-161. I. (le caudataire) abdomine fusiformi
datus. flavo, thorace nigro flavoque macu-
lato, ano nigro, pedibus flavis. t. 2.
p. 848. t. 29. f. 9.

*Hab. in Europa. In larvis sphingis ocel-
latæ. In Gallia Aust. V.*

Desc. Caput nigrum. Frons, labia,
palpi, flava. *Antennæ* nigræ corporis
longitudinem fere æquant. *Thorax*
niger, flavo utrinque lateraliter macu-
latus. *Abdomen* rufescenti-flavum.
Pedes flavi. *Femora* posteriora ma-
cula nigra elongata. *Alæ* lutescentes.

Cinctipes. 162. I. (le garotté) niger, abdomine
fusiformi, pedibus ferrugineis, arti-
culis tribus mediis tarforum posti-
corum flavis.

Hab. in Europa. In Brassicæ larvis.

Obs. Ex descriptione hujus ichn. patet
antennas fasciatis esse aut non fas-
ciatas, *scutellum* thoraci concolor aut
non concolor, species diversas non
semper annunciare, ut optime obser-
vavit *D. de Geer.*

Ex Inf. paris. Entom. que paris.

Tubercula-163. I. (le tuberculé) ater, pedibus rufis,
tus. fetis ani longitudine corporis, abdo-
mine tuberculis lateralibus.

Hab. in Europa.

Desc. Ichn. compunctori affinis. Incisuræ
abdominales tuberculis duobus dis-
tinctis. V.

Compunc-164. I. (le traître) ater, pedibus rufis,
tor. fetis ani corpore triplo brevioribus.

Reaum. inf. tom. 2. t. 35. f. 23.

Hab. in Europa.

Desc. Antennæ nigræ, corporis longitudine. *Pedes* fulvi. *Femora* basi nigra. *Aculeus* abdomine multo minor. V.

Obs. Fallax nomen; ichn. enim *Linn. compunctor* ad ichn. n. 6. ejusdem operis referendus. V.

Petiolatus. 165. I. (le petiolé) ater, pedibus rufis, setis ani corpore triplo brevioribus, abdominis basi tenui, longa, petiolata.

Hab. in Europa.

Desc. Niger. *Antennæ* corpore breviores. *Femora* posteriora incrassata. *Pedes* fusco-rufi. V.

Obs. Nota characteristica incerta; plurimis enim speciebus convenit. V.

Femoralis. 166. I. (le gorgé) niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis globosis.

Hab. in Europa. In fenestris non rarus.

Desc. Niger. *Antennæ* corpore breviores. *Femora* postica globoso-incrassata. *Pedes* fusco-fulvi. V.

Genicula- 167. I. (le géniculé) ater, pedibus fulvis, rus. geniculis albis.

Hab. in Europa.

Desc. *Pedes* fulvi. *Tibiæ* basi albo annulatae. Abdominis setæ corpore dimidio breviores. V.

Crassipes. 168. I. (le crassipede) niger, femoribus crassissimis, fulvis, puncto albido.

Hab. in Europa.

Desc. Niger. *Antennæ* corporis dimidium æquant. *Coxæ*, femorum longitudines

Tibiæ crassæ, incurvatæ. *Alæ* nigricantes. Forſan ſphex. V.

Obscurus. 169. I. (l'obscur) fuscus, capite abdominisque apice nigris.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* longitudine corporis. *Caput* nigrum. *Thorax* fuscus apice niger. *Abdomen* fulvum, segmento primo ultimisque nigris. *Alæ*, puncto marginali fusco. *Pedes* fusci. V.

Apicarius. 170. I. (le mélanure) flavo-ferrugineus, thoracis apice nigro.

Hab. in Europa.

Desc. *Totus* fusco - testaceus. *Antennæ* corpus æquant. *Thorax* apice niger. *Setæ abdominales* brevissimæ. V.

Melanop- 171. I. (le mélanoptere) fuscus, nigro maculatus, alis nigris.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* nigæ, corporis fere longitudine. *Caput* fusco-fulvum, macula nigra. *Oculi* nigri. *Thorax* capituli concolor, maculis 4 nigris, quarum duæ laterales, tertia intermedia, quarta apicaria. *Abdomen* maculis dorsalibus nigris, longitudinaliter digestis. *Pedes* fusci, articulis pallidioribus. *Aculeus* fulvus, vaginis nigris. *Variat* capite thoraceque nigris, im-maculatis. V.

Linearis. 172. I. (le linéaire) rufus, nigro maculatus, alis albis cruciatis.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* corpore minores. *Alæ* albæ cruciatæ. *Abdomen* supra nigrum,

Pedes fulvi. *Setæ abdominales* corpus fere æquant. V.

Punctula- 173. I. (le militaire) niger , fronte punctatus.

Hab. in Europa.

Desc. Niger. *Antennæ* corpore minores. *Oculorum* orbita lutea. *Thorax* niger , linea obliqua lutea ante alas , punctisque duobus luteis lateralibus utrinque. *Femora* basi flavo punctata. *Mas.* V.

Scanicus. 174. I. (le panaché) niger , pedibus segmentisque abdominis margine ferrugines , tibiis posticis albo , nigro fulvoque variagatis.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* fuscae. *Caput thoraxque* nigra. *Abdomen* nigrum , incisuris fulco marginatis. *Tibiæ* posteriores nigro , albo fulvoque variegatae , *tarfis* albo fuscoque mixtis. V.

Vittatus. 175. I. (le mandarin) fulvus , antennis pelibusque nigris , alis atris , fascia transversa lutea.

Hab. in Europa.

Ruficus. 176. I. (le rustique) niger , pedibus rufis , setis ani corpore duplo brevioribus , tiliis posticis nigris.

Hab. in Europa.

Quadripes. 177. I. (le quadripede) niger , abdomine falcato , palmis quatuor anticis albis.

Hab. in Europa.

Obs. An albedo tarforum semper eodem modo distributa ? In nonnullis speci-

minibus tarfi pedum intermediorum
& posticorum albi. V.

Flavipes. 178. I. (le flavipede) niger , abdomine
ferrugineo , pedibus flavis.

Hab. in Europa.

Arlequina-179. I. (l'arlequiné) niger , segmentis ab-
dominalibus margine fulvis , pedibus
ferrugineis annulis albis.

Hab. in Europa.

Signatus. 180. I. (le marqué) fulvus , capite thora-
ceque supra nigris , albis fetis corpus
æquantibus.

Hab. in Europa.

Segmento-181. I. (le bizarre) ater , alis nigris , seg-
mentis abdominalibus 1, 2, 3, rubris ,
margine luteis.

Hab. in Europa.

Petiola- 182. I. (le pétiolé) fulvo fuscoque varie-
gatus , abdominis petiolo tenui , alis
fascia transversa fusca.

Hab. in Europa.

Obs. Sub eodem nomine triviali duo ich-
neumones in *entom. parif. n. 9* , &
n. 104. ordinantur Hic ater , pedibus
rufis , fetis ani triplo brevioribus , ab-
dominis basi tenui longa , petiolata. Di-
versæ species , ergo diversæ nominandæ.

Desc. Ultimus longus , tenuis. *Antennæ*
corporis dimidium æquant. *Corpus*
nigrum. *Pedes* fulvi. *Aculeus* corpore
multo brevior. *Femora* basi nigra.

Inversus. 183. I. (l'inverse) niger , pedibus quatuor
anticis luteis , abdomine subtus fulvo.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* fuscæ, corporis longitudine. *Caput*, *thorax*que nigra. *Abdomen* supra nigrum, incisurarum margine albescente, *subtus* fulvum, basi luteum. *Pedes* quatuor anteriores lutei, *postici* nigri; flavo *subtus* maculati.

Bifascia- 184. I. (le bifascié) niger, alis fascia duplici transversa nigra.

Hab. in Europa.

Obs. Alarum maculis nigris inæqualibus ab omnibus aliis primo intuitu distinguitur. V.

Cæpæ. 185. I. (de l'oignon) niger, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Hab. in Europæ cæpis, porris, alliis.

Desc. *Antennæ* nigræ. *Abdomen* in medio fulvum, basi apiceque nigrum. *Alæ* puncto marginali atro. *Pedes* fulvi; femoribus nigricantibus.

Obs. Variant *antennæ* femoræque:

Fasciatus. 186. I. (le fascié) ater, antennis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus margine luteis.

Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Adultera- 187. I. (le pantomime) niger, pedibus tor. rufis.

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis.

Desc. Adeo similis ichn. *manifestatori*, ut hujus descriptio nostro conveniat. *Corpus* ejusdem magnitudinis. *Abdomen* sessile, sed *aculeus* corpore paulo minor. *Mus* fœminæ similis, exceptis antennis in primo annulatis.

Situs

Situs pedum 4 anteriorum uti in ichn. manifestatori.

Extrica- 188. I. (le développé) capite thoraceque
tor. nigris, abdominis rubelli incisuris quasi
extricatis, pedibus luteis.

Hab. in Gallia, prope Massiliam.

Desc. Medius. Antennæ flavescentes. Caput & thorax nigra. Abdomen pallido-rubrum, incisuris non se invicem regentibus, inde annulo nigro singulis cinctis. Aculeus, abdominis longitudine, ruber; vaginis nigris. Pedes flavi.

Obs. Datur alius fere omnino similis, sed aculeus qui, in ichn. extricatore abdominis longitudinem superat, in hoc quadruplo minor. Cætera similia.

Læviga- 189. I. (le polisseur) niger lævigatus,
tor. abdominis secundo tertioque segmentis
rubris, femoribus rubris.

Hab. rarior in Gallia Aust.

Desc. Magnus. Antennæ capitis thoracisque longitudine, nigrae. Caput, thorax, petiolus ultimaque abdominis segmenta itidem nigra. Pedes rubri, tibiæ autem & tarsi posteriorum nigri. Alæ obscure flavescentes corpore breviores. Abdomen lævigatum, in medio rubrum. Aculeus brevissimus. Marem non vidi.

Coxator. 190. I. (le hanché) niger, coxis longissimis, abdomine tenui elongato, in medio rufè.

Hab. in Gallia Aust.

Desc. Medius. Antennæ supra fusca; subtus rufæ. Caput, thoraxque nigra. Abdominis petiolus antice niger, postice flavo-ruber. Regio ani nigra.

Femora omnia nigra. *Tibiæ* & *tarsi* quatuor pedum primorum fulvi, posteriorum nigro fulvoque variegati. *Coxæ* posteriores adeo elongatæ, ut femur duplex videatur.

Falculator. 191. I. (le moissonneur) niger, antennis rufis, abdomine falcolato, pedibus flavis.

Hab. in Gallia Aust. prope Massiliam.

Desc. Magnus. *Antennæ* fere longitudinem corporis æquantes, convolutæ. *Caput*, *thorax*, fere totus abdominis petiolus, abdomen infra, nigra. *Abdomen* adeo parte posteriori arcuatum, ut falculam imitetur. *Pedes* omnes flavescentes, at *tibiarum* posticarum pars infima fusca. *Fæminam* non vidi.

Illecebra- 192. I. (l'attrayant) nitido niger, pedibus fulvis.

Hab. in Gallia, prope Lugdunum.

Desc. Magnus. *Antennæ* nigrae longitudine corporis. Ichn. *manifestatori* primo intuitu similis, sed *pedes* aliter dispositi *aculeus*que multo minor. Elegans animal corpore nigro nitido, antennarum magnitudine. Pro sirege facile fumeretur. *Pedes* omnes rufi. *Mas* mihi ignotus.

Lingula- 193. I. (la spatule) fuscus, antennis corpore longioribus, abdomine lingulæformi. t. 8. f. 5.

Hab. in Gallia Aust. prope Nemausum.

Desc. Minor. *Antennæ* nigricantes. *Alæ* maculatæ. *Abdomen* crassum, infra planum. *Aculeus* longitudine corporis, niger, at *vaginæ* rubellæ. *Pedes* omnes variegati.

Terrefac- 194. I. (le formidable) testaceus , capite ,
tor. thoraceque nigro maculatis , antennis
nigris. t. 8. f. 6.

Hab. in Gallia Aust. prope Nemausum.

Desc. Mediocris. *Antennæ* oculique nigri.
Caput testaceum ; in medio macula
nigra angulata. *Thorax* testaceus , lineis
f. maculis longitudinalibus , quarum
latitudo inæqualis , supra notatus.
Macula nigra super petiolum. *Aculeus*
testaceus , corpore duplo longior ;
vaginæ nigræ. *Femora* testacea ; *tarsi*
omnes nigri. *Tibiæ* posteriores nigræ.

Decora- 195. I. (le décorateur) antennis , capite ;
tor. thorace ; segmentis ultimis abdominis
nigris ; ano albo.

Hab. in Europa , prope Massiliam.

Desc. Eggregium animal. *Antennæ* rufæ ;
apice fuscæ. *Caput* *thorax*que antice
nigra. Pars thoracis postica , petiolus ,
fere totum abdomen , rubicunda. *Alæ*
diaphanæ eleganter fusco fasciatæ ;
anus albus. *Aculeus* brevis , pallide
testaceus. *Femora* posteriora rufa ;
tibiæ *tarsique* ejusdem rufescentes uti
femora alia quatuor.

Cephala- 196. I. (le monstrueux) capite grosso ;
tor. alis fusco fasciatis.

Hab. in Gallia Australiore.

Desc. Minor. *Antennæ* rufæ. *Oculi*
magni , nigri , prominuli ut in cicin-
delis , inde caput monstruosum ratione
longitudinis insecti. *Thorax* in parte
antica ruber , in medio niger , pos-
tice adhuc ruber. *Abdomen* in parte
postica nigrum , in parte antica ru-
brum. *Aculeus* brevissimus , testaceus.
Alæ maculatæ ut in præcedenti.

Colora- 197. I. (le barbouilleur) scutello thoraci
tor. concolore , thorace rubro , abdomine
nigro.

Hab. in Europa. In Gallia , prope Massi-
liam.

Desc. Minor. *Nigra* sunt antennæ ,
caput , oculi , abdomen. *Thorax*
ruber supra & infra. *Pedes* fulvi. *Mas.*

Pterome- 198. I. (le ptéromele) scutello thoraci
las. concolore , thorace antice rubro , pos-
tice nigro , abdomine fulvo.

Hab. in Europa. In Gallia , prope Massi-
liam.

Desc. Statura , facies & magnitudo præ-
cedentis , sed aliter coloratus. *Thorax*
in parte postica niger. *Abdomen* ful-
vum. *Aculeus* pallidus , corpore lon-
gior. *Vaginæ* nigrae. An præcedentis
fœmina ?

Depressa- 199. I. (l'aplati) niger , scutello thoraci
tor. concolore , abdomine depresso.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. montibus.

Desc. Animal adeo planum ut truncatum
videatur. *Totum* nigrum , exceptis tibiis ,
omnibus & femoribus posticis rubris.
Aculeus brevis niger. *Alæ* fusca.

Tentator. 200. I. l'essayeur) niger , antennis corpore
longioribus.

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. *Totus* niger *Antennæ* longissimæ.
Alæ nitentes , puncto marginali fusco.
Pedes obscuri.

Cavator. 201. I. (le creusé) niger , pedibus fulvis ,
petiolo cavato.

Hab. in Europa. In nemoribus prope
Lugdunum.

Desc. Magnus. *Totus* niger, exceptis
pedibus fulvis. *Coxæ* femorum poste-
riorum nigræ, longissimæ, crassæ.
Abdomen latum, petiolo foveato.
Aculeus thorace brevior.

Imitator. 202. I. (l'analogue) niger, pedibus rufis.
Hab. in Europa. In Bressæ nemoribus.
Desc. Similis ichn. *manifestatori*; etiam
pedes intermedii a primis remotiores.
Totus niger. *Pedes* postici elongatissimi.
Aculeus brevissimus. *Mas* fœminæ
similis.

Pictor. 203. I. (le peintre) testaceus, thorace
capiteque nigris, abdomine falcato
testaceo.

Hab. in Europa. In Bressia.
Desc. Nigra sunt antennæ, caput,
thorax apexque abdominis, testacea
reliqua. Primo intuitu ichn. *latro enum.*
videtur, sed *abdomen* fere totum
testaceum, nec ad latera nigro macu-
latum. *Aculeus* brevis. *Alæ* variis
coloribus lucentes.

Obsusca- 204. I. (l'obscurci) niger, abdominis tes-
tor. tacei basi apiceque nigris, alis obscu-
rissimis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope
Lugdunum.

Desc. Niger. *Abdomen* testaceum basi
apiceque nigrum. *Alæ* nigricantes.

Cruciator. 205. I. (l'inquiétant) niger, abdomine in
medio pedibusque fulvis.

Hab. in Gallia passim.

Desc. Minor. *Antennæ* nigræ, corpore
breviores. *Caput*, *thorax* *abdomen-*
que nigra, at ultimum segmentum

in medio fulvum. *Aculeus* longitudine fere corporis, niger. *Vaginæ* rufæ. *Mas* foeminæ similis. Larvis infestus.

***** *Antennis luteis setaceis.*

Luteus. 206. I. (le jaune) luteus, thorace striato, abdomine falcato. *

Raj. inf. 253. n. 6.

Gæd. inf. 2. t. 37.

List. Gæd. t. 20. f. C.

Fab. 95.

De Geer tom. 2. p. 850. t. 29. f. 16, 17. abdomine falcato fulvo, oculis viridibus nitidis.

Geoff. tom. 2. p. 330. n. 21.

Schæff. icon. t. 1. f. 12.

—— *icon.* t. 101. f. 4.

Sulz. inf. t. 18. f. 118.

Enum. n. 750.

Faun. Fridr. n. 620.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 857.

Hab. in larvis phalænarum, larva larvæ adherente.

Desc. Totum corpus, caput, thorax, abdomen, antennæ, pedes unius ejusdem coloris flavi, vel dilute lutei.

Alæ membranacei coloris, puncto marginali luteo. *Abdomen* arcuatum, basi angustiore petiolo adfixum. *Antennæ*, longitudine fere corporis, infinitis articulis. *Oculi* nigricantes. *Faun.* 1628.

Ramidu- 207. I. (le taché) luteus, abdomine falcato, apice nigro. *

lus.

Raj. inf. 253. n. 7.

Aldr. inf. t. 7. f. e.

Geoff. paris. tom. 2. p. 331. n. 23.

Enum. n. 751.

Hab. in Europa.

Desc. Corpus totum luteum; duo tantum segmenta extrema abdominis nigra. *Alæ* membranacei coloris. *Antennæ* longitudine corporis. *Faun.* 1629.

Obs. Mas a fœmina solius aculei defectu differt, qui tamen etiam in hac vix exsertus. *Enum.*

Glaucop- 208. I. (le glaucoptere) luteus, pectore
terus, nigro, abdomine falcato, ano nigro. *

Fab. 102.

Schæff. icon. t. 82. *f.* 3.

Hab. in Europa. In Gallia, prope Lugdunum lectus.

Desc. *Antennæ*, capitis latera, pedes, abdominis antice pars, ferruginea; at *thorax* subtus & *abdominis* tria extrema segmenta nigra. *Faun.* 1630.

Circum- 209. I. (le circonflexe) niger, abdomine
flexus. falcato, antico luteo, pedibus posticis nigro geniculatis, scutello flavo. *

Fab. 103.

Hab. in Europa. In Bressia non rarus. V.

Desc. Caput nigrum: linea circum oculos fulva: macula frontis flava & labium flavum. *Antennæ* ferruginæ. Apex thoracis macula flava. Pedes ferruginei, sed postici basi ovati, nigri. Femora & tibiæ apice nigra. Abdomen flavo-ferrugineum, compressum, falcatum, sed apice nigrum; in dorso abdominis linea longitudinalis nigra. *Faun.* 1631.

Cinctus. 210. I. (l'entouré) ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis, fasciis duabus nigris. *

Geoff. parif. 2. p. 359. *n.* 85.

Fab. 107.

Hab. in Europa.

Desc. Parvus est ; magnitudine culicis , angustus , totus niger , *antennis* tenuissimis rectis. *Totum* corpus atrum est , sed *femora* primora rufescunt. *Alæ* aqueæ cum macula magna nigricante postice ; & ante hanc lineola transversa nigra. *Faun.* 1632.

Formica 211. I. (la fourmi) niger , *antennis* pedibusque ferrugineis , *alis* hyalinis *stigmatate* nigro.

Fab. 105.

Hab. in Hammarby meo. J. C. Fabricius.

Corpus nigrum totum , *formica* minus. *Antennæ* ferrugineæ , vix corporis longitudine. *Abdomen* clavatum , *aculeo* ferrugineo longitudine corporis. *Alæ* puncto marginali nigro. *Pedes* ferruginei , *femoribus* posticis nigris.

Ex spec. D. Fab.

Dentatus, 212. I. (le défendu) niger , flavo maculatus , *scutello* apice bidentato , flavo , ano bidentato. *It. Norw.*

Hab. in Norwagiæ lucis. D. Præp Stroem.

Amictus. 213. I. (l'habillé) niger , *abdomine* falcato , *antennis* pedibusque ferrugineis.

Hab. in Anglia. Mus. de Banks.

Desc. Magnus. *Antennæ* flavæ. *Caput* nigrum , *fronte* macula flava. *Thorax* ater , immaculatus. *Alæ* obscuræ. *Abdomen* falcatum , ferrugineum. *Pedes* ferruginei , apice albidî. *Fab.*

Fuscatus, 214. I. (le rembruni) niger , *abdomine* fascia ferruginea , *alis* fusco maculatis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Statura ichn. *cinâi* parva. *Caput* nigrum, - fronte flavescente. *Thorax* niger immaculatus. *Abdomen* nigrum, fascia antica fulva. *Pedes* ferruginei. *Fab.*

Mutilla- 215. I. (la mutille) flavescens, abdomine rius. fascia atra, alis fusco maculatis.

Hab. Hafniæ.

Desc. Statura ichn. *formicati*. *Corpus* totum flavescens, thorace tamen obscuriore. *Aculeus* exsertus, longitudine corporis.

Ex Enum.

Xantopus. 216. I. (le blond) antennis setaceis ferrugineis, aculeo brevi pedumque apicibus flavis, abdomine falcato.

Geoff. tom. 2. p. 331. n. 22.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Demta magnitudine & aculeo, fœmina mari per omnia similis. *Flava* sunt, frons, palpi, aculeus, plantæ pedum & tibiæ primi paris. *nigra* sunt, oculi, pectus, thorax, scutellum, apex abdominis, tibiæ posticarum apices. Ferruginea reliqua. *Enum.*

Melanops. 217. I. (le bruni) ferrugineus, oculis, abdominis apice aculeique vaginis nigris.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Totus* ferrugineus. *Abdomen* petiolatum, non falcatum, apice fuscum aut nigricans. *Aculeus* totus cum suis vaginis ater. *Scutellum* fulvum. *Pectus* antice utrinque linea nigra flavo marginata & macula flava ad apophysin femorum posticorum. *Fœmina.* *Enum.*

Nigrocu- 218. I. (le noirci) ferrugineus , abdomine
lus. petiolato , basi nigredine notato ,
aculeo nigro.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Multum priori similis , sed tamen
fortasse diversus. Ferrugineus totus.
Nigra sunt , oculi , petiolus , segmen-
torum bases supra , ita tamen , ut
nigredinis latitudo in quovis segmento
minuatur , aculeus denique cum va-
ginis. *Abdomen* petiolatum non falca-
tum. *Fœmina. Enum.*

Quadri- 219. I. (le quadriponctué) ferrugineus ,
punctatus. scutello flavo , abdomine fuscescente ,
ad basin paribus duobus punctorum
nigrorum elevatorum.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Desc. Ferrugineus. *Frons* & *os* flava.
Oculi nigri. *Thoracis* medio linea lon-
gitudinalis nigra. *Scutellum* flavum.
Abdomen ex ferrugineo-fuscescens ,
nec falcatum , petiolo nigro , seg-
mento secundo & tertio ad basin
punctis duobus elevatis nigris , quæ
puncta in sequentibus obsoletissima.
Femora postica crassiuscula. *Mas.*
Enum.

Vindus. 220. I. (l'enchaîné) ferrugineus nitens ,
scutello flavo , femoribus posticis sub-
clavatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Circa
Nemausum. V.

Desc. Priori simillimus , nisi quod *pectus*
ad femorum apophyses nigro colore
tingatur , postque *scutellum* flavum
linea atra tenuis , funis instar , in-
sectum circumdet ; cætera æquabiliter
ferruginea. *Enum.*

Melano- 221. I. (le mélanophtalme) ferrugineus ,
phtalmus. oculis , thoracis apice abdominisque
basi lateribus nigris. *Mas.*

Beytr. Zur. Nat. p. 91. p. 49. §. 57.

Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Forcica- 222. I. (le taillandier) fuscus , aculei vaginis
tus. forcicatis.

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis.

Desc. Magnitudine mediocri. *Totus* fuscus , exceptis antennis luteis , pedibus ferrugineis punctoque frontali testaceo. *Aculeus* brevis. *Vaginæ* forciformes , pilosæ. *Esset* firex , sed *aculeus* non ferratus.

Torqua- 223. I. (le cordé) fulvus , incisuris abdominis albo cinctis. t. 8. f. 7.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. pratis.

Desc. Ratione magnitudinis valde angustatus. *Totus* fulvus. *Abdominis* singula incisura postice albo cincta. *Aculeus* albidus corporis longitudinem fere æquans,

Lunulatus. 224. I. (le Turc) niger , abdominis segmentis flavo cinctis.

Hab. in Europa. In Bressia lectus.

Desc. Cum maximis certat ; niger , flavo variegatus. *Caput* nigrum , fronte flava. *Thorax* niger , lineola flava ante alas utrinque , postice lunulatus , lunula flava , cornubus *abdomen* spectantibus. Ante lunulam puncta duo flava , post lunulam unam. *Incisuræ* omnes *abdominis* flavo postice marginatæ. *Pedes* flavi. *Femora* posteriora aliquoties fulco interne maculata. *Mas.*

Femora- 225. I. (l'hydropique) fuscus , antennis
tus, luteis , femoribus posticis incrassatis.

Hab. in Europa. Circa Lugdunum.

*Desc. Magnitudo media. Fuscus Femora
fulva , posticis crassioribus. Pedes an-
teriores fulvi. Aculeus brevis.*

Bicolor, 226. I. (le bicolor) niger , antennis luteis ,
abdomine fulvo.

Hab. in Europa. In Bressia.

*Desc. Niger. Abdomen fulvum , petiolo
nigro. Pedes abdomini concolores.
Femora postica nigra.*

Anceps, 227. I. (le douteux) antennis supra nigris ,
infra luteis , capite thoraceque nigris
luteo variegatis , abdomine pedibus-
que luteis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. rarior.

*Desc. Magnus. Ad quam divisionem perti-
neat , incertum. Elegantissimum animal.
Antennæ longæ superne nigrae , infra
luteæ , basi utrinque lutea. Caput ni-
grum postice , antice flavum. Thorax
niger postice , in medio dorsi flavus.
Punctum prominens flavum inter alas
secundas. Scutellum canterio flavo no-
tatum. Abdomen flavum , falcatum ,
inacisuris primis fulvis , ultimis latera-
liter maculatis. Pedes omnes flavi.*

Ex Hist. inf. paris. Entom.que paris.

Virgatus, 228. I. (le flagellé) luteus , thorace fas-
ciis tribus longitudinalibus fuscis.

Hab. in Europa. In Gallia circa ilices.

*Desc. Fulvo-luteus. Oculi nigri. Thorax
fasciis tribus longitudinalibus nigris.
Labium flavum. Pedes fulvi. Tarsi pos-
teriores pallidi. V.*

Fasciatus. 229. I. (le fascié) ater , antennis pedibusque flavis , segmentis abdominalibus margine luteis.

Hab. in Gallia.

***** Minuti *Antennis filiformibus. Abdomine ovato sessili.*

Muscarum. 230. I. (des mouches) auratus , pedibus flavis saltatoriis.

De Geer inf. 1. t. 32. f. 19 , 20.

Fab. 109.

Faun. Fridr. n. 621.

Hab. in larvis muscarum aphidivorum.

In Gallia Aust. V.

Bedeguaris. 231. I. (du bédéguaire) auratus , thorace viridi , abdomine aureo. *

Ræf. inf. app. t. 53. f. F. H.

Blank. inf. 188. n. 12.

Fab. 110.

De Geer tom. 2. p. 877. t. 30. f. 20 , 21.
antennis fractis , clavatis nigris , capite thoraceque æneis , abdomine purpureo nitido , pedibus flavis.

Geoff. paris. 2. p. 296. cynips 1. setis ani corpore longioribus.

Ad. nat. Curios. Dec. 2. ann. 2.
Obs. 10.

Faun. Fridr. n. 622.

Hab. in gallis rosæ , quercus.

Desc. Omnium hujus generis pulcherrimus , magnitudine minimæ formicæ. Antennæ cylindræ , nigræ , corpore dimidio breviores. Thorax æneoviridis. Abdomen deauratum , ignei coloris. Pedes incarnati. Aculeus triplex setæ instar , longitudine corporis , niger , intermedio rubro. Faun. 1634.

Gallarum. 232. I. (des galles) fusco-æneus , abdomine nigro , tibiis albidis. *

Fab. 111.

Hab. in cynipedis quercus ramuli larvis.

Desc. cynipidem dixissem , nisi locus & alimentum prohibuissent. Similis ichn. *larvarum* , sed totus , excepto capite , fusco-æneus. *Abdomen* solum nigrum. *Tibiæ* omnes albæ. *Antennæ* corpore breviores , articulis septem. *Faun.* 1638.

Juniperi. 233. I. (du génévrier) auratus viridis , antennis nigris , puncto alarum rubro. *

Fab. 112.

Hab. in tipulæ juniperi larva. In Gallia Aust. *Ibid.* V.

Desc. Corpus totum viridi-æneum , magnitudine pediculi. *Antennæ* nigræ , spirales. *Alæ* aqueæ , puncto marginali rubro. *Larva* rubra. *Puppa* ovata , pellucida , aquei coloris. *Faun.* 1635.

Pupparum. 234. I. (des chrysalides) auratus cæruleus , abdomine viridi nitido , pedibus pallidis.

Scop. carn. 765. ichneumon Antiopæ.

Raf. inf. 2. *vesp.* t. 3.

Fab. 113.

De Geer tom. 1. p. 604. t. 35. f. 14.-17.-t. 32. f. 17.-22. *tom.* 2. p. 883. saltator æneus , antennis fractis clavatis , pedibus flavis , alarum nervo longitudinali appendiculato.

Geoff. tom. 2. p. 305. cynips 24.

Enum. n. 758.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 860.

Hab. in puppis papilionum & muscarum.

Desc. Viridi-auratus. *Abdomen* æneum. Variant *antennæ* in utroque sexu.

Larvarum. 235. I. (des larvæ) auratus viridis ;

abdomine nigro, macula dorsali purpurascēte, pedibus flavis, antennis septemnodis.

Fab. 114.

De Geer tom. 2. p. 889. t. 31. f. 1, 9.
saltator, antennis fractis clavatis, capite thoraceque æneis, abdomine nigro macula fusca, pedibus flavescētib.

Faun. Fridr. n. 623?

Reaum. inf. 2. t. 36. f. 9, 10, 11.

Enum. n. 759?

Hab. in larvis phalænarum variarum.

Desc. Caput, thoraxque viridia. Antennæ clavatæ fractæ. Oculi nigri. Abdomen nigrum, macula fusca ad basin. Pedes viridi-albidi. V.

Cynipidis. 236. I. (des cynips) auratus viridis, abdomine fusco, basi cingulo pallido, pedibus flavescētib. *

Fab. 115.

Hab. in larvis cynipidis gallarum folicis pentandræ intus concameratarum, nec non in puppis phalænarum.

Desc. Antennis reliquisque parum differt a præcedenti. Magnitudo vix pulicis. Caput & thorax nitide viridi-sericeæ. Abdomen ovatum, fuscum, basi pallido cingulo cinctum. Pedes pallidi. Antennæ minus pallidæ, corpore breviores. Faun. 1639.

Cœccorum. 237. I. (des gallinsectes) nigro-æneus, abdomine cærulescēte, pedibus lividis.

De Geer inf. 1. t. 35. f. 17.

Fab. 116.

Enum. n. 760.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 860.

Hab. in coccis. In Gallia. Ibid, V.

Desc. Antennæ clavatæ. Oculi nigri. Alæ diaphanæ. Salit. V.

*Secalis. 238. I. (du seigle) niger, capite rufo, oculis viridibus. **

Fab. 117.

Hab. in larvis spicarum secalis.

Desc. Magnitudo pediculi. Caput rufum. Oculi pulchre virides. Thorax totus niger. Antennæ nigræ, filiformes, longitudine vix corporis. Alæ puncto marginali subrotundo, atro. Abdomen ovatum, nigrum, læve, petiolo scabro. Aculeus longitudine abdominis. Faun. 1641.

Subcuta- 249. I. (des mineuses) niger, alis hirsutis, macula lunari nigra, antennis sub-filiformibus.

De Geer inf. 1. t. 30. f. 21.

Fab. 118.

Hab. in larvis subcutaneis.

Desc. Niger. Antennæ longæ, pilosæ. Alæ primores, macula marginali lunulata. V.

Aphidum. 240. I. (des pucerons) niger, abdomine basi pedibusque anticis genibusque posticis flavis.

It. Gotl. 307.

Frisch. inf. 11. t. 19.

Geoff. paris. 2. p. 322. n. 4.

Fab. 122.

De Geer tom. 2. p. 866. t. 30. f. 4.-13. niger, antennis filiformibus, ore flavesciente, pedibus fusco nebulosis.

Hab. in aphidibus.

Desc. Ambulat hic super aphides, magnitudine pulicis, præcedenti similis. Totus niger. Abdomine ad basin, ut & pedibus,

pedibus, flavis; sed *pedes postici* modo ad genicula flavi. *Antennæ* atræ; cum ova deponit, anum versus thoracem inflectit & incurvat aratri instar, eoque pungit vel anum aphidis vel appendiculi apicem. *Faun.* 1643.

Ovulorum. 241. I. (des œufs) niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longis.

De Geer inf. I. t. 35. f. 11, 12, 13.
Fab. 123.

Enum. n. 761.

Faun. Fridr. n. 624.

Beytr. Zur. Nat. p. 46. §. 2.

Hab. in ovis lepidopterorum.

Desc. Alium nonnihil diversum vidi ex ovis phalænarum omni pulice minorem, toto corpore atrum. *Faun.* 1644.

Obs. In ovis cimum lepidopterorumque. *Enum.*

Globatus. 242. I. (le tourneur) niger; pedibus ferrugineis.

Scop. carn. 766.

Merian. Eur. t. 22.

Frisch. inf. 6. t. 10.

Raj. inf. 255. n. 13.

Reaum. inf. 2. t. 35. f. 5, 6.

Derham. theol. l. 8. c. 6. n. 21.

Fab. 120.

De Geer tom. 2. p. 862. t. 29. f. 12, 13,

14. niger antennis filiformibus, pedibus luteis, abdomine subtus virescente.

Geoff. inf. tom. 2. p. 320. n. 1.

Faun. Fridr. n. 625.

Enum. n. 762.

Minuti plurimi antennis articulis 10 tantum, primo longo; abdomine sessili corpore sericeo differunt & ad tenthredines propius accedunt, imprimis, qui subcutanea plantarum larva prodeunt, affines tenthredini intercuti.

Journal des Savans, 1713. p. 474.

Hab. in culmis, intra folliculum communem, bombycinum, subrotundum, album.

Desc. Niger. *Antennæ* longitudine corporis, pedibus fulvis. V.

Glomera- 243. I. (le fileur) niger, pedibus flavis. *
tus,

Scop. carn. 767.

Gæd. inf. I. p. 59. n. II.

List. Gæd. 17. n. 7.

Reaum. inf. 2. t. 33. f. 2, 7, 8.

Merian. Eur. t. 48.

De Geer inf. I. t. 16. f. 6.

Raj. inf. 260, 254. n. 12. *Cant.* 35.

Ræf. inf. 2. *vesp.* 4. t. 3.

Geoff. paris. p. 321. n. 2.

Fab. 121.

Faun. Fridr. n. 626.

Enum. n. 765.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 860.

Hab. in larvis papilionum. Exeuntes proprios folliculos flavos nectunt, intra quos excluduntur. Observant papilionis puppam, nuper exuta larva, in quam ova immittant.

Desc. Corpus nigrum, magnitudine pulicis. *Antennæ* nigrae, corpore longiores. *Pedes* flavi. *Faun.* 1646.

Atomus. 244. I. (l'atome) pallido fuscoque varius.

Hab. Uplaliæ.

Minor acaro sirene, & adeo parvus, ut vix oculis manifestus, nisi motu, adeoque inter minima insecta alata numerandus.

Pectinicorn- 245. I. (le pectiné) ater, antennis
nis. ramosis.

Fab. 124.

De Geer inf. 1. t. 16. f. 6.

— *Act. Stockh. 1740. p. 464. t. 1. f. 4.-6.*

Hab. in larvis subcutaneis quercus.

Desc. Antennis ramosis facile dignoscitur. Nigro-fuscus. Alarum margo exterior pilosus. V.

Ex oper. D. de Geer.

Aranea- 246. I. (des araignées) niger , antennis filiformibus , thorace lineis 2 pedibusque flavis. *Retz. 277.-tom. 2. p. 863. t. 30. f. 1.-3.*

Hab. in araneis. In Gallia. V.

Desc. Niger. Thorax , lineis duabus flavis. V.

Tinearum. 247. I. (l'étoile) niger , antennis filiformibus , pedibus rufis. *Retz. 279.-tom. 2. p. 875. t. 30. f. 14 -19.*

Hab. in tineis. In Gallia Aufst. V.

Rufescens. 248. I. (le roufsâtre) rufus , antennis fractis clavatis , thorace postice abdomineque nigris , macula alarum magna fusca. *Retz. 281.-tom. 2. p. 882. t. 30. f. 22.*

Hab. in Europa.

Apum. 249. I. (le rufé) saltator , nigro-viridescens , antennis fractis clavatis , pedibus fuscis nigro maculatis. *Retz. 283.-tom. 2. p. 887. t. 32. f. 23.-25.*

Hab. in larvis apum.

Desc. Magnitudine pulicis. Lucido-niger. Pedes fusci , maculis nigris. De Geer

Globiceps. 250. I. (le globuleux) saltator æneus , antennis fractis clavatis , capite glo-

bofo, pedibus flavis, abdominis medio flavo, punctis 6 nigris in mare. *Retz.* 285.-tom. 2. p. 896. t. 31. f. 10.-12.
Hab. in potentillæ reptantis gallis.
Desc. Caput & thorax viridia. Abdomen viride, incisuris tribus flavis, sex maculis viridibus lateralibus. Caput cras-
 sum, rotundum. *De Geer.*

Ex spec. D. Fab.

Conicus. 251. I. (le conique) niger, abdomine conico acutissimo, femoribus clavatis ferrugineis.
Hab. in Danicæ nemoribus.
Desc. Parvus. Totus ater, femoribus folis ferrugineis. Alæ obscuræ.

Ramicor- 252. I. (le ramicorne) viridis, antennis
 nis. ramosis.
De Geer tom. 2. p. 899. t. 31. f. 14.
 saltator æneus, antennis mari ramosis,
 pedibus flavis.
Hab. in phalænarum larvis.
Desc. Aurato-viridis. Antennæ lutes-
 centes. Pedes albi. V.

Quadrum. 253. I. (le géometre) niger, æneo-nitens,
 abdominis basi pedibusque ferrugineis,
 alis albis, maculis duabus margina-
 libus atris. *Mantiss.* Ibid.
Hab. Halæ. *D. Hybner.*
Desc. Parvus. Caput fuscum, viridi-
 nitidum. Thorax niger, postice parum
 viridi-nitens. Abdomen basi ferrugi-
 neum, apice nigrum, aculeo brevi
 exserto. Antennæ ferrugineæ, apice
 nigrae. Pedes ferruginei. Alæ albæ,
 anticis maculis duabus magnis, costa-
 libus atris, quadratis.

Sphegum. 254. I. (des sphex) niger immaculatus, alis albis.

Hab. Dresdæ Saxonum. *D. Heiffe.*

Desc. Minutus. *Totus* ater immaculatus, nitidus, alis albis immaculatis.

Ex Enum.

Tortricis. 255. I. (des tortrix) niger, minutus, abdomine ovato, depresso, sessili, subtus pallidiore.

Hab. in larva tortricis *fascianæ.*

Intercus. 256. I. (le mineur) minutus niger, abdomine ovato, depresso, basi testaceo.

Hab. in Europa.

Desc. Simillimus priori, sed *abdominis* basi *tibiisque* rufis.

Gregarius. 257. I. (le social) niger, pedibus abdominisque lateribus ferrugineis.

Hab. in larvis papilionum gregarius. Exeuntes proprios singuli folliculos adgregatos nent, intra quos excluduntur animalia declarata; sed folliculus albus, non flavus. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* nigræ, articulis plurimis minutis. *Caput* nigrum, lingua flava. *Pedes* ferruginei. *Abdomen* nigrum, brevi petiolo thoraci adnexum, lateribus tamen & subtus basi flavum. *Alæ* incumbentes hyalinæ. *Anticæ* macula marginali nigra. Ab ichneumone *glomerato* Linn. diversus. *Enum.*

Ex Inf. paris. Entom. que paris.

Alveari- 258. I. (la ruche) serico alveariformi.
formis. *Enum. n. 767.*

Hab. in folliculis albis in modum alvearis dispositis.

Desc. Niger. *Antennæ* corpore breviores. *Abdomen* petiolatum. *Pedes* fusco-ferrugineo. V.

Albipes. 259. I. (du cirse) niger, pedibus albidis, alarum puncto nigro.

Hab. in Gallia cirsii floribus.

Desc. Niger. *Antennæ* corpus æquant. *Alæ* magnæ, diaphanæ, puncto marginali. *Pedes* albidii. *Aculeus* abdominis longitudine. V.

Niger. 260. I. (le noir) totus niger.

Hab. in Europa.

Desc. Variat *abdomen* apice flavum.

Rubicun- 261. I. (le rouge) niger punctatus, capite thoraceque rubro maculatis, pedibus fuscis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra sunt, antennæ, abdomen. Caput, thoraxque rubro variegata. *Aculeus* brevissimus. V.

Albus. 262. I. (le blanc) linearis albus fusco maculatus, abdominis petiolo tenui longo.

Hab. in quercus foliis, rarus.

Desc. Totus albus, excepto thorace fusco maculato. V.

Acicula- 263. I. (l'aiguillette) linearis fuscus, capite abdominisque apice nigris, antennis corpore longioribus.

Hab. in Europa.

Ochroce- 264. I. (l'ochrocéphale) niger, abdomine phalos, capiteque flavis, alis nigricantibus.

Hab. in Europa.

Desc. Antennæ fulvæ. Oculi nigri. Caput flavicans. Abdomen testaceum. Cætera nigra.

Ex nost. Mus.

Longicor-265. I. (le longicorne) niger , antennis
nis. fetaceis, corpore longioribus, alis
amplis coloratis. t. 8. f. 8.

Hab. in Europa. In larvarum puppis.

*Desc. Longitudine antennarum; alarum
colore magnitudineque ab omnibus aliis
facile distinguitur. Mas totus niger.*

*Obs. Mutillam acarorum & formicariam
ad ichneumones optime retulit celeb.
Fab. Linn. ipse, ut patet ex descrip-
tionibus, non libenter inter mutillas
reliquit. Omnes igitur ichneumonis
quorum aculeus exsertus est, licet
fœmina aptera, exemp. DD. de Geer
Fab. que inter ichneumones ordinavi
aliosque cujus aculeus reconditus punc-
toriusque inter mutillas numeravi. V.*

Ex oper. D. de Geer.

Fuscicor- 266. I. (le fuscicorne) niger apterus ,
nis. abdomine ovali, antennis pedibusque
fuscis. Retz. 283. - t. 2. p. 903. n. 17.
t. 31. f. 18.

Fab. 126. apterus niger, pedibus rufis.

*Hab. in Europa. In aphidibus. In Gallia
Aust. V.*

*Desc. Magnitudo minimæ formicæ. Niger.
Antennæ pedesque fusca. Caput thorace
latius. Abdomen ovatum, petiolatum.
Olet.*

Ruficornis. 267. I. (le ruficorne) niger apterus ,
O iv

abdomine ovali, antennis pedibusque ferrugineis. *Retz.* n. 289. — tom. 2. p. 906.

Fab. 127. cursitans. Apteris niger, abdomine antice pedibusque ferrugineis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Niger. *Antennæ* pedesque rufa. Caput, thorax, abdomenque nigra. *Abdomen* petiolatum. *Aculeus* longus exsertus.

Vesicula- 268. I. (le vésiculeux) saltator apterus, ris. nigro-æneus, antennis fractis clavatis pedibusque flavis nigrisque. *Retz.*

n. 291. — tom. 2. p. 209. t. 31. f. 22.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* longæ fere clavatæ. Caput rotundatum crassum. *Oculi* magni nigri. *Abdomen* ovatum. *Aculeus* exsertus flavescens, apice nigro. *Thorax* postice appendiculatus, appendicibus vesicularibus, mobilibus. Saltat.

Ex Enum.

Melanoce- 269. I. (le mélanocéphale) rufus, capite phalus. abdominisque cingulo, nigris.

Hab. in Europa.

Desc. Caput atrum. Medio abdomine fascia fusca. *Antennæ* fuscae. Cætera rufa.

Ex Inf. paris. Entom. que paris.

Aranea- 270. I. (le hardi) mas niger, pedibus ab- rum. dominisque annulo duplici ferrugineis.

Fæmina aptera fulva, capite, anten- narum apice abdominisque fascia du- plici transversa, nigris.

Hab. in Europa, inter nidos aranerarum.

Desc. Mas niger. *Antennæ* corporis lon-

gitudinem æquant. *Alæ* magnæ, puncto marginali nigro. *Abdomen* fasciis duabus flavis. *Pedes* fulvi.

Fœmina crassior. *Antennæ* fuscæ, apice nigræ, corpore minores. *Caput* nigrum. *Thorax*, *pedes*, *abdomenque*, fulva. *Abdomen* fasciis duabus transversis nigris.

Carpini. 271. I. (de la charnille) niger, pedibus rufis, geniculis fuscis.

Hab. in Europa. In carpino capta.

Desc. Niger. *Antennæ* fuscæ, corporis longitudine. *Pedes* fulvi, fusco variegati. *Fœmina* aptera. *Aculeus* abdominis longitudine.

Apterus. 272. I. (l'aptere) niger, pedibus antenarumque basi ferrugineis. t. 8. f. 9.

Hab. in Europa.

Desc. Niger. *Antennæ* quæ corpus æquant, nigræ, basi fulvæ. *Abdomen* petiolatum. *Pedes* fulvi. *Aculeus* brevissimus. *Fœmina*.

Pedestris. 273. I. (le piéton) apterus niger, abdomine rufo, basi apiceque nigro. *Fab.*

Hab. in Sueciæ hortis.

Desc. *Corpus* nigrum. *Abdominis* segmento secundo & tertio rufis. *Pedes* rufi.

Mutilla- 274. I. (le mutillaire) apterus rufus, capite, thoracis abdominisque postico nigro. *Mantiff.*

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Major in hoc ordine. *Caput* nigrum, nitidum. *Antennæ* flavescentes, apice nigræ. *Thorax* antice rufus, postice niger. *Abdomen* rufum, postice nigrum. *Aculeus* exsertus, brevis. *Pedes* rufi.

Ex nost. Mus.

Bicolor. 275. I. (le tranché) capite , abdomine ;
petiolo excepto , nigris , cæteris rufis.
t. 8. f. 10.

Hab. in Europa , sub ponte vulgo de la
Guillotiere captus.

Desc. Nigra sunt , caput , abdomen &
aculeus ; thorax , petiolus , pedesque
rufa.

A D D E N D A.

Ex tom. 7. D. de Gcer.

Cantator. 276. I. (le crieur) niger , abdomine fal-
cato medio rufo , alis abbreviatis ,
tibiis anticis rufis , posticis nigris ,
oculis æneis. t. 7. p. 594. t. 44.
f. 9.-12.

Hab. in arvis.

Desc. Caput , antennæ , thorax , pedes
duo posteriores , nitido-nigra ; ante-
riores intermediique luteo-rufi. *Femora*
nigro maculata. *Oculi* æneo-virides.
Alæ diaphanæ , nervis nigris. *Abdomen*
incrassatum , lateraliter depresso. *Peti-*
olus niger , apice rufus. *Abdominis*
incisuræ tres ultimæ nigræ , primæ
ferruginæ. *Fæminæ* mari similes.

Rufus. 277. I. (le roux) totus rufus , corpore
fusiformi , antennis longissimis fuscis.

Hab. in larvis.

Desc. Rufus. *Corpus* fusiforme. *Oculi*
nigri. *Antennæ* maris fusæ , fæminæ
rufescentes , in utroque sexu corpus
æquant. *Aculeus* niger , abdominis
longitudine.

GENUS V.

SPHEX. Os maxillis absque lingua.

Antennæ articulis 10.

Alæ plano-incumbentes (nec plicatæ), in omni sexu.

Aculeus punctorius reconditus.

* *Abdomine* petiolato, petiolo elongato.

Sabulosa. 1. S. (le fossoyeur) nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato, segmento secundo tertioque ferrugineis. *

Scop. carn. n. 770.

Frisch. inf. 2. t. 1. f. 6, 7.

Sulz. inf. t. 19. f. 120.

Fab. 1.

De Geer tom. 2. p. 822. *t. 28. f.* 16.
nigra, antennis filiformibus, petiolo nigro, abdomine antice rufo, alis brevibus.

Schæff. icon. t. 83. *f.* 1.

Geoff. tom. 2. p. 349. *ichn.* 63.

Enum. n. 768.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 864.

Faun. Fridr. n. 627.

Habitat in terra sabulosa Europæ, ubi canis instar, pedibus anterioribus cuniculum fodit larvamque phalanx vel araneam semimortuam in eo sepelit, cui ovulum conredit; quo facto, officium terra claudit.

Sphegis Larvæ consumunt occisa insecta, ad quæ mater ora sepelitis.
Sphegis antennæ communiter articulis 10, ichneumonis vero pluribus.

Alæ abdomine dimidio breviores. Rostrum retractile, bivalve linguam continens. Abdominis articuli 2 & 3 lutei in fœmina, sed simul a tergo nigri in mare. Desc. Major. Corpus totum nigrum. Thorax subpubescens. Abdominis primum segmentum s. petiolus filiformis, niger; secundum & tertium segmentum in aliis ferrugineum, in aliis ferrugineum dorso nigro. Faun. 1648.

Obs. Ad dignoscendam nota D. Geoff. optima. Petiolus enim admodum elongatus est. Variat pedibus omnibus nigris & quatuor anticis fulvis. V.

*Clavipes. 2. S. (l'enflé) nigra, abdominis petiolo ferrugineo, uniarticulato clavato, pedibus clavatis. **

Fab. Mantiss. 2. atra, femoribus posticis incrassatis rufis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva. Corpus nigrum, glabrum. Antennarum infimus articulus luteus. Maxillæ luteæ. Femora & tibiæ posticæ, clavata. Abdomen ferrugineum, excepto petiolo, qui clavatus & nigricans. Syst. Faun. 1649.

Spirifex. 3. S. (l'Égyptien) atra, thorace hirto, petiolo uniarticulato flavo, longitudine abdominis.

Reaum. inf. 6. t. 28. f. 5.

Fab. 15.

Schæff. icon t. 38. f. 1.

Sulz. inf. t. 7. f. 2.

Hab. in Ægypto. D. Hasselquist. In Europa Australi, in cylindris spiralibus terreis sub tectis. In Gallia Aust. V.

Obs. In mus. Ulr. descr. p. 406. inque syst. n. 10; solo enim petiolo nigro differt. V.

Longitudo crabronis, petiolus filiformis, flavus. Pedes 1, 2, 3, 4 flavi, basæ femorum nigri. Pedes 5, 6 flavi, sed apicibus femorum & tiliarum nigris. Antennæ filiformes 10 articulis, longitudine thoracis.

Figulus. 4. S. (le potier) atra, abdomine subpetiolato, marginibus segmentorum lucidis. *

Fab. 10.

Hab. Upsaliæ, in parietum ligneorum foraminibus, ab aliorum insectorum larvis factis relictisque, quæ primo purgat circumroditque, deinde fundum argillæ obducit, cui araneam imponit, eique ovulum concredit, quo facto, nidum argilla claudit. Larva apoda, pallida larvisque apum similis, consumpta aranea membranam luteo-fuscam & teneræ puppæ aptissimam net. Una mater per plurimos nidos construit & plerumque non ultra biduum in quovis adornando consumit. T. Bergmann.

Alæ abdomine breviores. Abdomen petiolatum, atrum, marginibus segmentorum lucidis, si quis eos a capite oblique intueatur.

Appendigaf- 5. S. (l'appendigastrique) atra, abdomine petiolato brevissimo, pedibus posticis longissimis.

Reaum. inf. 6. t. 31. f. 13.

Brown. Jam. t. 44. f. 6.

Fab. evania 1. atra, abdomine petiolato brevissimo, dorso thoracis imposito.

De Geer tom. 3. p. 594. t. 30. f. 14, 15. ichn. niger, abdomine brevissimo, compresso, truncato, petiolo longo

thoracis dorso imposito , pedibus posticis longissimis.

Hab. in Hispania. *D. Z. Hallman.* In Jamaica. In Europa Australi , Capite B. S. in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.* In Gallia Aust. prope Nemausum semel lecta. V.

Corpus atrum , certo respectu albicans , punctis cavis adpersum. Thorax postice retusus. Abdomen ovatum , compressum , glaberrimum , minimum . petiolo dorso thoracis annexum. Antennæ filiformes , articulis 10. Pedes subfiliformes , nigri. Alæ hyalinæ , deflexæ , breves.

Obs. Inter ichneumones ordinavit *D. de Geer*, nam , inquit celeb. Entomologus , antennæ 13 articulis. Certe articuli antennarum ultra decem , sed in nostro specimine , duodecim , basi etiam computata. Præterea nullo modo ichneumonibus unienda , in nostra , quæ fœmina est , aculeus omnino reconditus. V.

*Fissipes. 6. S. (le déginguendé) atra , abdomine petiolato brevissimo , tibiis posticis clavatis denticulatis rufis. **

Fab. 21. nigra , abdominis petiolo femoribusque posticis incrassatis flavis , chalcif. 1. Mantiss. tom. 1. p. 272.

Geoff. tom. 2. p. 380. vespa 16.

Faun. Fridr. n. 629.

Sulz. hist. inf. t. 27. f. 1. sphex nigrifex.

Hab. in Europa. Frequens in Bressia. V.

Desc. Magnitudo fœminæ. *Corpus atrum.*

Tibiæ posticæ magnitudine fere abdominis . ferruginæ , subtus plurimis denticulatis. Abdomen ovatum , brevissimum , ut in sph. præcedenti , petiolo uniarticulato.

Obs. 1. Forte proprii generis animalculum. *Antennæ* ab hoc genere differunt. *Fab.*

Obs. 2. Hoc insectum singulare optime descripsit *D. Geoff.* *Tibiæ* posteriores arcuatæ, eo, in sinu femorum recipi possunt.

Femora poslica dente valido in basi armata in uno sexu. V.

Obs. 3. Sub novo genere inclusit *D. Fab.* *Mantiss.* loco citato. V.

Ex entom. Carn.

Hirsuta. 7. *S.* (le velu) nigra, capite thoraceque pubescentibus, abdomine antice fulvo.
Enum. n. 769.

Desc. *Sph. sabulosæ* affinis, sed minor. *Abdominis* petiolus totus niger. *Pedes* nigri. *Alæ* fere abdomen tegunt. V.

Fuliginosa. 8. *S.* (le ténébreux) nigra, alis hyalinis, apice fuscescentibus, spinis tibiæ rufis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* thoracis longitudine. *Caput* anticis pilis subargenteis pubescens. *Abdomen* subfalcatum, teres, nitens, petiolo subclavato.

Furcata. 9. *S.* (le fourchu) thorace postice furcula terminato. Abdomine ovato, nitenti, sursum flexo.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Caput* virens, ut & *thorax.* *Abdomen* nigrum splendens, petiolo capillari ferrugineo, uniarticulato. *Pedes* ferruginei.

Cincta. 10. *S.* (le mandarin) nigra, abdominis

segmentis 1, 2 tibiisque flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Antennæ alis anticis longiores; *Abdominis* petiolus niger, segmentum primum flavum, sed superne macula nigra postice emarginata magna notatum; segmentum secundum totum flavum. *Femora* clavata. *Tibiæ* & *palmæ* flavæ.

Profuga. 11. S. (le vagabond) nigra, abdominis incisuris 1, 2 tibiisque rufis, antennis longitudine corporis.

Hab. in Europæ incultis.

Desc. Antennæ totæ nigræ. *Alæ* hyalinæ, costa fusca, puncto ferrugineo. *Abdominis* petiolus niger, margine postico fulvo; segmentum tertium antice fulvum. *Pedes* antici & medii toti rufi. *Femora* postica eorumque *tibiæ* apice nigræ. *Frons* flava.

Coarctata. 12. S. (le rétreci) nigra, abdomine ad apicem petioli clavati coarctato, cingulis duobus apiceque rufis.

Hab. in Europæ pratis. In Bressia. ibid. V.

Desc. Antennæ basi flavæ, thorace breviores. *Thorax* subrotundus. *Abdominis* petiolus infundibuliformis; segmentum tertium reliquis majus. *Femora* nigra, basi & apice flava. *Tibiæ* flavæ, sed posticæ fulvæ & crassiores.

Anthraci- 13. S. (le negre) nigra, opaca punctulisque confertis prominulis scabra.

Hab. in Europæ hortis.

Desc. Antennæ fusco-ferrugineæ. *Occipitis* tubercula lucida. *Alæ* hyalino-ferrugineæ. *Abdomen*, absque petiolo, lineas tres longum.

Ex

Ex spec. D. Fab.

Femorata. 14. S. (le partagé) cyanea , abdomine atro , femoribus posticis rufis.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aufst. V.

Desc. Media. Caput cyaneum , antennis nigris. Thorax cyaneus , nitidus. Abdomen petiolatum , atrum , nitidum. Alæ subferrugineæ. Pedes nigri , femoribus posticis rufis.

Punctata. 15. S. (le ponctué) flava , nigro punctata , femoribus posticis clavatis dentatis , abdomine conico.

Hab. in Europa.

Desc. Singulare insectum hic colloco ad ulteriorem examinationem. Caput mihi deest. Thorax flavus , punctis maculisque nigris. Abdomen subpetiolatum , conicum , flavum , apice nigrum. Pedes flavi , femoribus posticis globosis , dentatis , puncto apicis baseosque nigris. Alæ albæ immaculatæ.

Arenaria. 16. S. (le solitaire) nigra hirta , abdominis petiolo uniarticulato , segmento secundo tertioque rufis , alis longitudine corporis. *Mantiss. tom. 2. p. 273.*

Hab. Kiliæ. D. Daldorff. In Bressia. V.

Desc. Differt a Sph. fabulosa abdominis petiolo brevioris , uniarticulato , toto nigro alisque longitudine abdominis.

Obs. Hoc opere tardius typis mandato , plurima insecta nost. mus. in Mantiss. D. Fab. descripta fuerunt , inter quæ hæc sphex arenaria.

Lutaria. 17. S. (le dépravé) nigra glabra , abdo-
Insect. Tomus III. P

minis petiolati segmento secundo tertioque rufis, labio argenteo. *Mantiff.* Ibid.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorff.* In Gallia Aust. V.

Desc. Differt manifeste a præcedentibus, triplo minor. *Caput* atrum, labio argenteo nitido. *Thorax* niger, immaculatus. *Abdomen* petiolatum, nigrum, nitidum, segmento 2, 3 rufis, reliquis nigris. *Alæ* hyalinæ. *Pedes* nigri.

Unicolor. 18. S. (l'unicolor) fusca obscura, pubes cinerascens. *Mantiff.* Ibid.

Hab. in Hispania gregatim in umbellatis dormitans. *D. Vahl.*

Desc. *Tota* fusca, obscura, minime nitida, thorace imprimis tomento cinerascens.

Maculata. 19. S. (le maculé) thorace maculato, abdominis primo segmento punctis duobus, secundo margine, albis.

Hab. in Anglia. *Mus. D Banks.*

Desc. *Corpus* parvum, breve. *Antennæ* porrectæ, nigræ. *Caput* nigrum, linea utrinque longitudinali inter oculos alba. *Thorax* elevatus, gibbus, niger, margine antico, scutello punctoque utrinque sub alis, albis. *Abdomen* breve, conicum, nigrum, primo segmento utrinque puncto albo, secundo margine albo. *Lineolæ* duæ brevissimæ albæ supra anum. *Pedes* rufi, femoribus basi nigris, puncto albo; postici elongati, geniculis nigris. *Alæ* hyalinæ.

Clavipes. 20. S. (le clavipede) atra, femoribus posticis incrassatis rufis. Chalcis 2. *Mantiff.* tom. I. p. 272.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Tota atra, nitida. Femora quatuor antica nigra, apice ferruginea. Femora postica valde elongata, clava rufa. Tibiæ nigræ, incurvæ.

Ex Enum.

Austriaca. 21. S. (l'Autrichien) nigra, abdomine petiolato, ad basin fascia punctisque duobus sulphureis, pedibus sulphureo variegatis, posteriorum femoribus incrassatis.

Hab. Viennæ, in parietum ligneorum foraminibus.

Desc. Tota nigra, sed apex petioli sulphureus, reliquum abdomen nitide atrum, in segmento tamen tertio binæ maculæ sulphuræ pictæ. Eiusdem coloris sulphurei sunt tibiæ, qua parte plagas corporis obversas spectant, quatuor anticæ, interiore latere nigræ sunt; tarfi fulvi. Tibiæ posticæ fuscæ: genicula omnia sulphurea. Aculeum non omnino abscondit.

Obs. An ichneumon? An spheg? Incertum est, quum antennarum articuli non fuerunt determinati. V.

Vespifor- 22. S. (le vespiforme) petiolata nigra, abdomine cingulis tribus punctisque duobus minutis, flavis.

Hab. Viennæ. In Gallia V.

Desc. Nigra. Antennæ basi & subtus flavæ. Puncta ante alas anticæ singulas flava. Fasciæ tres abdominales flavæ, quarum una in basi segmenti secundi (nam segmentum primum petiolus constituit); una ex maculis duabus plana inclinata constituentibus,

adeoque extrorsum latioribus in *segmento tertio*; una ex maculis similibus, sed parte interiore connatis in *segmento quarto*. In *segmenti quarti* apice puncta duo, utrinque unum, minutissima, flava. *Segmentum sextum* angustum, forma pyri longitudinaliter bisecti, utrinque ferrugineo ciliatum. *Pedes* fulvi. *Alæ* apice fuscescentes. *Tota* densis punctis excavatis conspersa. *Spheg* est.

Ex nost. Mus.

Gibba. 23. S. (le bossu) nigra, abdomine cingulis quatuor luteis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Majuscula. *Antennæ* nigrae, basi luteae. *Labium* luteum. *Caput* nigrum. *Thorax* niger. *Collare* luteum. Punctum callosum ante alas. Macula lutea. In medio petiolus abdominis niger, gibbus in apice. *Abdomen* nigrum, quatuor fasciis luteis. *Subtus* macula lutea. *Alæ* diaphanæ, costa marginali fusca.

Conica. 24. S. (le conique) nigra, abdomine pyri-forme.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Minor. *Tota* nigra. *Petiolus* abdominis longus. *Abdomen* conicum.

Albifrons. 25. S. (le frontal) nigra, fronte alba, petiolo longo, abdomine conico fasciato.

Hab. in Europa. In montibus Gebennis capta.

Desc. Minor, angustata. *Antennæ* nigrae, subtus flavescences. *Caput* nigrum,

fronte argentato-alba. *Thorax* niger, maculis duabus flavis lateralibus punctisque quatuor flavis, fere coalitis loco scutelli. *Petiolus* elongatus supra niger, subtus aurantius. *Abdominis* segmentum secundum nigrum, punctis duobus aurantiis; segmenta reliqua flavo marginata.

4-Fasciata. 26. S. (le quadrifascié) nigra, antennis nigris, abdomine 4-fasciato.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Minor. Nigra. *Antennæ* nigrae basi luteæ. *Caput thoraxque* nigra, collare maculaque flavis in dorsi medio. *Abdominis* petiolus niger, reliqua segmenta basi lutea; sed secundi flavedo duobus punctis nigris, minimis, prope petiolum notata.

Obs. Spheg *appendigaster* . t. 8. f. II.

** *Abdomine subfessili.*

Viatica. 27. S. (le coureur) nigra pubescens, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo, cingulis nigris.

Scop. carn. 780.

Amæn. acad. 3. p. 330.

Raj. inf. 254. n. 9. & *Jun.* 22. vespa miraculosa.

Frisch. inf. 2. t. I. f. 13.

Geoff. paris. 2. p. 354. n. 34.

Fab. 30.

De Geer tom. 2. p. 830. t. 28. f. 16. nigra, hirsuta, antennis filiformibus, petiolo longiusculo, abdomine antice rufo, postice nigro, alis fuscis.

Faun. Fridr. n. 628.

Enum. n. 774.

Hab. in Europa. Fodit cuniculum, occidit

larvam phalænæ, attrahit, sepelît, imposito ovo obdurat.

Desc. E maximis est, tota atra, uti antennæ, caput, thorax, pedes & alæ. *Abdomen* ovatum, vix petiolatum, ferrugineo - rufum, sive fusco - rufum, exceptis ultimis tribus segmentis nigris. *Antennæ* breves, arcuatæ, articulis 10. *Faun.* 1651.

Obs. In nostris alæ fuscæ. V.

Fusca. 28. S. (le cerclé) atra lævis, abdominis segmentis tribus primis subferrugineis.*

Fab. 29.

De Geer tom. 2. p. 822. t. 28. f. 7, 8. nigra, antennis filiformibus, petiolo brevi, abdomine antice rufo, lineis nigris, postice alis fuscis.

Enum. n. 773.

Hab. in Europa.

Desc. Simillima sph. *viaticæ*, sed thorax lævis. *Abdominis* segmenta tria prima ferruginea marginibus nigris. *Maxillæ* minores quam in sph. *viatica*. *Faun.* 1652.

Obs. In spec. *D. Fab.* citatur *D. Geoff. n. 74.* & pro sph. *viatica* & pro sph. *fusca*. Error typographicus; nam non eadem species. Nostra sph. *fusca* similis sph. a *D. de Geer* descriptæ. Annulus fusco - niger cingit annulos rubros abdominis. V.

Pectinipes. 29. S. (le cilié) nigra glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedibus primariis ciliatis.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. *Corpus* totum nigrum, læve. *Pedes* antici extrorsum tibiis valde ciliatis. *Alæ* fuscescentes absque puncto

marginali. *Abdominis* tria segmenta priora ferruginea. *Faun.* 1654.

Variegata. 30. S. (le varié) nigra tota, alis albo maculatis. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Massiliam lecta.

Desc. Media vel minor, tota atra. *Alæ* superiores fascia angusta nigra in medio & alia lata nigra posterius locata : macula alba rotunda ad apicem. *Abdomen* postice nonnihil pubescens. *Faun.* 755.

Palmipes. 31. S. (le palmé) nigra, thorace basi puncto uno apiceque duobus luteis, pedibus anticis palmatis.

Enum. n. 778.

Hab. in Suecia. *T. Bergman.*

Corpus oblongum, glabrum, atrum, formicæ nigræ magnitudine. Thorax punctis 2 transversis ad basin; 2 ad apicem, altero pone alterum. Pedes flavi, hinc nigri: antici manibus palmatis, dilatatis, apice armatis quasi 3 s. 4 digitis.

Mystacea. 32. S. (le grenadier) nigra, scutello flavo, abdominis segmentis tribus margine flavis, primo interrupto, tibiis ferrugineis. *

Fab. crabro mystaceus.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Lugdunum. V.

Desc. Facies vespæ. *Antennæ* nigræ. *Caput* nigrum, linea supra os transversa, lutea, interrupta. *Thorax* margine antico, puncto ante alas scutelloque luteus. *Abdomen* sessile, atrum, acutum, segmento 1 supra

maculis duabus luteis ; 2 , 3 & fere 4
 margine luteis. *Femora* nigra. *Tibiæ*
 & *plantæ* ferrugineæ. *Alæ* planæ
 adeoque vespa esse nequit. *Faun.*
 1653.

Obs. *Oculi* non lunares formaque ant-
 tennarum sphegem determinant. V.

Ephippia. 33. S. (le fellé) atra, fronte cærulescente,
 abdomine fascia ferruginea duplicata.

Hab. in Suecia. In Bressia. V.

Magnitudo culicis. *Antennæ thorace bre-*
viores. *Frons pilosa, ex albo micans.*
Thorax immaculatus. *Abdomen gla-*
brum, segmento 2, 3 ferrugineis, unde
fascia una lata, sed lineola distincta.
Pedes nigri. Tibiæ anticæ pallidæ.

Cribraria. 34. S. (le criblé) nigra, abdomine fasciis
 flavis, tibiis anticis clypeis concavis
 cribriformibus.

Faun. suec. 1695. vespa nigra, abdomine
 fasciis sex flavis, intermediis tribus
 interruptis.

Roland. ad. Stockh. 1751. p. 56. t. 3.
 f. 1.

Uddm. diff. 94. apis tibiis anticis lamella
 cribriformi.

Raj. inf. 255. vespa ichneumon pedibus
 anterioribus subclypeatis.

Fab. crabro cribrarius, abdomine fasciis
 flavis, intermediis interruptis, tibiis
 anticis clypeis concavis.

Enum. n. 779.

De Geer tom. 2. p. 810. t. 28. f. 1.-5.
 nigra, antennis fractis nigris, pedibus
 flavis, abdominis fasciis flavis 2, pri-
 mis interruptis, lamina cartilaginea
 concava pedum anteriorum in mare.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 870.

Goze Naturf. 2. St. p. 21. t. 2.

Chæff. icon. t. 177. f. 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. non frequens. V.

Desc. Caput atrum. Antennæ atræ, subulatae. Os argenteum. Thorax niger pubescens. Abdomen glabrum, atrum: segmentum 1 immaculatum margine flavo; 2 macula utrinque ovata; 3 utrinque macula lutea; 4 linea flava a tergo interrupta; 5 linea flava contigua; 6 itidem. Abdomen subtus totum atrum est. Tibiæ fulvæ. Femora nigra. Tibiæ anteriores nigræ, instructæ lamina cornea convexa, punctis pellucidis adspersa.

Obs. Tibiarum anticarum intuitu mas statim agnoscitur. Ne quæras foramina in lamina squamosa tiliarum; nam ex observationibus D. de Geer nostrisque hæc lamina minime perforata est. Forfan tamen plures spheges cribrariæ pro una specie sumtæ fuerunt. Nostræ, saltem nulla descriptio cognita convenit.

Desc. Caput parvum triangulare a thorace collo longo separatum, lateribus pilosis. Oculi magni. Os non villis argenteis vestitum, ut mas enumerationis. Thorax niger immaculatus. Abdomen nigrum, fasciis sex flavis uti in Fauna, primis tribus & non tribus intermediis, interruptis. Coxa pilis argenteis spissis exterius ciliata & uti femora, flava, quæ apud D. de Geer nigra. Squama tiliarum inferne concava, superne convexa: lamina nec nigra nec nigro-fusca, tota autem diaphana, tribus lineis castaneis parallelis versus pedem exarata, Pedis quinque partes

ut radii divergentes dispositæ, fuscæ & non sine attentione, ut pedes judicarentur.

Obs fœmina villis argenteis ornatum. *Caput thoraxque* nigra. Linea flava interrupta ad thoracis latera. *Abdomen* nigrum, cingulis quinque flavis, duobus primis interruptis. *Femora* nigra. *Tibiæ pedesque* flavi. *Alæ* in utroque sexu flavicantes. V.

Clypeata. 35. S. (le bouclier) nigra, abdomine punctis flavis, pedibus anticis concavo-clypeatis. t. 8. f. 12.

Schreber. inf. 11. t. 1. f. 8. apis nigra, abdomine fasciis sex flavis, primis 2 interruptis, tibiis anticis lamellis integris.

Fab. crabro clypeatus niger, abdomine punctis flavis, pedibus anticis concavo clypeatis.

Enum. n. 780.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 871.

Hab. Halæ. In Gallia Aust. præcedenti rarior. V.

Statura vespæ minoris. Caput thoraxque nigra. Abdomen nigrum utrinque maculis 3 luteis & demum transversis lineolis 2 luteis. Pedes flavi; antici, ut in *cribrriu*, clypeati lamella concava.

D. Schrank desc. optima. Facies vespæ, atra. Abdomen ovatum, fasciis sex flavis, seu potius sulphureis, quarum primæ tres interruptæ. Pedes sulphurei, sed femora linea atra longitudinali notantur. Hæc linea non constans est. Pedes antici compressi tibiarumque apex pelta concava inferius, supra convexa instruitur. Hæc pelta margine fulvi coloris est, uti & tarfi, quam

tamen fulvedinem lineola margini parallela flava bifariam dividit. *Enum.*
Obs. Lamina in hac specie, a lamina præcedentis diversa. V.

Colon. 36. S. (le Colon) nigra, pedibus antennisque rufis, thorace viridi, alis maculis duabus nigris. *

Hab. in Suecia.

Desc. Pediculo paullo major. *Caput & thorax* viridi-ænea. *Antennæ* testaceæ. *Pedes* testacei. *Abdomen* subcærulef-cens. *Alæ* superiores maculis duabus fuscis rotundis; anteriore minore. *Faun.* 1656.

Rufipes. 37. S. (le rufipede) atra, abdominis segmentis utrinque macula alba, alis apice fuscis, pedibus posticis rubris. *

Fab. 40.

Scop. 783.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Circa Nemaufum. V.

Desc. Media. *Corpus* totum atrum, glabrum. *Abdominis* segmenta 2, 3 utrinque puncto albo; 6 vero s. ultimum supra unico puncto albo. *Pedes* 4 posteriores, tibiæ omnes & dimidium femorum, sanguinea. *Alæ* omnes extimo nigricantes. *Faun.* 1659.

Obs. Mas pedibus nigris aut fuscis, alis non apice fuscis. V.

Arenaria. 38. S. (des sablonnières) abdominis fasciis quatuor flavis, primo segmento duobus punctis flavis. *

Faun. Fridr. n. 630.

Fab. crabro arenarius. *Mantiss.*

Hab. gregaria in arena, cuniculos fodiens. In Gallia Aust. fabulosis non rara. V.

Desc. Magnitudo fere apīs *mellificæ*.
Corpus nigrum. *Frons* maculis tribus
 luteis; punctum flavum pone oculos.
Thorax punctis duobus remotis in
 antica parte, duobus ad locum scu-
 telli approximatis & uno utrinque
 ad apicem thoracis. *Abdominis* qua-
 tuor segmenta cingulo flavo, juxta
 marginem locato, sed primum seg-
 mentum coarctatum utrinque puncto
 flavo notatum. *Tibiæ* ferrugineæ.
Faun. 1660.

Obs. Variat punctis frontis coalitis,
 inde *frons* flava. *Mas* fœminæ similis;
 in utroque sexu aliquoties genicula
 posteriora nigra. V.

Fossoria. 39. S. (le fossøyeur) thorace immaculato,
 ore argenteo, abdomine maculis utrin-
 que quinque lutescentibus. *

Fab. crabro fossorius.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. rarif-
 sima. V.

Desc. Major. *Corpus* nigrum. *Os* argen-
 teum, maxillis luteis. *Antennarum*
 infimus articulus luteus. *Thorax* sub-
 pubescens, puncto calloso ferrugineo
 ante alas. *Abdomen* ovatum, nigrum,
 segmentis quinque utrinque macula
 laterali ferruginea s. lutescente, in
 aliis albida. *Tibiæ*, imprimis poste-
 riores, flavæ. *Caput* grande est.
Faun. 1662.

Gibba. 40. S. (le bossu) nigra abdomine ferru-
 gineo apice fusco, alis primoribus
 apice nigricantibus. *

Scop. carn. 570.

Fab. 34.

Hab. in Europa.

Desc. Media. *Corpus* nigrum, exceptis segmentis duobus ultimis *abdominis* nigris. *Alarum* extremitates fuscifcentes. *Faun.* 1658.

Obs. In nostris *abdomen* ferrugineum, apice nigricante. *Pedes* posteriores elongati. V.

Collaris. 41. S. (l'esclave) nigra, alis fuscis, fascia media terminalique albis, antennis pedibusque testaceis.

Hab. in Hispania.

Magnitudo minoris *formicæ*. *Collum* flavum.

Semiaurata. 42. S. (le demi-doré) viridis, nitida, abdomine ferrugineo apice nigro. *

Fab. chrysis *semiaurata*, aurea, abdomine ferrugineo apice, cyanea.

Enum. n. 781.

Geoff. inf. tom. 2. p. 384. *vespa* 24.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 873.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Magnitudo* *formicæ*. *Antennæ* nigrae. *Caput*, *thorax*, *femora* viridixænea. *Tibiæ* ferrugineæ. *Abdomen* ferrugineum, ovatum, apice s. segmentis duobus postremis nigrum. *Faun.* 1661.

Obs. Varietas in nost. mus. *Caput*, *basis antennarum*, *thorax* *scutellumque* nitentixærulea. *Femora* viridia. *Tibiæ* flavicantes. V.

Leucofoma. 43. S. (le leucofome) atra glabra, labio argenteo. *

Scop. carn. 785.

Fab. crabro 17. ater glaber, labio argenteo.

Faun. Fridr. n. 631.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor, facie apis, tota nigra.

Femora & tibiæ subclavatæ. Faun. 1663.

Obs. Hæc notæ sph. Leucost. Linn. conveniunt; sed luci expone ut labium argenteum conspiciatur. Tibiæ tarsique ferruginei. V.

Vaga. 44. S. (l'errant) thorace bipunctato, abdominis fasciis 3 flavis, primis interruptis, tibiis flavis. *

Scop. carn. 785.

Fab. crabro 10. niger, abdominis fasciis flavis, primis interruptis, tibiis flavis.

Faun. Fridr. n. 632.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. Variat thorace maculato & immaculato. In specimine D. Fab. immaculatus, in nostris maculatus. V.

Ex spec. D. Fab.

Nigra. 45. S. (le noir) nigra, abdomine fessili, segmentorum marginibus lucidis.

Hab. in Europæ fabuletis. In Gallia Aust. prope Lugdunum. V.

Obs. Variat colore. Modo nigra, modo abdomen in medio fuscescens & in hac pedes posteriores fulvo variegati. V.

Punctum. 46. S. (le point) nigra, ano puncto albo.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. prope Nemausum. V.

Desc. Parva. Præcedenti duplo minor. Corpus totum nigrum. Abdomen terminatur puncto albo, parvo. Alæ hyalinæ, immaculatæ.

Exaltata. 47. S. (l'exalté) nigra , abdomine rufo apice atro , alis apice fuscis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. frequens. V.

Desc. Magnitudo sph. rufipedis. Antennæ convolutæ , nigræ. Caput & thorax nigra , immaculata. Alæ anticæ apice fuscæ , puncto magno orbiculato albo ; posticæ immaculatæ. Pedes nigri.

3-Cincta. 48. S. (les zones) nigra , thorace maculato , abdomine fasciis quinque flavis , secunda interrupta. *Tiphia* 2.

Hab. in Europa , Anglia. Mus. D. Banks.

In Gallia Aust. Prope Massiliam capta. V.

Desc. Antennæ breves , flavescentes , apice fuscæ. Thorax niger , punctis duobus anticis , striga inter alas scutelloque flavis. Abdomen nigrum , fasciis quinque flavis , secunda interrupta. Pedes flavi , femoribus brevibus , angulatis.

6-Maculata. 49. S. (le six-maculé) hirta atra , abdomine maculis trium parium flavis. *Scolia* 6.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. frequens in cæparum floribus. V.

Desc. Corpus atrum , macula flava ante & pone oculos. Abdomen maculis sex flavis , quarum posticæ fere coeunt. Scolia 6.

Flavifrons. 50. S. (l'ictérique) fronte flava , abdomine maculis quatuor flavis. *Scolia* 5. t. 8. f. 13 , 14.

Sulz. inf. t. 27. f. 3. Spheg bide.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Obs. Potius inter vespas numeranda ; nam in nostris oculi lunares. V.

Desc. *Frons* flava, macula media oblonga ;
fusca. *Thorax* ater, scutello punctis
 duobus flavis.

5-Punctata. 51. *S.* (l'étoilé) nigra, abdomine medio
 rufo apice nigro, punctis 5 albis.
Scolia 14.

Hab. in Germania.

Desc. Parva. *Antennæ* petiolatæ, nigræ.
Caput nigrum, puncto parvo albo in
 orbita oculorum. *Thorax* niger, an-
 tice utrinque puncto albo. *Abdominis*
 segmentum primum atrum, 2, 3 rufa,
 reliqua atra punctis quinque albis 2,
 2, 1, quorum duo inter media minu-
 tissima. *Pedes* breves, nigri.

4-Guttata. 52. *S.* (le quadrille) atra, abdomine
 punctis, quatuor albis, alis hyalinis.
Scolia 15.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In
 Galliæ Aust. hortis. V.

Desc. Affinis sph. 4-punctatæ, at paullo
 minor. *Antennæ* petiolatæ, nigræ,
 subtus ferrugineæ. *Caput* nigrum,
fronte alba. *Thorax* niger, immacu-
 latus. *Abdomen* atrum, nitidum,
 punctis utrinque duobus transversalibus
 albis. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Pedes*
 nigri.

4-Punctata. 53. *S.* (l'enfumé) atra, abdomine punctis
 quatuor albis, alis ferrugineo-fuscis.
Scolia 16.

Hab. in Italia. In Galliæ Aust. hortis. V.

Desc. *Corpus* totum nigrum, hirtum.
 Puncta duo alba utrinque in dorso
abdominis. *Alæ* ferrugineæ, apice
 fuscae.

Interrupta.

Interrupta. 54. *S.* (l'interrompu) nigra cinereo hirta, abdomine atro, fasciis sex flavis, anticis tribus interruptis, ano tridentato. *Scolia* 18.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* nigrae. *Caput* cinereo hirtum, labio basi utrinque lineola flava. *Thorax* niger, cinereo pubescens, punctis tribus scutellaribus flavis. *Abdomen* pubescens, atrum, fasciis sex flavis, anticis tribus interruptis, quarto utrinque puncto nigro. *Anus* dentibus tribus validis. *Pedes* nigri, *tibiis* quatuor anticis supra flavis. *Alæ* albidæ, costa *anteriorum* ferruginea.

Maculata. 55. *S.* (le maculé) atra, thorace albo maculato, abdominis segmento primo rufo, reliquis utrinque lineola transversa alba. *Mantiss.* Ibid. *Sphex* 50.

Hab. Kiliæ, *D. Daldorff.* In Gallia Aust. V.

Desc. Parva. *Caput & antennæ*, nigra, immaculata. *Thorax* niger, linea marginis anterioris puncto ante alas scutelloque albis. *Alæ* albæ, apice nigrae. *Abdomen* ovato-conicum, primo segmento rufo, reliquis nigris, utrinque lineola transversa alba. *Pedes* rufi.

4-Punctata. 56. *S.* (le quadriponctué) atra, antennis thoracis striga antica, scutello, punctis quatuor abdominis alisque ferrugineis. *Mantiss.* Ibid. *Sphex* 62.

Hab. in Hispaniæ vinetis. *D. Vahl.*

Desc. *Caput* nigrum, orbita oculorum, labio antennisque ferrugineis. *Thorax* ater, striga vel margine antico puncto ante alas scutelloque ferrugineis. *Ab-*

domen atrum, punctis utrinque duabus ferrugineis. *Alæ* ferrugineæ, apice nigræ. *Pedes* ferruginei, femoribus atris.

Obs. Variat punctis abdominalibus sex.

Plumbea. 57. *S.* (le plombé) antennis atris, alis anticis apice fuscis. *Mantiss.* Ibid. *Sphex* 64.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*

Desc. Minuta. *Antennæ* atræ. *Corpus* plumbeum, abdominis segmentis basi atris. *Alæ* albidæ, anticæ apice fuscæ. *Pedes* nigricantes, femoribus plumbeis.

Crassicornis. 58. *S.* (le crassicorne) nigra, abdomine fasciis tribus pedibusque ferrugineis, alis cyaneis. *Mantiss.* Ibid. *Tiphia* 2.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.* In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* apicè subincrassatæ; nigræ, primo articulo rufo. *Caput & thorax* nigra, puncto villosa ferrugineo ante alas. *Alæ* cyaneæ. *Abdomen* nigrum, segmentis tribus anterioribus fascia lata ferruginea. *Pedes* ferruginei.

Ciliata. 59. *S.* (le cilié) atra, abdominis segmentis margine ciliato flavis. *Mantiss.* Ibid. *Tiphia* 7.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*

Desc. Magna. *Caput* cum antennis atrum. *Thorax* ater, antice utrinque tomento flavo. *Abdomen* atrum, nitidum, margine segmentorum pilis aureis ciliato, e quibus primus haud subtus extenditur. *Pedes* nigri, aureo pilosi.

Morio. 60. S. (le morio) nigra , alis fuscis , femoribus posticis cinereo barbatis.

Mantiss. Ibid. *Tiphia* 15.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.* In Gallia Aust. V.

Hæmorroi- 61. S. (l'hémorroïdal) hirta atra , abdomine fasciis duabus flavis , thorace anoque ferrugineo hirtis.

Mantiss. Ibid. *Scolia* 6.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Caput cum antennis atrum , immaculatum. *Thorax* niger , antice ferrugineo villosus. *Abdomen* nigrum , in medio fasciis duabus flavis. *Anus* late rufo villosus. *Alæ* subtestaceæ , apice fusce. *Pedes* nigri.

Thoracica. 62. S. (le jeune) nigra , capite thoracique antice cinereo-tomentosis , alis apice cyaneis.

Mantiss. Ibid. *Scolia* 10.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*
Desc. Media. Caput nigrum , tomento cinereo tectum. *Antennæ* nigre. *Thorax* antice tomento cinereo tectus. *Abdomen* nigrum , pube argentea nitidulum. *Alæ* albidæ , costa ferruginea , apice cyaneæ , nitidæ. *Pedes* nigri.

Hottorum. 63. S. (le jardinier) atra , abdomine fasciis duabus flavis , alis ferrugineis apice cyaneis.

Mantiss. Ibid. *Scolia* 12.

Hab. in Hispaniæ hortis. *D. Vahl.*

Desc. Media. Caput , thorax , pedes , atra immaculata. *Abdomen* atrum , nitidum , fasciis duabus dorsalibus flavis , anteriore subinterrupta. *Alæ* ferrugineæ , apice cyaneæ , nitidæ.

Obs. Variat rarius fascia tantum unica abdominis.

Collaris. 64. S. (l'esclave) hirta atra , vertice thoracis antico abdominisque fasciis duabus cinereis. *Mantiff.* Ibid. *Scolia* 13.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*

Desc. Media. *Caput* cum antennis atrum , vertice tomento cinereo. *Thorax* ater , lobo antico cinereo. *Scutellum* parum cinerascit. *Abdomen* ovatum , atrum , segmento primo & secundo , margine cinereis. *Alæ* nigræ. *Pedes* nigri.

2-Guttata. 65. S. (le transversal) atra abdomine punctis duobus transversis albis , alis nigris. *Mantiff.* Ibid. *Scolia* 19.

Hab. in Hispaniæ allio-cæpa. *D. Vahl.*
In Gallia Aust. V.

Desc. *Corpus* totum atrum , hirtum , abdomine macularum transversalium albarum pari. *Alæ* & *pedes* nigri. *Antennæ* nigræ.

Prisma. 66. S. (le prisme) atra , abdomine fasciis tribus , antica posticaque interruptis punctoque anali flavis. *Mantiff.* Ibid. *Scolia* 21.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Parva. *Caput* nigrum , immaculatum. *Thorax* niger , puncto utrinque antico flavo. *Abdomen* atrum , nitidum , in medio fasciis tribus flavis , antica posticaque interruptis. *Punctum* anale fuscum. *Subtus* utrinque puncta tria flava. *Pedes* nigri.

Scutata 67. S. (l'écuyer) atra , ore pedibusque flavescens , tibiis anticis membranaceo dilatatis. *Mantiff.* 296. *Craibro* 15.

Hab. Hafniæ. *D. de Sehested.* In Gallia Aust. V.

Desc. Sph. *clypeata* triplo minor. *Antennæ* nigrae, primo articulo flavo, linea dorsali nigra. *Caput* nigrum, ore flavo, pube labii argentea. *Thorax* ater, striga antica, puncto sub alis maculisque duabus loco scutelli flavis. *Abdomen* elongatum, cylindricum, atrum, immaculatum. *Pedes* flavi, femoribus omnibus linea nigra. *Tibiae* anticae, *clypeo* valde dilatato, membranaceo albo.

Ruficornis. 68. S. (le ruficorne) nigra, thorace maculato, abdomine maculis quatuor fasciaeque postica flavis, pedibus antennisque ferrugineis. *Mantiss.* Ibid. *Crabro* fabulosus.

Hab. Hafniae. *D. Sehested.* In Gallia Aust. V.

Desc. Statura sph. *vagæ*. *Antennæ* ferrugineae. *Caput* nigrum, orbita oculorum antica flava. *Thorax* niger, striga antica interrupta, puncto sub alis scutelloque, flavis. *Abdomen* atrum, nitidum, segmento secundo tertioque utrinque puncto, quinto fascia flavis. *Pedes* omnes ferruginei.

Obs. Nomen triviale mutavi, ne cum sph. *Sabulosa* Syst. confundatur. V.

2-Punctata. 69. S. (le bipoctué) nigra, thorace maculato, abdomine fasciis tribus flavis, prima punctis nigris. 18. *Mantiss.* Ibid. *Crabro* 18,

Hab. Hafniae. *D. Sehested.* In Bressia. V.

Desc. Statura & magnitudo præcedentis. *Antennæ* nigrae, articulo primo subtus flavo. *Caput* nigrum, punctis duobus labii orbitaque oculorum, flavis. *Thorax* niger, margine antico, scutello, puncto ante alas &

sub alis, flavis. *Abdomen* atrum, nitidum, fasciis tribus flavis, anteriore punctis duobus minutis atris, tertia remota. *Pedes* flavi, femoribus basi atris.

Rufipes. 70. S. (le rufipede) nigra, thorace maculato, abdomine fasciis sex flavis subinterruptis, alis albis apice fuscis. *Mantiss* Ibid. *Crabro* 21.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.* In Gallia Aust. V.

Desc. Magna. *Caput* nigrum, labio late flavo. *Antennæ* rufæ, ante apicem nigræ. *Thorax* villosus, niger, punctis duobus marginis antici tribusque parvis loco scutelli flavis. *Abdomen* nigrum, fasciis sex flavis, in medio valde attenuatis. *Alæ omnes* albidæ apice fuscæ. *Pedes* ferruginei.

Spinosa. 71. S. (l'épineux) thorace postice bidentato, abdomine fasciis tribus flavis. *Crabro* 2 spec. 2.

Hab. in Europa Australiori. Prope Massiliam capta. V.

Desc. *Caput* & *Antennæ* nigræ, ore argenteo. *Thorax* niger, lineola antica flava, postice utrinque dente valido armatus. *Abdomen* nigrum, fasciis tribus flavis. *Pedes* nigri, tibiis piceis.

Obs. In nostro specimine *pedes* fulvi, *femora* antica nigra, cætera ut in descriptione. V.

Contigua. 72. S. (le contigu) nigra, thorace maculato, abdomine fasciis quinque flavis continuis, ano nigro. *Mantiss.* 297. *Crabro* 5-cinctus.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorff.*

Desc. Media. *Antennæ* nigræ, articulo primo subtus flavo. *Caput* nigrum, sub antennis flavum. *Thorax* subvillosus, niger, punctis duobus anticis, puncto ante alas lineolaque loco scutelli, flavis. *Abdomen* nigrum, primo segmento toto nigro, reliquis quinque ante marginem fascia continua flava. *Pedes* flavi, femoribus fascia nigra.

4-Cincta. 73. *S.* (le Cordelier) nigra, thorace maculato, abdomine fasciis quatuor anoque flavis. *Mantiff.* Ibid. *Crabro* 12.

Hab. Hafniæ. *D. Lund.* In Gallia. V.

Desc. Affinis præcedenti, attamen distincta duploque major. *Antennæ* nigræ, primo articulo toto flavo. *Caput* nigrum, labio orbitaque oculorum argenteis. *Thorax* villosus, niger, striga antica, puncto ante alas punctoque scutelli flavis. *Abdomen* glabrum, atrum, fasciis quatuor continuis anoque toto flavis. *Pedes* flavi, femoribus nigris.

Obs. An omnes hi *D. Fab.* crabrones ad spheges *Syst.* pertinent? V.

Ex entom. Carn.

Apiaria. 74. *S.* (l'abeille) nigra & pilosa tota, antennis thorace brevioribus.

Hab. in floribus. In Gallia Aust. prope Lugdunum frequens. V.

Desc. Porrecto rostro caret alasque rufas lucidasque gerit.

Obs. Primo intuitu adeo api similis, ut spheg minime judicetur; sed, ut observavit *D. Scop.* caret rostro. Variat femoribus aliquoties ferrugineis. V.

Carbonaria. 75. S. (le charbonnier) tota nigra , alia hyalinis.

Hab. in pratis & circa sepes. In Gallia Aust. Prope Lugdunum. V.

Desc. *Pedes* huic nigri. *Corpus* vix pilosum. *Antennæ* thorace longiores.

Obs. Non confundenda hæc sphex cum sph. nigra D. Fab. nam minor , abdomenque aliter conformatum. V.

Bilocularis. 76. S. (le partagé) abdomine subtus in duo loculamenta diviso , septo longitudinali tibiisque luteis.

Hab. in Europa.

Desc. *Alæ* hyalinæ , puncto marginali nigro. *Antennæ* abdomine longiores , nigrae. *Caput* & *thorax* nigra. *Abdomen* supra nigrum , aut fulvum , basi nigrum. *Pedes* flavi , femoribus fulvis.

Abietina. 77. S. (des sapinées) nigra , abdomine fulvo basi nigro , alis anticis fasciis duabus fuscis.

Hab. in nemoribus abietinis.

Desc. *Antennæ* nigrae abdomine non longiores , prope basin superne albæ , ex antica capitis parte prope maxillas prodeunt ; lineola alba utrinque inter frontem & oculum. *Tibiæ* superne maxima parte albæ. *Aculei* regio nigra.

Vespoides. 79. S. (le vespoïde) nigra , abdomine basi segmentisque omnibus (secundo excepto) fascia flava marginali.

Hab. in larvis phalænarum.

Desc. *Antennæ* nigrae , crassiusculæ , apice attenuatæ. *Maxillæ* nigrae , edentatæ. *Frons* lutea , linea media nigra. *Palpi* flavi , articulis (2 - 3) , extremo nigro & crassiore. *Thorax*

lineola flava laterali supra alas, postice punctis duobus flavis. *Abdominis* segmentum primum flavum, secundum nigrum, reliqua nigra, sed cingulo flavo marginali distincta, abdominis superficies punctulato-rugosa, ad apicem pilosa. *Pedes* antici & medii toti flavi, linea nigra subtus ad femora; postici flavi, femoribus semi-nigris. *Alæ* lucidæ, subferrugineæ, ad apicem vinoso-hyalinæ. *Habitus vespa fenestralis.*

Ex Enum.

Albo-maculata. 80. S. (le blanchi) nigra, abdomine subfessili, abdominis basi ferruginea, alis fuscis, apice macula alba.

Beytr. Zur. Nat. p. 91. §. 58.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Tota atra. Antennæ duodecim-nodiæ. Abdomen basi testaceum, primo nempe & secundo segmento. *Alæ* totæ antice fuscae, prope apicem macula rotunda alba.

Tricolor. 81. S. (le tricolor) nigra, abdominis secundo & tertio segmentis testaceis, quarto, quinto & sexto albo punctatis.

Hab. Viennæ.

Desc. Nigra. Antennæ extrorsum incrassantes. *Thorax* basi utrinque puncto albo. *Abdominis* segmentum primum breve, angustius, atrum; secundum & tertium testacea; quartum atrum, utrinque puncto majusculo albo; sextum apice macula alba majuscula.

Boops. 82. S. (le myope) atra, segmentis abdominis tribus, tarsisque testaceis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra. Abdomen ovatum valde; nec sensim acuminatum, rufum; sed primum segmentum basi attenuatum; quartum apice; quintum & sextum integra, nigra. Tarsi pedum coloris testudineo-rubri. Oculi magni, nec tamen exserti, in morte albescent.

Ex nostr. Mus.

Emarginata- 83. S. (l'échancré) nigra, thorace luteo maculato, abdomine cingulis sex flavis, tribus primis in medio emarginatis, pedibus fulvis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Statura, facies magnitudoque sphegis clypeata. Antennæ basi luteæ infra, in medio rufæ, apice fuscæ. Thorax niger, collare flavo, macula flava in medio. Abdomen nigrum, annulis sex flavis, fere petiolatum, subtus nigrum, pedes fulvi.

Arguro- 84. (le front d'argent) nigra, fronte argentea, abdomine antice fulvo, pedibus nigris.

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Magna. Antennæ nigrae, convolutæ. Caput nigrum, fronte argentea. Abdomen antice fulvum, postice nigrum, incisuris ultimis tomentosis, tomento certo situ albo-sericeo. Pedes nigri. Mas foeminae similis.

Elongata. 85. S. (l'alongé) nigra, abdomine valde elongato lateraliter albo maculato, pedibus fuscis, tibiis variegatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. rara.

Desc. Magna, sed ratione magnitudinis

valde coarctata. *Caput thoraxque* nigra. *Maxillæ* flavæ. *Abdomen* nigrum, tribus punctis flavis punctulo nigro in medio notatis, lateraliter ornatum. Segmenta omnia, excepto primo, macula flava triangulari in margine postica incisurarum. *Femora tibiæque* nigra. *Tarsi* fusci. *Alæ* adeo breves, ut corporis dimidium vix æquant.

4-Cincta. 86. S. (le quadriannulé) nigra, fronte tribus punctis flavis, abdomine cingulis quatuor flavis.

Fab. crabro 12. *Mantiss. tom. 2. p. 295. an?*

Hab. in Europa. Prope Nemausum capta, Hafniæ D. Lund.

Desc. Affinis sph. *arenariæ*, sed aliter picta. *Frontis* puncta flava in triangulum disposita. *Thorax* niger, punctis duobus minimis flavis ad insertionem capitis, in medio litura flava. *Abdomen* nigrum ubique punctulatum, quatuor semiannulis flavis, quorum primum ultimumque reliquis latiora. *Subtus* maculæ quatuor flavæ in quadrum dispositæ. *Alæ* fuscescentes.

Semi-cincta. 87. S. (le semi-annulé) nigra, abdomine supra fasciis duabus flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Magna, nigra. *Abdominis* segmentum secundum flavum, flavedine in parte postica emarginata, inde linea nigra separantur fasciæ flavæ hujus segmenti a flavedine sequentis. *Subtus* totum nigrum. *Alæ* fuscæ. Similis scolix 2 cinctæ D. *Fab.* sed abdomen læve.

Triangulum. 88. S. (le triangle) nigra, punctis flavis

in triangulum dispositis a scutello utrinque ad alarum ortum, abdomine annulis sex flavis.

Hab. in Europa.

Desc. Statura sph. *cribraria*. Caput nigrum, labio flavo. *Antennæ* lateraliter flavescentes. *Thorax* niger, triangulo flavis punctis formato. *fasciæ abdominales* in medio emarginatæ, inde strictiores quam in parte laterali. In medio fasciæ 4 abdomen cingunt. *Pedes* lutei, *femoribus* nigris.

Lugubris. 89. S. (le lugubre) nigra, alis fuscis, fronte argentea.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Magna. *Tota* fusca. *Frons* lucido-argentea. *Alæ* fuscae, apice fusciores. *Pedes* nigri.

Curva. 90. S. (le courbé) nigra, abdomine apice curvo, fasciis duabus flavis.

Schæff. icon. t. 147 ?

Hab. in Europa. In cepæ floribus frequens.

Desc. Simillima sph. 2 *cinclæ* D. Fab. sed in omnibus nostris speciminibus *abdomen* apice curvum, tomentosum. *Alæ* obscurissimæ.

Lucida. 91. S. (le vernissé) nigra, maxillis labiisque flavis, abdomine subtus lucido, cingulis quatuor flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Caput, thoraxque nigra. *Labium* flavum. *Frons* argentea. *Alæ* diaphanæ. *Abdomen* supra cingulis quatuor flavis, subtus lucido-castaneum. *Pedes* fulvi.

Monstrosa. 92. S. (le monstrueux) nigra, femoribus crassissimis, tibiis curvis. t. 8. f. 15.

Fab. chalcis clavipes. Mantiss. tom. 2. p. 272.

Geoff. inf. tom. 2. p. 329. ichn. 18.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Similis sph. fissipedi, sed abdomen non petiolatum. Totum nigrum. Femora postica valde incrassata, nigra, puncto albo versus insertionem tibiæ. Tibiæ arcuatæ. Tarsi fulvi. Singulare insectum. Thorax abdomine longior. Abdomen non petiolatum; ergo spheg. fissipedis species diversa.

Navicula- 93. *S. (le batelier) rufa, abdomine naviculæformi.*

Hab. in Europa. Prope Massiliam capta.

Desc. Parva. Tota rufa. Alæ corpore longiores. Abdomen breve, crassum, apice naviculæformi.

Fasciata. 94. *S. (le fascié) nigra, alis fasciis fuscis.*

Hab. in Europa. In Bressiæ sylvis.

Desc. Nigra. Antennæ tarsi que rufescentes. Alæ fasciatæ.

Tubercula- 95. *S. (le tuberculé) nigra, fronte tuberculata, capite thoraceque flavo variegatis, abdomine octo maculis flavis.*

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Magna, nigra. Frons quatuor maculis flavis triangularibus insignita: e medio exit tuberculum flavum obtusum. Inter antennæ tuberculum alterum minus. Antennæ lutescentes, apice fusæ. Lateraliter capitis flava, postice lineis duabus longitudinalibus flavis frontis maculis posterioribus junctis. Thorax niger, maculis duabus flavis prope caput. Lineæ

duæ flavæ transversales inter alas. *Alæ* flavescentes. *Abdominis* primum segmentum coarctatum, lateraliter duobus punctis lutescentibus notatum. In quatuor sequentibus segmentis annuli lutei in medio fere interrupti, inde octo maculæ luteæ adparent. *Subtus* rufescens. *Pedes* lutei. *Alæ* planæ. *Maxillæ* sine lingua. *Oculi* integri; ergo sphex.

Flavicornis. 96. S. (le flavicorne) antennis pedibusque luteis, thorace macula flavâ nigro punctata, abdomine octo fasciis flavis in medio interruptis.


Hab. in Europa. In Gallia Aust. Prope Nemausum capta.

Desc. Magna. *Antennæ* luteæ. *Caput* thoraxque tomentoso vellere testæ. *Thorax*, macula flavâ fusco vel nigro in medio notata. *Abdomen* nigrum, maculis octo flavis, omnibus in medio interruptis. *Alæ* flavescentes, abdomine longiores.

Lineata. 97. S. (le rayé) antennis rubellis, thorace rubro nigro lineato, abdomine ferrugineo, fasciis luteis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Inter majores est hæc sphex, quæ nec inter ichneumones, nec inter vespas ordinari potest; nam nec oculi lunares, nec antennarum articuli tresdecim ultra.



GENUS VI.

CHRYSIS. Os maxillis absque proboscide.

Antennæ filiformes: articulo I longiore, reliquis XI brevibus.

Abdomen subtus fornicatum, utrinque squama laterali.

Anus dentatus aculeo subexserto.

Alæ planæ.

Corpus auratum.

Ignita. I. C. (l'enflammé) glabra nitida, thorace viridi, abdomine aureo, apice quadridentato. *

Frisch. inf. 9. t. 10. f. 1.

Sulz. inf. t. 19. f. 121.

Geoff. parif. 2. p. 382. n. 20.

Scop. carn. 791.

Fab. 8.

Schæff. elem. t. 40.

— *icon.* t. 74. f. 7, 8.

De Geer tom. 2. p. 832. t. 28. f. 17, 18.

t. 29. f. 1, 2. nitida viridis, thorace posticè cæruleo, abdomine coccineo-aurato, apice quadridentato.

Faun. Fridr. n. 633.

Poda gr. p. 108.

Enum. n. 782.

Hab. in muris Europæ.

Desc. Ape domestica major. Pulcherrima *minor* fane in genere suo est. *Caput* & *elytra* *succ.* cyanea, nitidissima. *Abdomen* ignei coloris nitens auro; pungit & vulnerat

Chrysides nitida, aurata, glabra, nidificans in parietibus, fadis foraminibus.

uti apis. *Alæ* fuscæ. *Abdominis* ultimum segmentum, (excepto ani segmento) dentatum est, uti & *thorax*, aliquatenus postice. *Antennæ* nigræ, articulis 12. *Faun.* 1665.

Bidentata. 2. C. (l'armé) glabra nitens cyanea, thorace bidentato abdominisque segmentis duobus primis aureis.

Fab. 9.

De Geer tom. 2. p. 837. t. 29. f. 3, 4. nitida, cæruleo-viridis, abdomine macula magna nigra, nitida, alarum apicibus nigris.

Hab. in Suecia. In Gallia Aust. V.

Parva, tota viridi-cærulea. Thorax supra aureus, postice cæruleus cum mucrone utrinque. Abdominis segmentum 1 supra aureum basi cærulea; 2 supra totum aureum.

Obs. Nostra specimina nitenti-viridia. Reliqua similia. *Anus* dentibus tribus brevissimis armatus, uti in specimine *D. Fab.*

Succincta. 3. C. (le noble) glabra nitens viridis, thorace fascia coccinea, abdomine aureo subtridentato.

Fab. 10.

Hab. in Prædio meo Hammarby. *Adam Kuhn.* Americanus. In Gallia semel capta. V.

Corpus parvum, viridi-sericeum. Abdomen ignito-auratum. Thorax dorso fascia coccineo-aurea, uti etiam ipsa basis thoracis parum coccinea. Nigra sunt antennæ, oculi, palmæ.

Aurata. 4. C. (le doré) glabra nitens, thorace viridi, abdomine aureo, ano bidentato.

Fab. 13.

Geoff.

Geoff. tom. 2. p. 383. vespa 21.

Schæff. icon. t. 42. f. 5, 6.

Scop. 824.

Frisch. inf. dent. part. 9. p. 20.

Enum. n. 185.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 876.

Hab. in muris Europæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Antennæ nigræ. Thorax viridicæruleus, nitens. Abdomen auratum, fulgidissimum. Alæ fuscescentes. Faun. 1666.

Cyanea. 5. C. (le bleu) glabra nitens, thorace abdomineque cæruleo, apice tridentato. *

Scop. carn. 697.

Fab. 14.

Schæff. icon. t. 81. f. 5.

Geoff. tom. 2. p. 384. guêpe dorée bleue.

Hab. in muris Europæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis chr. ignita, sed paullo minor unicolor. Tota cærulea nitens. Faun. 1667.

Obs. In nostris anus quadridentatus est. V.

Viridula. 6. C. (le vert) glabra nitens viridis, thorace abdominisque segmentis duobus primoribus tergo aureis, ano quadridentato. *

Hab. in Europæ parietibus. In Gallia Aust. V.

Geoff. tom. 2. p. 384. n. 23. an?

Desc. Similis chr. ignita, sed tota viridis, præter primum & secundum abdominis segmentum rubro-aureum & thoracis dorsum aureum. Faun. 1668.

Fulgida. 7. C. (l'éclatant) glabra nitens, thorace abdominisque primo segmento cæruleis, reliquis aureis, ano quadridentato. *

Fab. 7.

Enum. n. 783.

Insect. Tomus III.

R.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 382. vespa 20.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis chr. *ignitæ*, sed abdomine aureo, exceptis primo & secundo segmento cæruleo, reliquis aureis fulgidissimis. *Faun. 1669.*

Ex spec. D. Fab.

Carnea. 8. C. (le délicat) glabra nitida, thorace abdominisque primo viridibus, reliquis carneis, ano ferrato.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. rarior. V.

Desc. Magnitudo chr. *ignitæ*. *Caput* viride, labio villosa, argenteo, splendente. *Antennæ* nigrae. *Thorax* scaber, viridis, postice utrinque acuminatus: punctum callosum, carneum ante alas. *Scutellum* prominens, obtusum. *Abdomen* carneum, nitidum, segmento primo viridi. *Anus* denticulis plurimis minoribus ferratis.

Obs. In nostris *pedes* fulvi. *Caput thoraxque* infra ut supra viridia. *V.*

Lucidula. 9. C. (le brillant) glabra viridis nitens, thorace antice abdomineque aureis, ano integro.

Scop. 792.

Enum. n. 784.

Geoff. tom. 2. p. 382. vespa 19.

Hab. in Europa Australiori. In Gallia prope Nemausum frequens. V.

Desc. Parva. *Caput* viride, antennis oculisque nigris. *Thorax* scaber, viridis, antice rufus, postice utrinque acuminatus. *Abdomen* aureum, ano integro. *Alæ* fusca, puncto marginali nigro.

Obs. Omnium forte pulcherrima. Nostra inter mediocres. V.

Fervida. 10. C. (l'impatient) glabra aurea nitida ; abdomine subtus atrò.

Hab. in Italia. *Dr.* Allioni.

Desc. Parva magnitudine chr. *auratæ*.

Caput, thorax, abdomen , aurea glabra nitida , sub alis cyanea. *Abdomen* subtus atrum. *Pedes* atri. In Hispania paullo major , capite pedibusque virescen-
tibus. An varietas ?

Purpurata. 11. C. (le pourpré) glabra aurea nitida ; abdomine fascia media anoque ferrato purpureis. *Mantiff.* tom. 1. p. 283.

Hab. Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

Desc. Media in hoc genere. *Caput* scabrum aureum , antennis fuscis. *Thorax* scaber , aureus nitidus , lineolis tribus in medio obscure purpurascentibus. *Abdomen* aureum , fascia media purpurea. *Anus* ferratus , itidem purpureus , in medio cum fascia confluens. *Pedes* aurei.

Integra. 12. C. (l'entier) glabra viridis nitida ; abdomine aureo basi apiceque viridi , ano integro. *Mantiff.* Ibid.

Hab. in Hispania. *D.* Vahl.

Desc. Statura & summa affinitas chr. *ignitæ*. *Caput & thorax* viridia nitida , immaculata. *Abdomen* aureum , primo segmento parum viridi. *Anus* integer , viridis. *Abdomen* subtus viride.

Ex nost. Mus.

Punctatissi- 13. C. (le pointillé) aurato - viridis , ano
ma. cæruleo. t. 8. f. 16.

R ij

Hab. in Europa. In montibus Gebennis capta.

Desc. Omnium major crassiorque aurato-viridis. *Corpus* dense punctatum. *Anus* violaceus quadridentatus. *Alæ* fuscescentes. *Femora* viridia. *Tibiæ* fuscæ. *Affinis.* chr. *splendidæ* D. *Fab.*

GENUS VII.

LEUCOSPIS. *Os* palpis æqualibus brevibus. *Labium* maxillis longius.

Antennæ extrorsum crassiores. *Fab.*

Aculeus supra abdomen reflexus. V.

Obs. Hoc insectum primus in Europa forsan descripsit D. de la Tourrette *Linnaë*que misit; licet inter cynipes ab immortalis Entomologo sub nomine cynipis *gigantæ* ordinata fuerit, licet in cynipe inanita aculeus recurvatus sit, genus proprium vere constituit, uti optime cogitavit clar. *Fabricius*. V.

Dorsigera. I. L. (le - crocheteur) abdomine sessili nigro, fasciis duabus punctoque flavis. t. 8. f. 17.

Hab. in Europa. Frequens in cæpæ floribus Galliæ Aust. V.

Desc. *Caput* atrum. *Antennæ* longitudine thoracis, rectæ, extrorsum paullo crassiores, articulis cylindricis, approximatis, brevibus, primo subtus flavo. *Thorax* clavatus, valde gibbus, ater, antice linea duplici transversali,

lateribus connata, flava. Punctum utrinque sub alis & *scutellum*, flava. *Abdomen* sessile, compressum, dorso canaliculatum, nigrum, fasciis duabus, puncto inter fascias anoque flavis. *Aculeus* duplex niger sub abdomine insertus, reflexus, longitudine abdominis, in cujus canalem dorsalem reconditur. *Pedes* flavi, nigro maculati; postici femoribus incrassatis, dentatis, macula magna nigra. *Tibiæ* flavæ. *Fab.*

Gallica. 2. (le François.) nigra, thorace punctis duobus flavis. t. 8. f. 18.

Cynips nigra, maculis luteis notata, femoribus posticis globosis, margine interiori dentatis, aculeo triplici super abdomen recurvato. *D. de la Tournette, acad. des sciences* tom. 9. *Savans étrangers* p. 730.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. hortis. V.

Desc. Præcedenti multo major, sed adeo similis, ut, demta magnitudine, facillime confunderentur. *Thorax* antice simili modo pictus, punctis duobus flavis. *Alæ* in duobus fuscescunt. *Femora* æqualiter crassa depressa, minime globosa, in parte inferiori validius denticulata quam in *dorsifera*, dentibusque numerosioribus instructa. *Aculeus* insuper paullo brevior, *scutellum* enim non tangit ut in præcedenti. V.

Obs. *Leucospis dorsifera* variat *thorace* sæpe absque punctis duobus flavis, macula *scutellari* non cordiformi alisque minime fuscis: cætera similia. An vera varietas, an species? V.

GENUS VIII.

VESPA. Os maxillis absque proboscide.

Alæ superiores plicatæ, in omni sexu.

Aculeus punctorius reconditus.

Oculi lunares. *De Geer*.

Corpus glabrum. *Geoff*.

7 Cabro. I. V. (le frélon) thorace nigro antice
rufo immaculato, abdominis incisuris
puncto nigro duplici contiguo. *

Scop. carn. 824.

Mouff. inf. 50.

Raj. inf. 250.

Aldr. inf. 225.

Frisch. inf. 9. t. II. f. I.

Swam. bibl. t. 26. f. 9.

Reaum. inf. 6. t. 18. f. I.

— 4. t. 10. f. 9.

Fab. 8.

De Geer tom. 2. p. 801. t. 27. f. 9, 10.
nigra luteaque, nucha, thoracis an-
tica parte primoque antennarum arti-
culo rufis.

Geoff. inf. tom. 2. p. 368. n. I.

Enum. n. 786.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 880.

Faun. Fridr. n. 634.

Hab. in Europæ arboribus cavis, sub earum
radicibus; accipiter apum.

Desc. Labium superius luteum. Caput
rufum. Thorax niger, antice rufus.
Pedes grisei. Abdominis incisuræ ex-
trorsum luteæ, introrsum nigrae, punc-
tis duobus in segmento 3, 4, 5, sed

basi connatis cum nigredine incisuratum. *Faun.* 1670.

Obs. Habitat in cavis arboribus gregaria. Visitat raptu; molliora insecta, ipsos adeo gryllos *campestres* rapit & super arbores, tanquam vultur devorat. Horrea quoque petit, in iisque nidum suspendit, egregiam hospiti mercedem referens, dum tineam *granellam*, curculionesque devastat; ipsumque nidum in usus veterinarios adhibent coloni. *Enum.*

Obs. Omnes vespæ muscarum hostes & in carnariis utilissimæ, imprimis sequens species. V.

Vulgaris. 2. V. (la vulgaire) thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *

Scop. carn. 825.

Mouff. inf. 52.

Raj. inf. 250.

Aldr. inf. 198.

Reaum. inf. 6. t. 17. f. 7, 8.

Frisch. inf. 9. t. 12. f. 2.

Swam. bibl. t. 26. f. 8.

Fab. 9.

Geoff. inf. tom. 2. p. 369. n. 2.

Schæff. elem. t. 130.

—— *icon.* t. 35. f. 4.

Enum. n. 787.

Faun. Fridr. n. 635.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 880.

Hab. in Europa sub tectis frequens; prædatur muscas, furatur mel apum.

Desc. *Antennæ* nigricantes. *Frons* luteo-varia. *Thorax* ater, linea utrinque ante alas flava, interrupta; postice puncta 4 flava transversa. Segmenta

abdominis nigra, omnia marginis flava, in singulo duo puncta nigra connexa cum nigredine in prioribus incisuris, in posterioribus vero distincta. *Tibiæ* flavæ. *Faun.* 1671.

Obs. 1. Hab. intra terram gregaria; superstructis aditui ignibus non pellenda; per altas sylvas itinerantibus molestissima; sed ab urso una cum nido effoditur, devoratur. Etiam in granariis cum crabrone prædam partitur, ibi nidificans & publicam propterea ibi securitatem a colonis promerita. *Enum.*

Obs. 2. Hæc vespa a *D. Geoff.* optime descripta. Abdomen fœminæ, maris abdomine paullo diversum. Puncta nigra in omnibus, fasciæ nigræ non adnexa. Quatuor varietates in opere parisi. citatæ sunt.

1°. *Vespa* thorace lineolis trium parium differentium flavescientium, punctis nigris incisurarum connexis.

2°. *Vespa* thorace lineolis quatuor parium differentium flavescientium, punctis nigris incisurarum connexis.

3°. *Vespa* thorace lineolis quinque parium differentium flavescientium, punctis nigris incisurarum connexis.

4°. *Vespa* thorace lineolis duorum parium differentium, punctis nigris incisurarum connexis.

Rufa. 3. *V.* (la rousse) thorace utrinque lineola, scutello bipunctato, abdomine flavo antice ferrugineo. *

Reaum. inf. 6. t. 14?

Fab. 11.

Enum. n. 788.

Scop. 826.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 881.

Faun. Fridr. n. 636.

Hab. in Europa Boreali.

Desc. Magnitudo & facies vespæ vulgaris cui simillima. Caput nigrum, fronte flava cum macula hastata. Maxillæ flavæ. Punctum flavum inter antennis. Capitis latera flava utrinque lineola. Thorax niger cum lineola ante singulam alam flava: puncta duo transversa flava loco scutelli. Abdominis segmenta nigra, marginibus flavis, sed primum segmentum omnino ferrugineum margine flavo; secundum segmentum basi in medio nigra. Femora maxima ex parte nigra, sed tibiæ ferruginæ. Antennæ nigræ. *Faun. 1672.*

Parietum. 4. V. (des cloisons) nigra, thorace lineola punctisque duobus, scutello bipunctato, abdomine fasciis quinque, prima remotissima. *

Rœs. vesp. t. 7. f. 8.

Frisch. inf. 9. t. 12. f. 1.

Fab. 32.

Faun. Fridr. n. 637.

Enum. n. 792.

Geoff. tom. 2. p. 376. n. 9.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 881.

Hab. in foraminibus parietum ligneorum.

Desc. Antennæ clavatæ, nigræ, infimo articulo subtus flavo; puncta flava ad basin maxillarum a latere, 2 ad apicem labii superioris, 2 in fronte, 1 inter antennis, 2 in medio tergi thoracis, 1 ad singulam alam. Thoracis basis linea flava. Tibiæ omnes flavæ. Segmenta abdominis omnia quinque margine flava, quorum primum remotius, latius, semifida lineola. Alæ minus explicatæ. *Faun. 1673 & 1679.*

Obs. Varietatem hujus vespæ indicat *D. Geoff.* sed cum abdominis fascia prima lutea cæteris non latior est, aut species aut hæc differentia non constans. Fascies abdominis flavæ. V.

Gallica. 5. V. (la Françoisse) thorace utrinque lineola, dorso sexmaculato, abdominis incisuris flavis, secunda bimaculata.

Fab. 10.

Scop. 827.

Geoff. tom. 2. p. 374. n. 5. nigra, thorace maculis 15 flavis, segmentis abdominalibus margine luteis, secundo macula utrinque flava.

Poda gr. p. 108.

Enum. n. 789.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 881.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Corpus *simillimum vesp. vulgari*, sed paullo minus. Frons pedes, segmentorum abdominis margines, flava. Antennæ flavæ. Thorax margine antico, linea ante alas, puncto ante & sub alis flavo. Regio scutelli maculis luteis 3 parium, ultimo oblongiore. Abdominis segmentum 2 utroque latere macula ovata flava.

Obs. Hab. solitaria ad muros, frutices, arbores parte foli exposita, umbra tamen aliunde tecta. Nidus hemisphæricus, cellulis pluribus, inæquali numero, adfixus petiolo tenaci, adhærenti membranæ communi cellulas postice obtegenti. Mater post nidum latens excubias agit, nec facile pellenda; ubi tamen pulsa est, statim redit, nidumque, forte ablatum interea, anxie inquirat. Insectum hortis inimicum, quod fructus Pomonæ exedat.

Obs. Licet *Linnaeus Fabricius*que *D. Geoff.* non citaverint, licet *D. Geoff. Linn.* non indicaverit, optime nihilominus hanc vespam ad pag. 374. hist. inf. parif. retulit *D. Schrank* in *enum. descriptio Syst. D. Geoff.* Descriptioni convenit; insuper nullum dubium stat ex his verbis: *Cette guêpe vient dans ces gâteaux ou guépiers gris, que l'on trouve dans la campagne, attachés souvent par un pédicule aux tiges des arbrustes. V.*

Muraria. 6. V. (des murailles) nigra, thorace maculis duabus ferrugineis, abdominis fasciis quatuor flavis, prima remotissima. *

Scop. carn. 828.

Frisch. inf. 9. p. 24. t. 12. f. 8, 9.

Fab. 35.

Schæff. icon. t. 24. f. 3.

Poda gr. p. 109.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 881.

Enum. n. 793.

Faun. Fridr. n. 638.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra tota est. *Antennæ* fere clavatae. A tergo ad basin *thoracis* duæ maculae ferrugineae; versus apicem *thoracis* macula nulla. *Abdomen* cingitur quatuor flavis fasciis, quarum prima maxime a reliquis remota est.

Tibiæ etiam flavæ sunt. *Faun.* 1674.

Obs. A vespa *parietina* an solo fasciarum numero diversa?

Spinipes. 7. V. (la porte-épine) nigra, abdomine fasciis quinque flavis, femoribus intermediis denticulatis, labio flavo maculato. *

Fab. 36.

Desc. Minor. *Corpus* nigrum. *Caput* immaculatum, labio flavo bidentato s. emarginato. Punctum flavum inter antennis antico latere flavas. *Thorax* immaculatus, margine anteriore flavo. *Abdomen* fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Tibiæ* flavæ. *Femora* secundi paris dentibus tribus armata.

Obs. Alter caret dentibus femorum, punctoque flavo gaudet ante alas & antennis antice tantum basi flavis. *Faun.* 1682.

Coarctata. 8. V. (l'étranglée) abdominis primo articulo infundibuliformi, secundo campanulato, maximo, bipunctato. *

Scop. carn. 830.

Frisch. inf. 9. t. 9.

Geoff. paris. 2. p. 377. t. 16. f. 2.

Fab. 53.

Enum. n. 790.

Poda gr. p. 109.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 883.

Faun. Fridr. n. 639.

Hab. in Europa. Frequens in ericis prope Lugdunum. V.

Desc. Media. *Tota* atra. *Abdomen* glaberrimum; margines segmentorum abdominis omnes flavi; articulus primus tenuis, parum ventricosus, secundus maximus, ut omnes reliquos intra se retroractos occultare possit; huic articulo utrinque macula flava (apud nos non uti *Frischii*) linearis obliqua. *Thorax* niger, macula flava unica ad basin linearis, interrupta; ad singulam alam unica; ad apicem unica linearis, sed hæc bifida est. *Frischii* descriptio optima est. *Faun.* 1676.

Obs. Hujus vespæ nidi primo intuitu ut cœnum siccatum videtur, sed forma globosa attentionem subito excitat & ut opus alicujus insecti brevi judicantur. E subtili terra conficiuntur. Ovum cum melle in uno quoque deponitur. *Larva* mellem edit & in nido metamorphosin subit; inde maxillis globulum aperit & egreditur vespa. Ramis ericæ ita adhærentes nidi, ut non sine rami sectione eos tollere valeat observator. V.

Arvensis. 9. V. (la campagnarde) abdominis fasciis quatuor flavis, tertia interrupta.*

Fab. 40.

Schæff. icon. t. 93. f. 8.

De Geer tom. 2. p. 820. inter vespas ichneumones.

Geoff. tom. 2. p. 375. n. 7. primo abdomini segmento pyriformi fasciisque tribus flavis.

Faun. Fridr. n. 640.

Enum. n. 791.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 883.

Hab. in Europa. In muris *Fab.* in terris aridis *D. Geer.* In Gallia Aust. V.

Desc. Vespa vulgari minor. *Antennæ* nigræ. *Corpus* nigrum. Ad marginem *thoracis* anteriorem lineola flava & in medio *thoracis* loco *scutelli* punctum flavum. *Abdomen* tribus fasciis transversis flavis a tergo notatur, quarum secunda ac tertia remotissima; his duabus interjacet ab utroque latere punctum oblongum flavum; primus abdominis articulus angustus & clavatus. *Pedes*, exceptis femoribus rufis, nigri sunt.

Obs. I. Variat thorace nigro immaculato, *Geoff.*

Obs. 2. E genere vesparum extraxit quasdam species *D. de Geer.* scilicet eas quarum oculi non lunares, alæque secundum longitudinem non plicatæ. Hi duo characteres veris vespis essentialia, separationem necessariam indicant ipseque *Linnaeus* hanc notam specificam enunciavit. Quod de cerambycibus olim diximus, huic generi applicandum est. Sed *Linnaeanum* systema typis mandans, nulla mutatio permessa nobis fuit.

Campestris. 10. V. (la champêtre) nigra, thorace lituris quatuor abdominisque fasciis quatuor flavis, prima interrupta. *

Fab. 41. nigra, thorace lineola punctis duobus scutelloque flavis, abdomine fasciis quatuor flavis, prima interrupta.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. *Corpus* nigrum. *Cs* supra linea transversa, flava. *Thorax* antice-linea baseos, flava, transversa. Punctum flavum ante alas; punctum transversum flavum loco scutelli. *Abdominis* primum segmentum maculis duabus transversis, flavis; tria insequentia segmenta margine flava. *Tibiæ* ferrugineæ. *Faun.* 1677.

Bifasciata. 11. V. (la bifasciée) nigra, thorace immaculato, abdomine fasciis duabus flavis.

Fab. 38.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Lugdunum. V.

Desc. Similis vespæ spinipedi. *Antennæ* clavatæ. *Corpus* nigrum, immaculatum, uti etiam thorax. *Abdomen* nigrum, segmentis duobus primis margine flavis, quarum fascia posterior subtus

etiam cingit abdomen. *Tibiæ* basi pallescentes. *Faun.* 1683.

Bidens. 12. V. (l'épineuse) nigra, thorace bispinoso, abdominis segmentis tribus margine luteis.

Fab. 37.

Hab. in Sueciâ.

Paullo major formica rubra.

Scutellum bipunctatum. *Fab.*

Biglumis. 13. V. (l'armée) scutello bispinoso, abdominis segmentis margine albis, secundo punctis duobus albis. *

β. *Vespa rupestris.* *Syst. nat.* 10. p. 573. n. 8.

Fab. 67.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. *Trahit occisas muscas se sæpe triplo majores; ad latera australia lapidum conficit nidum e fistulis aggregatis.* Rolander.

Desc. Statura vespæ vulgaris. Corpus nigrum. *Frons* albida. *Antennæ* subtus flavæ. Punctum flavum pone oculos. *Thorax* punctis aliquot albis; loco scutelli puncta duo alba; ad apicem utrinque laminula alba reflexa, acuminata. *Abdomen* segmentis margine albis, secundo punctis duobus albis. *Pedes* ferruginei. *Faun.* 1680.

Uniglumis. 14. V. (la redoutable) scutello mucronato, abdominis segmentis tribus punctis duobus albis sublateralibus. *

Fab. crabro 16. scutello mucronato, abdominis segmentis tribus, punctis duobus albis.

Vespæ vivunt in societate gynæcocratica, favos struunt, insecta gymnoptera devassant.

Hab. in Europa.

Desc. Caput & thorax nigra immaculata. Abdomen nigrum, cujus incisuræ quatuor primariæ a tergo notantur parimacularum albidissimarum, quarum par thoraci proximum maculam habet utrinque ovatam; reliqua paria constant maculis linearibus. Femora nigra, sed tibiæ ferruginæ. Antennæ non capite longiores, nigrae, deorsum inflexæ & apicibus obsoletæ. Scutellum mucrone prominet acuto. *Faun.* 1681.

Minuta. 15. V. (la petite) atra, geniculis pedum luteis, femoribus posticis ovatis subtus muricatis.

Fab. Chalcis minuta, atra femoribus posticis incrassatis, apice flavis. *Mantiss.* tom. 1. p. 272.

Hab. in Europa Australi. Hafniæ *D. Vahl.*

Corpus totum atrum, vix pediculo duplo majus, adeoque minimum. Abdomen ovatum. Genua & plantæ flavæ. Squamula ante alas flava. Antennæ cylindrica, nigra, deflexæ.

Obs. Femora postica incrassata, ferrata, atra, apice flava. Tibiæ incurvæ, flavæ, apice nigrae. *Fab.*

Parietina. 16. V. (la menuisiere) abdominis fasciis quinque flavis, prima remotiore.

Faun. Fridr. n. 641.

Hab. in parietibus. *Ibid.* In Bressia. V.

Desc. Media. Corpus nigrum. Puncta quatuor flava ad os & unum inter antennis quæ basi subtus flavæ. Thorax linea flava baseos & puncto luteo supra singulam alam geminoque loco scutelli. Abdomen fasciis 5 s. 6 flavis, quarum prima remotior. *Faun.* 1679.

Obs.

Obs. An vespa parietum diversa ? V.

Ex oper. D. de Geer.

Crabro 17. V. (le moyen frélon) nigra lutea-
medius. que, antennis subtus rufis. *Retz.* 230.-
de Geer. tom. 2. p. 790. t. 27. f. 1.-8.

Hab. in Europa. In Gallia. *Aust.* V.

Desc. In hac specie, uti in aliquibus speciebus, reperiuntur in eodem nido, mares, fœminæ, neutrique operarii. A *vespis* distinguuntur crabrones, inquit *D. de Geer*, colore antennarum. In *vespis* nigrae sunt infra & supra : in crabronibus subtus rufæ.

Fœminæ caput antice luteum, postice nigrum, inter oculos brunneum. *Oculi* brunnei. *Thorax* niger, macula laterali rufa luteo marginata. *Abdominis* incisuræ sex nigrae, fasciis transversis luteis margine postico. Primum segmentum, secundum postice striga arcuata lutea, in secundo latiore, tertii segmenti fascia dissecta ; tertium & quartum nigro flavoque dimidiata ; ultimum segmentum fere totum luteum. *Pedes* rufi, *femoribus* nigro maculatis.

Operariæ caput, tribus maculis luteis supra antennarum insertionem. *Clypeum* luteum, nigro longitudinaliter lineatur. *Thorax* niger, utrinque linea angulari lutea quatuorque lineolis postice. *Abdominis* segmenta nigra, margine postico flavo. Segmentorum 2, 3, 4, 5 nigredo angulata ; ultimum nigro luteoque dimidiatum. *Femora* nigra apice lutea.

Marium antennæ longiores. *Abdomen* majus elongatum, incisuris septem.

Caput ut in operariis. *Thorax* niger,

antice lineola flava. Inter crabrones vespasque hoc descrimen assignaverat *Linnaeus*, scil. quod puncta nigra in crabrone nigredini adhærebant, in vespa autem separata in parteque lutea collocata. Hæc nota variabilis.

Obs. Nidus e papyro compositus, major vespæ crabronis nido. Color griseus luteo rubelloque variegatus. Quoad hujus papyri originem *Reaumurii* opus consule. V.

Ex entom. Carn.

Sylvestris. 18. V. (la sauvage) thorace antice utrinque lineola flava, abdomenis segmentis margine flavo repando cingulo distinctis.

Hab. in sylvis, inter ramos arborum, ubi favum unum alteri inædificat, nudum aut cortice tenui vestitum, cujus cellæ cum larvæ perfectæ fuerint, operculo albo teguntur.

Desc. Differt a vesp. *vulgari*, fronte flava absque puncto medio nigro, linea nigra media ab apice ad medium usque producta; thorace antice lineola laterali, non vero maculis trigonis, abdomine punctis nigris nullis. Neque pro altero sexu prioris habeo, vulgaris enim in hujus nido a me visa nondum.

Maculata. 19. V. (la tachetée) abdomine punctorum flavorum paribus tribus, primo remotissimo.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput totum nigrum. *Thorax* antice lineola terminatus punctoque flavo laterali supra alas posito. *Abdomen* acumine deflexo, antice non

truncatum , sed convergens , subtus immaculatum nitens. *Caput & thorax* punctis prominulis scabra. *Abdomen* punctis impressis. *Pedes* nigri.

Ex spec. D. Fab.

Norwegi- 20. V. (la Norwegienne) thorace utrin-
ca. que lineola , scutello immaculato , ab-
dominis segmentis margine flavis , se-
cundo utrinque macula rufa.

Hab. in Norwegia. D. Lund.

Desc. Corpus nigrum , ore flavo. *Thorax* pubescens niger , lineola utrinque flava. *Scutellum* omnino immaculatum. *Abdomen* atrum , segmentorum marginibus flavis. Macula magna rufa in secundo segmento.

Oculata. 21. V. (l'oculée) ferruginea , abdominis
segmento secundo nigro , macula utrin-
que ocellari lutea.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia
Aust. V.

Desc. Caput cum *antennis* obscure ferru-
gineum. *Thorax* ferrugineus , macula
magna dorsali nigra. *Abdomen* ovatum ,
segmento primo ferrugineo , secundo
nigro utrinque macula magna ocellari
lutea , reliqua brevissima , ferruginea.
Alæ ferrugineæ apice nigræ. *Pedes*
ferruginei.

Tridens. 22. V. (le trident) nigra , abdomine fas-
ciis quinque flavis , ano tridentato.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. Parva. Antennæ nigræ. *Caput* ni-
grum , labio flavo. *Thorax* niger ,
puncto sub alis flavo. *Abdomen* nigrum ,
segmentorum marginibus flavis. *Anus*

tridentatus. *Pedes* flavi, *femoribus* nigris.

Sexfascia- 23. V. (la sixfasciée) nigra abdomine atro
ta. nitido, fasciis sex flavis.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia
Aust. V.

Desc. Parva. *Antennæ* supra nigræ, subtus
flavæ. *Caput* nigrum, labio punctoque
inter antennis flavis. *Thorax* niger,
striga marginis anterioris flava. *Ab-*
domen atrum, nitidum, segmentis
margine flavis, fascias sex consti-
tuentibus. *Pedes* flavi, *femoribus*
nigris.

Bipunctata. 24. V. (la biponctué) thorace maculato,
abdomine fasciis quatuor punctisque
duobus primi segmenti flavis.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In Gallia
Aust. V.

Desc. Media. *Antennæ* nigræ, primo
articulo subtus flavo. *Caput* nigrum,
maxillis, striga orbitaque oculorum
flavis. *Thorax* niger, striga antica,
puncto sub alis scutelloque flavis.
Abdomen atrum, nitidum, primo seg-
mento utrinque puncto, reliquis fascia
flavis. *Pedes* flavi, *femoribus* basi
nigris.

Triangu- 25. V. (la dorsale) nigra, abdomine flavo,
lum. segmento dorsali nigro.

Hab. Hafniæ.

Desc. Statura crabronis. *Caput* nigrum,
ore flavo. *Thorax* immaculatus. *Pedes*
ruffi.

Pomiformis 26. V. (la pomiforme) nigra flavo va-
riegata, abdominis petiolo bipunctato,

secundo segmento fascia interrupta omnibusque margine flavis.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura & magnitudo vespæ coarctatæ. *Antennæ* nigræ, primo articulo subtus flavo. *Caput* nigrum, labio flavo, puncto medio nigro. *Thorax* niger, fascia antica, puncto magno sub alis maculis quinque scutellaribus flavis. *Abdominis* primum segmentum elongatum, infundibuliforme, punctis duobus margineque flavis, secundum campaniforme, maximum, nigrum, fascia media interrupta margineque flavis, reliqua brevissima margine flavo. *Pedes* flavi.

Tridentata. 27. V. (l'armée) abdomine fasciis duabus flavis, ano tridentato, alis nigris margine albis. *Crabro* I.

Hab. in Europa. Aust. In Gallia Aust. V.

Desc. *Caput* nigrum, ore pube argentea, splendente. *Thorax* niger, immaculatus. *Abdomen* nigrum, fasciis duabus latis, flavis. *Anus* dentibus tribus incurvis, acutis. *Pedes* nigri. *Alæ* fuscæ, margine postico albo.

Subterra- 28. V. (la gnome) thorace maculato, nea. abdomine utrinque maculis quinque flavis, pedibus ferrugineis. *Crabro* 4.

Hab. Hafniæ.

Desc. *Caput* nigrum, labio argenteo primoque antennarum articulo subtus flavo. *Thorax* niger, puncto parvo sub alis & duobus loco scutelli. *Abdomen* atrum, glabrum, nitidum, maculis utrinque oblongis luteis, quarum ultimæ connatæ. *Pedes* omnes ferruginei.

6-Cincta. 29. V. (la cordée) thorace maculato , abdomine fasciis sex flavis , primis interruptis. *Crabro* 7.

Hab. in Germania. *D. de Hattorff.* In Gallia prope Lugdunum. V.

Desc. Affinis *Spheg. cribrariae*. *Caput* nigrum , labio argenteo , nitido. *Antennæ* nigrae , primo articulo subtus flavo. *Thorax* niger , fascia interrupta apicis , puncto sub alis & alio calloso ante alas , flavis. *Abdomen* atrum , nitidum , fasciis sex flavis , primis tribus interruptis. *Pedes* flavi , *femoribus* nigris.

Obs. *Oculi* lunares nec non alæ plicatae ; ergo vespa. V.

Dimidiata. 30. V. (la bédéaude) lævis atra , thorace maculato , abdomine antice fascia , punctis duobus anoque flavis. *Crabro* 12.

Hab. in Germania. In Bressia. V.

Desc. Parva. *Caput* atrum , labio argenteo primoque antennarum articulo subtus flavo. *Thorax* niger , lineola antica , punctis duobus lineolaque scutelli flavis. *Abdomen* antice atrum , fascia punctisque duobus flavis , postice flavum , strigis obscurioribus. *Pedes* flavi , *femoribus* nigris.

Obs. Sub genere crabronis aliquæ *Spheges* & *vespæ* syst. occurrant ; inde plerique crabrones. *D. Fab.* incerti , nisi ante oculos sint. V.

Ruficornis. 31. V. (la ruficorne) labio subconico , thorace fusco flavo maculato , abdomine nigro , fasciis sex flavis , antennis pedibusque ferrugineis. *Bembex* 9. *Mantiss.* Ibid.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*

Desc. Caput fuscum, ore flavo antennisque ferrugineis. *Thorax* fuscus, striga antica, puncto ante alas maculaque scutelli flavis. *Abdomen* atrum, nitidum, fasciis sex flavis latis, primis quatuor interruptis. *Pedes* ferruginei.

Trifasciata. 32. V. (la trifasciée) atra, thorace maculato, abdomine fasciis tribus flavis. V. *Mantiff.* Ibid.

Hab. Hafniæ. D. *Pflug.* Prope Lugdunum. V.

Desc. Caput nigrum, puncto inter antennas flavo. *Thorax* niger, lobo antico, puncto sub alis duobusque loco scutelli flavis. *Alæ* fuscae. *Abdomen* atrum, nitidum, fasciis tribus flavis, posticis duobus approximatis.

Ex Enum.

Tricincta. 33. V. (la bizarre) nigra, thorace immaculato, abdomine fasciis tribus flavis, primis duabus interruptis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra. *Antennæ* supra nigrae, subtus rubrae, basi subtus flavæ. *Os* flavum. *Thorax* basi lineola transversa flava; ad exortum alarum utrinque in latere pectoris punctum flavum. *Abdominis* primum segmentum in petiolum attenuatur, secundum punctis duobus flavis pingitur; in tertio fascia transversa flava interrupta in medio conspicitur; quartum utrinque in latere puncto minutissimo flavo notatur; quintum immaculatum est; sextum basin flavam habet. *Subtus* omnia immaculata. *Femorum* apices cum tibiis flavi.

Ex Faun. Fridr.

- Ligata. 34. V. (l'enchaînée) nigra , ore , femoribus abdominisque tertio & sexto segmentis flavis , medio angulo nigro.
Hab. in Europæ parietibus ligneis.

Ex nost. Mus.

- Tricuspi- 35. V. (la trompeuse) nigra , hirta ,
 data, abdominis duabus fasciis luteis , ano tridentato. *t. 8. f. 19.*
Hab. in Italia. In Gallia Aust. V.
Desc. Magna nigra , hirsuta. *Oculi* lunares , luna pilosa. *Alæ* flavescentes. *Abdomen* fasciis duabus luteis , prima in medio emarginata , secunda medio divisa. *Anus* tricuspidatus , sed spinis pilis obtectus vixque visibilis. *Pedes* pilosi.
- 2-Pustula- 36. V. (la bipustulée) nigra pilosa , abdo-
 ta, minis secundo segmento duobus punctis flavis , fascia lutea in tertio , ano valide tricuspidato.
Hab. in Europa. In cæpæ floribus frequens prope Lugdunum.
Desc. Præcedentis longitudinem fere æquat , sed latitudo multo minor. *Caput* parvum , nigrum. *Thorax* niger , immaculatus. *Alæ* basi fuscescentes. *Abdomen* punctis duobus luteis in secundo segmento ; macula lutea in tertio , *supra* pilosum , *subtus* læve. *Anus* tribus cuspidis validis armatus , intermedio longiore. Hæc nec vespa tridentata nec crabro tridentatus *D. Fab.*

- Bicincta. 37. V. (la cordeliere) nigra , antennis

incrassatis , abdomine fasciis duabus flavis.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. hortis.

Desc. Vespa non est 2-fasciata *Syst.*

nam *labium* nigrum. Nigra , pilosa.

Abdomen fasciis duabus luteis , quæ incisuras non omnino tegunt ; inde annulus niger inter fascias. *Subtus* tota nigra. *Alæ* fuscescentes. *Anus* inermis.

Abbreviata. 38. V. (la courte) nigra , antennis fulvis , clavatis rufis , thorace maculato , abdomine fasciis quinque luteis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori capta.

Desc. Singulare insectum , crassitie longitudini non appropriata. *Antennæ* , ut in tenth. *femorata*. *Caput* nigrum , clypeo rufo. *Thorax* niger. Macula magna lineari trianguliformi ab insertione unius alæ caput usque producta & a capite ad insertionem alterius alæ rediens. Macula flava utrinque in parte antica. *Caput* , *thorax* , *abdomen*que immediate juncta. *Scutellum* luteum. *Abdomen* fasciis quinque luteis. *Pedes* rufi. Nidus cylindraceus ramis mortuis tota longitudine annexus , exterius rufus.

6-Pustulata. 39. V. (la sixpustulée) nigra , pilosa , abdomine sex fasciis luteis interruptis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Magna , nigra hirsutissima. *Alæ* breves , violacæo nitentes. *Abdomen* sex fasciis luteis , in medio interruptis. *Oculi* lunares , luna pilosa. Non vespa est 6-fasciata ; nam nec *labium* flavum nec *punctum* inter antennis flavum ;

non scolia 6-maculata, maculis posticis non fere coeuntibus.

Unguiculata. 40. V. (l'ongliculée) nigra, antennis unguiculatis, thorace maculato, abdomine conico luteo fasciato.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. floribus cæpæ frequens.

Desc. Inter maximas numerunda est. *Antennæ* supra nigræ, parte tenui curvata terminatæ, subtus rufæ. *Caput* nigrum, clypeo rufo, inter antennis macula rufa. *Thorax* gibbosus, humeris luteis, postice in regione scutelli duabus maculis rufis. *Petiolus* longus infundibuliformis, niger, vel rufus in medio niger. *Abdominis* primum segmentum magnum, maculis duabus rufis obliquis in parte antica, in parte posteriori fascia magna lutea: reliqua segmenta luteo fasciata, magnitudine semper decrefcentia, pyri formam constituunt; inde abdomen conicum, basis pediculo in petiolo recepto. Variat colore fasciarum thoracis. Variant *antennæ* modo subtus rufæ, modo totæ nigræ, tunc non unguiculatæ.

Histrio. 41. V. (l'arlequine) nigra, thorace abdomineque punctis & maculis luteis flavisve variegatis. t. 8. f. 20.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. *Caput* nigrum, clypeo fulvo, macula nigra in medio. *Antennæ* nigræ. *Thorax* niger, antice scapulis fulvis. Punctum callosum fulvum ante alas. In regione scutelli maculæ quatuor fulvæ. Duæ primæ horizontales, duæ laterales & inferiores. *Abdominis* *petiolus* niger, quatuor punctis fulvis fere in

parallelogrammum dispositis; margo flavus. *Magnum* segmentum abdominis nigrum, duabus maculis fulvis, quæ maculæ cum fulvedine basis segmenti lateraliter unitæ sunt, ita ut nigredo divisa sit in duas partes inter se connexas spatio nigro; cætera segmenta fere flava. *Fœmina*.

Maris thoracis macula horizontalis anterior in duas divisa est. In petiolo duo puncta flava vel fulva. Cætera similia. In utroque sexu *alæ* fusco-flavescentes.

5-Cincta. 42. V. (la Chinoise) nigra, antennis nigris, abdomine fasciis quinque luteis. *Fab. crabr. II. Mantiss. tom. I. p. 295.*
Hab. in Europa. In Gallia Aust. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Media. Caput nigrum. *Thorax* niger, linea flava emarginata in parte antica. *Abdomen* nigrum, fasciis quinque flavis. *Pedes* flavi, *femoribus* nigris.

Nigricornis. 43. V. (la nigricorne) nigra, antennis longis, thorace maculato, abdomine punctis fasciisque luteis. *t. 8. f. 21.*

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Nigra, pilis hirta. Antennæ longæ, nigræ. *Thorax* niger, quatuor maculis flavis; una superior, duæ intermediæ, una inferior pilis longis postice hirtus. *Abdominis* tria prima segmenta, punctis flavis duobus in singulo; reliqua margine flava. *Alæ* diaphanæ, margine exteriori fuscescentes. *Anus* tridentatus. *Pedes* nigri, pilis griseis vestiti.

Ciliata. 44. V. (la ciliée) antennis nigris, capite flavo variegato, abdominis segmentis

albido ciliatis, maculis fasciisque flavis.
t. 8. f. 22.

Hab. in Europa. Circa Massiliam.

Desc. Inter majores numeranda. *Antennæ* nigræ. *Oculi* lunares, ut in omnibus præcedentibus. *Caput* nigrum seu nigro-fuscum, maculis quadrangularibus flavis sub antennis. *Thorax* niger, antice utrinque macula flava. *Abdominis* primo segmento flavo lateraliter notato, secundo fascia flava interrupta, reliquis fere flavis margine inferiori ciliatis, *subtus* maculis abdomen tegentibus, prima non interrupta. Margines magis ciliati ciliisque longioribus.

Hirsutissi- 45. V. (la velue) nigra, hirsutissima, ma. abdomine sex fasciis luteis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Maxima. *Antennæ* nigræ. *Caput* nigrum. *Oculi* lunares, supra & infra flavedine cincti. *Thorax* niger. *Abdomen* nigrum, fasciis sex flavis, fasciis tribus in medio interruptis. *Pedes* nigri, hirsutissimi. Affinis præcedenti, sed distincta species.

Chrysopte- 46. V. (la chrysoptere) nigra, alis dimidio auratis, abdomine maculis sex albis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Tota nigra. *Alæ* violaceæ dimidio auratæ. *Abdomen* sex fasciis albidis, duabus primis extrorsum emarginatis. *Anus* inermis.

Chrysoptera- 47. V. (la chrysoptere armée) nigra, armata. alis dimidio auratis, abdomine fasciis quatuor luteolis, ano tridentato.

Hab. in Europa. In Gallia Callidiori.

Desc. Præcedenti maxime affinis & forte varietas sexus. Differt punctis duobus albidis in parte antica thoracis, fasciis abdominis quatuor anoque tridentato.

Lunulata. 48. V. (les lunules) nigra, abdomine fasciis sex luteis, ultimis lunatis, ano tridentato.

Hab. in Europa. Circa Nemaufum.

Desc. Nigra, præcedentibus longior & angustior, minus villosa. *Abdomen* sex fasciis luteis, duabus ultimis minimis lunatis. *Anus* tridentatus.

GENUS IX.

APIS. Os maxillis atque proboscide inflexa, vaginis duabus bivalvibus.

Alæ planæ in omni sexu.

Aculeus fœminis & neutris punctorius reconditus.

Longicornis. 1. A. (la longicorne) antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti fulvique. *

Scop. carn. 794.

Swamm. bibl. t. 26. f. 6.

Scop. ann. hist. nat. p. 8. 1.

Fab. 80.

Faun. Fridr. n. 643.

Raj. inf. 243. 1.

Geoff. inf. tom. 2. p. 413. n. 10.

Hab. in Europa.

Apes vivunt in societate gynæcocratica, sapos struunt cereos & mel e nectare florum hauriunt.

Desc. Facies apis mellificæ. Corpus nigrum, hirsutie rariore fulvescente; abdominis majus obscura. *Frons* pallida. *Antennæ* atræ, filiformes, longitudine corporis. *Faun.* 1684.

Obs. Variat colore & magnitudine. In omnibus *antennæ* longæ, nigerrimæ. *Frons* lutea, sed *thorax* vellere rufo aut cinereo tectus. In aliis *abdomen* lucidum, a basi ad medium pubescens; in aliis *totum* pubescens. V.

Tumulorum. 2. A. (des tombeaux) antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pedibus maxillisque flavescentibus. *

It. Gotl. 336.

Fab. 79.

Sulz. hist. inf. t. 27. f. 14.

Hab. in Wifingsœ tumulis sepulchralibus. In Europæ floribus. *Fab. Ibid.* In Gallia Auf. V.

Desc. Magnitudine dimidiæ muscæ domesticæ; toto corpore nigra, exceptis pedibus & maxillis pallide luteis. *Antennæ* filiformes, corporis fere longitudine, subtus pallidiores. *Faun.* 1685.

Obs. Nostrarum *antennæ* supra & infra nigræ. V.

Clavicornis. 3. A. (la clavicorne) antennis clavatis longitudine corporis nigri, abdominis fasciis duabus flavis interruptis. *

Hab. in Europa.

Desc. Minor. *Antennæ* clavatæ longitudine corporis, nigræ, latere anteriore, excepto apice, fuscæ. *Corpus* nigrum. *Frons* macula rotunda, alba. *Thorax* immaculatus. *Abdomen* angustatum, fasciis duabus flavis, interruptis. *Faun.* 1566.

Centuncularis. 4. A. (la mennifiere) nigra , ventre lana fulva. *

Scop. carn. n. 799.

Raj. inf. 242. apis sylvestris , corpore longo angusto.

Reaum. inf. 6. t. 10. f. 3 , 4.

Frisch. inf. 11. t. 2 ?

Geoff. parif. 2. p. 410. n. 5.

Fab. 59.

Faun. Fridr. n. 644.

Enum. n. 815.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 891.

Hab. in Europa , intra terram plures nidos cylindricos ex foliis rosæ formans , tanquam centunculos. Amæn. acad. 3. p. 320.

Desc. Ape mellifica minor. Caput nigrum.

Frons cinerea. Thorax niger , hirsutia

subcinerea. Abdomen ovatum , nigrum ,

acutum , incisurarum marginibus albis ,

subtus lana rufa s. ferruginea , valde

pilosum. Pedes nigri. Faun. 1687.

Variat magnitudine ; sed omnes sub abdomine bysso fulva vestitæ. V.

Cineraria. 5. A. (la cendrée) nigra , thorace hirsuto albicante , fascia nigra , abdomine cærulescente. *

Fab. 42.

Schæff. icon. t. 22. f. 5 , 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Corpus nigrum. Thorax hirsutus , albido cinereus ; fascia nigra inter alas. Abdomen atro-cærulescens , supra glabrum. Frons pilosa , cinereo-albida. Faun. 1688.

Carbonaria. 6. A. (la charbonniere) atra , alis cærulescenti-fuscis.

Hab. in Africa. In Gallia Australiori. V.

Andrena carbonaria Fab: Syst.

Ent: p. 312. n. 22.

Corpus magnitudine apis mellificæ, lævissime pubescens. Thorax postice retusus. Rostrum sub maxillis breve, conicum, cui pone apicem palpi 2 ferruginei quinque-articulati & in apice palpi 2 triarticulati. *Lin. Syst. 954*

Retufa. 6. A. (l'émouffée) nigra subhirta, abdominis basi retufa, tibiis posticis extus lanatis. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. circa Lugdunum V.

Desc. Magnitudine apis mellificæ. Corpus totum nigrum, pubescens. Tibiæ posticæ dilatatæ, extus vellere brevi, denso, flavo. *Faun. 1689.*
Andrina pilipes Fab. Syst.

Rufa. 8. A. (la rousse) fusca, abdomine rufescente, fronte alba. *

Raj: Ræf. inf. 242. apis sylvestris parva, abdomine brevior.

Fab. 53.

Sulz. hist. inf. t. 27. f. 15.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. Corpus hirtum, supra helvolum. Caput nigrum, frontis hirsutie albida. Thorax subtus pilis albidis. Abdomen subtus fere totum nigrum. Antennæ filiformes, corpore dimidio breviores. *Faun. 1690.*

Bicornis. 9. A. (le diable) fronte bicorni, capite nigro, abdomine hirsuto. * t. 8. f. 23.

Fab. 52.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud frequens. V.

Desc. Thorax, caput, oculi, antennæ, nigra. Abdomen rufum. Pedes rufescentes, ad minimum posteriores. Frons nigra, minime alba; ad basin maxillarum

larum duo *cornicula* incurva, rigida, nec mobilia, prominula, hirsutiae vix longiora, nigra, infra apicem, a parte exteriori, denticulo notata; facies & magnitudo ap^{is} *mellificæ*. *Faun.* 1691.

Obs. 1. Ut cornua facile observentur, ap^{is} sub^{tus} examinanda est. V.

Obs. 2. An prioris fœmina? Copula connexas vidit *P. Forskæhl.*

Maxillofa. 10. A. (la formidable) maxillis prominentibus, antennis thorace brevioribus, abdomine cylindrico, sub^{tus} luteo-hirsuto.

Fab. 75.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Corpus *totum nigrum, supra nudum; simile A. truncorum.* Abdomen *supra segmentis margine albidis; sub^{tus} hirsutum; flavum.* Antennæ *subclavatæ, thorace breviores, vix manifeste articulatæ.* Maxillæ *exsertæ, longitudine capit^{is}.*

Truncorum. 11. A. (des cloisons) nigra glabra, fronte albida pubescente, abdomine segmentis margine albidis, sub^{tus} flavicante. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus formica majus, atrum; glabrum. Frons barba albida. Antennæ filiformes, longitudine thoracis. Abdominis segmenta vix margine alba, sed potius versus latera; sub^{tus} pubescens flavensque. *Faun.* 1692.

Floriformis. 12. A. (la Sybarite) nigra, abdomine subcylindrico incurvo, ano bidentato, tibiis posticis apice spinosis. *

Scop. carn. 796.

Insect. Tomus III.

T

Fab. 76. hirsuta., abdomine cylindrico incurvo, ano bidentato.

Hab. in Europa, pernoctans in floribus.

Ibid. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva, angusta, oblonga, nigra. *Frons* cinereo - pubescens. *Thorax* pallido-subpubescens. *Abdomen* semicylindricum, fere glabrum, septem segmentis, incurvatum plerumque, ano bifido, obtuso. *Faun.* 1704.

Helvola. 13. A. (la rougeâtre) rufa villosa, oblonga, subtus albida. *

Fab. andrena 5. thorace ferrugineo, abdomine cinerascens.

Faun. Fridr. n. 645.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. floribus.

Desc. Caput nigrum. *Thorax* villosus, ferrugineus. *Abdomen* nigricans, minus villosum. *Tibiae* posticae lana ferruginea. *Faun.* 1693.

Fabriciana. 14. A. (la Fabricius) nigra, abdomine glabro ferrugineo, maculis duabus flavis.

Fab. nomada 5. nigra, abdomine glabro ferrugineo, maculis duabus flavis.

Hab. Upsaliae. *Fabricius.* In Bressia. V.

Corpus minus A. helvola; villi frontis thoracisque albidii. Alae fuscae: lunula pallida versus postica.

Succincta. 15. A. (la rubanée) thorace flavescens subvillosa, abdomine nigro, cingulis quatuor albis.

Geoff. paris. 2. p. 413. n. 7.

Fab. andrena 18. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor albis.

Schæff. icon. t. 32. f. 5.

Hab. in terris Australibus. In Gallia Aust. V.

Desc. Media & rarissima apud nos. Rostrum subulatum, corneum, bivalve. *Frons* albicante vellere. *Thorax* villosus albidus. *Abdomen* atrum, nudum, incisurarum marginibus quatuor villosis niveis. *Pedes* nigri. *Tibiæ* extus albedo pilosæ. *Faun.* 1694.

Obs. 1. Error typographicus in synonymia *Syst.* nam hæc apis est *l'abeille mineuse à corcelet roux & velu.* *D. Geoff.* ut bene emendavit. *D. Fab.* V.

Obs. 2. Variat. Minor, thorax magis nigricans fasciæque prima abdominis absoluta. *Fab.* obsoleta.

Ænea. 16. A. (la bronzée) ænea griseo-pubescent. *

Fab. andrena 3. ænea; griseo-pubescent.

Geoff. inf. tom. 2. p. 415. n. 15.

Hab. in Europa. In America paullo major. *Fab.*

Desc. Media s. A. *mellifica* dimidio minor. *Corpus* totum viridi-æneum, at *thorax* vellere flavescens tectus. *Antennæ* nigræ. *Faun.* 1695.

Cærulef. 17. A. (la bleuâtre) fusca subvillosa, abdomine cæruleo, incisurarum marginibus albicantibus. *

Fab. andrena 1. fusca subvillosa, abdomine cæruleo, incisurarum marginibus albicantibus.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. *Corpus* totum atrum, cæruleo, immaculatum, villositate, vix observanda; albicante. *Faun.* 1696.

Mellifica. 18. A. (l'abeille) pubescens, thorace

subgriseo , abdomine fusco , tibiis posticis ciliatis , intus transverse striatis.
Scop. carn. 811.

Mouff. inf. 2.

Aldr. inf. 20.

Jonst. inf. 1. t. 2.

Raj. inf. 240.

Swamm. quart. bibl. t. 17. f. 1. operaria.
 f. 3. fœmina.
 f. 4. mas.

Reaum. inf. 5. t. 21 , 23. t. 22.
 f. 1. operaria.
 f. 2. mas.
 f. 4. fœmina.

Sulz. inf. t. 19. f. 123.

Geoff. paris. 2. p. 407. n. 1.

Fab. 37.

Faun. Fridr. n. 646.

Enum. n. 813.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 16. sp. 16.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 896.

Hospitatur in Europæ arboribus cavis ,
 frequentius culta hospitatur.

REGINA (Fœmina) unica , altior , oblongior , aculeata , antennis articulis 10.
 FUCI (Mares) ad 1600 , inermes ,
 antennis 11-articulatis. OPERARIÆ
 (Spadones) ad 20000 , antennis 15-articulatis , ventriculis 2 : mellis ceræ-
 que , aculeatæ ense retrorsum ferrato ,
 venenato , latente intra vaginam cuspidatam.

RESPUBLICA Alvearii gynæcocratica est ,
 dum Fœmina imperans semper inclusa ,
 operariorum custodum satellitio assidue
 stipata , antennis obvium Marem salut-
 tat , insiliendoque comprimit cum illius
 vitæ dispendio ; parit dein ova ad 40000
 sæpe quotannis , in adaptatis favi cellis :
 primum neutra , dein mascula , demum

nonnulla fœminina ; his exclusis gradu 2do. supra calorem æstatis ordinariæ , adoleſcunt larvæ sextiduo , nent ad parietes cellæ , operiuntur usque dum adultæ evolant , alteroque die mellificant . Harum Fœmina junior , per triduum , omni horæ quadrante , stridorem edit , eoque admonet emigraturum in examina gregem . Mares , ignavum pecus , incurii apri cantur serenis diebus , gulæ dediti . Spadones operarii , neutri , indefessi , mel e nectare , cera e polline florum sedulo legunt $\frac{1}{4}$ miliaris spatio , quoties per cælum licet , reducunt , flavos cereos struunt sexangulari – prismaticos eosque melle replent , fœminam mares pullosque nutriunt , cellas inhabitatas repurgant , mira munditia impura auferunt , vigilias & stationes ad portas instituunt , hostes arcent aculei ictu venenato sibi ipsis licet lethali , maresque demum transactis nuptiis occidunt , expellunt . Exeminant emittendo colonias , fœmina duce , ad novas quærendas sedes superato solstitio æstivo , speculatoribus fronte notatis palpis duobus luteis . Hostes imprimis sunt Motacilla alba , Merops Apiaster , Falco opivorus , Picus viridis , Aranea caricina , Hirundines , Pavones , Bufones , Mures , Crabrones , Vespæ , Pediculi , Apes fures , Mellonellæ , cereanæ Fumus , &c. Tulipæ flores captivant . Flores melliferi , non omnes , præcipui sunt Echium , Borago , Verbascum , Serpyllum , alii ; imprimis Erica Svecis , Fagopyrum Scanis , Tilia Polonis , Rosmarinus Narbonensibus , Thymus Atticis , Arbutus Corsicis , Absinthium Sardinis , Aconitum Ponticis , &c. hinc pretium varium mellis .

Pan Apum hodie vestitur a D. D. J. O. Hagstrom; Historiam Apum dederunt Reaumur, Aubenton alique.

.... ipse Regem parvosque Quirites Sufficiunt, aulasque & cerea Regna resigunt. Virg.

Cunicularia. 19. A. (la mineuse) pubescens , thorace ferrugineo , abdomine fusco , pedibus undique villosis. *

Fab. 36.

Enum. n. 811.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 896.

Hab. in terra sicciore , quam foraminibus pluribus parum remotis penetrant & distinctæ ædificant plures. Simillima A. mellificæ.

Variegata. 20. A. (la variée) thorace abdomineque albo variegato , tibiis ferrugineis. *

Fab. nomada 3. thorace abdomineque albo variegatis , pedibus ferrugineis.

Hab. in Europa. Pernoctat in geranii phæi rostris , mordicus apprehensis.

Desc. Minor. Corpus arcum , nigrum , abdominis segmentis 1 , 2 , maculis duabus , 3 , 4 , 5 , 6 vero quatuor albis. Tibiæ & plantæ ferrugineæ.

Faun. 1699. Syst.

Obs. Variat scutello albo & ferrugineo. Fab.

Rostrata. 21. A. (le museau) labio superiore conico inflexo , abdominis fasciis glaucis repandis. *

Faun. suec. 1. n. 999. apis pedibus maxillisque flavis apice nigris , incisuris abdominis glabris margine nigris.

It. Goul. 336.

Fab. Bembex 3. labio superiori conico

fisso, abdomine atro, fasciis glaucis repandis.

Hab. in Europæ monticulis arenosis; in singulis nidis unicus pullus. In montibus Gebennis. V.

Desc. *Oculi*, *os*, *pedes*, flava. *Thorax* niger. *Abdomen* nigrum, segmento ante margines flavo; margo enim baseos & extimus niger est: primum segmentum macula, utrinque notatur. *Alæ* glaucæ, venosæ. *Thorax* subhirsutus, macula flava pone singulam alam, linea flava interrupta ad apicem thoracis. *Oris* labium superius corneum, inflexum, magnum, acuminatum. *Dentes* utrinque solitarii, flavi, apice nigri. *Vespæ vulgaris* magnitudo.

Differt sexu. *Alia* abdomine luteo maculato (ut supra) *antennis* supra nigris, subtus flavis; aculeo corneo brevissimo, rigido: *alia* albo pictæ, ubi prior luteo. *Antennæ* fere ex toto nigræ, aculeo pungente, longo, flexuoso, ut in apibus. *Faun.* 1700.

Obs. In nostris *lingua* apice bifida *thorax*que apice hirsutus est. Elegans & singularis *apis* *pedes* luteos habet. *Femora* antica sæpe supra nigra aut nigro notata. V.

Lagopoda. 12. A. (la lagopode) griseus, pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis posticis clavatis, ano emarginato. *

Fab. 33.

Enum. n. 810.

Sulz. hist. inf. t. 27. f. 17.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 248.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Desc. Magnitudo sequentis. Fusca, vel lere subgriseo. *Frons* hirsuta, labio

obtusio. *Palmæ* anticæ hirsutæ, dilatæ, albæ, aculeis extus dilatatis ciliatæ. *Tibiæ* posticæ incrassatæ. *Faun.* 1702.

Manicata. 23. A. (les manchettes) nigra, pedibus anticis hirsutissimis, abdomine maculis flavis lateralibus, ano tridentato. *

Swamm. bibl. t. 26. f. 4.

Geoff. parif. tom. 2. p. 408. n. 3.

Fab. 45.

Schæff. icon. t. 32. f. 11, 12.

Hab. in Europa. In arboribus cavis nidos construit. Non rara in floribus. V.

Desc. Magnitudo apis mellificæ. *Corpus* fuscescens. *Abdomen* utrinque macula flava s. sex paribus. *Pedes* anteriores valde barbato-ciliati, flavescents. *Anus* aculeis tribus fixis, divaricatis & insuper unico ad latera, magis inferiore. *Faun.* 1701.

Obs. Species gregaria. In operariis aculei desunt. Minores sunt ut omnes apes operariæ. Nihil certius quam certarum apum vesparumque individua tria distincta mares, fœminæ & neutra. A legibus ordinariis natura hic aberrat. Ratio nobis incognita. V.

4-Dentata. 24. A. (la quadridentée) fusca, abdominis cingulis quinque albidis, ano quadridentato, intermediis bifidis. *

Swamm. bibl. t. 26. f. 4.

Fab. 68.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis A. *succenturiatæ*, sed triplo minor. *Caput* & *thorax* vellere subcinerascens. *Abdomen* conicum, atrum, marginibus incisurarum quinque albis: prima obsoleta, nisi ad

latera. *Anus* prominet quatuor dentibus, intermediis longioribus. *Faun.* 1703.

Obs. Varietas in Gallia Aust. multo minor. *Anus* 4 dentibus armatus est, sed brevioribus. *Abdominis* segmenta minus albida. An sexus varietas, an species altera? V.

Conica. 25. A. (la conique) fusca, abdomine conico acutissimo, segmentorum marginibus albis. *

Raj. inf. 352. n. ult.

Reaum. inf. 6. t. II. f. 2, 3, 4.

Fab. 72.

Enum. n. 809.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 900.

Hab. in terræ cavitatibus. In Gallia Aust. rara circa Lugdunum. V.

Desc. Ape domestica paullo minor est. *Antennæ* nigræ, subclavatæ. *Caput* & *thorax* pilis cinereis. *Abdomen* conicum, acutissimum, incisurarum marginibus albidis adeoque 5 a tergo, 4 vel 3 subtus lineolæ albæ. *Frons* nigra. *Faun.* 1705.

Obs. Variat. Incisuræ abdominis albo lateraliter maculatæ & non margine albæ. Hæc major est. V.

Annulata. 26. A. (la musquée) nigra, fronte annulifque pedum nigris. *

Fab. 77.

Hab. in Europa. In floribus Bressiæ frequens. V.

Magnitudo formicæ. *Corpus* totum atrum. *Frons* alteri sexui lineola ante singulos oculos alba; alteri *frons* tota alba cum macula alba in basi antennarum. *Thorax* nudus, puncto albo convexo

ante alas. *Tibiæ* quatuor posteriores basi albæ. *Faun.* 1706.

Ruficornis. 27. A. (la ruficorne) antennis pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato.

Fab. nomada 4. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine luteo variegato.

Hab. in Europæ. In Galliæ Aust. floribus capta. V.

Desc. Media. *Caput* nigrum. *Os* ferrugineum. *Antennæ* ferrugineæ. *Thorax* niger, aliis lineæ ferrugineæ quatuor longitudinales; aliis punctum flavum ante alas & duo flava loco scutelli. *Abdomen* ferrugineum, glabrum, maculis flavis lateralibus, postice fasciis flavis. *Pedes* ferruginei. *Alæ* apice fuscescentes. *Faun.* 1707.

Ferrugina- 28. A. (la rouillée) nigra glabra, abdomine, antennis, ore pedibusque, ferrugineis.

Hab. in Suecia.

Parva. Caput & thorax nigra, puncto flavo, elevato, utrinque thoracis. *Abdomen* ovatum, glabrum. *Femorum basis* nigra. *Hæc & ruficornis media inter apes & vespa; sunt.*

Cariofa. 29. A. (la dépravée) fusca subvillosa pedibusque flavis. *

Scop. 805?

Hab. in Europæ ligno carioso. In Bressia. V.

Desc. Magnitudo A. *ruficornis*. Tota nigra, sed inter antennis flava. *Pedes* (exceptis femoribus) rufo-pallidi, præsertim quatuor posteriores. *An-*

tenna dimidio corpore fere breviores,
rectæ. *Faun.* 1708.

Ex Enum.

Brycerum. 30. A. (la maçonne) nigra, thorace abdominisque basi hirsuto-fulvis.

Geoff. inf. tom. 2. p. 409. n. 4.

Hab. in Europa. In Gallia ubique. Nidos e terra diluta conficiunt, contra muros solis expositos applicant. In singulo plurimæ cellulæ, in quibus mel & ovum deponuntur, dein cellulæ clauduntur. V.

Desc. Nigra aut fusca potius, saltem supra. *Thorax* hirsutus, fulvus. *Abdominis* basis fulvescit ex hirsutie, minus tamen, quam in thorace densa; reliquum *abdomen* sub hirsutulum, supra fuscum.

Luctuosa. 31. A. (le deuil) aterrima, segmentis abdominis omnibus utroque latere puncto albo. *t. 8. f. 24. no.*

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 9. pag. 13.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Atra, nitida. *Caput* & *thorax* lana cinerea nonnihil hirsuta. *Abdomen* glaberrimum, nitidum; in singulo segmento utrinque macula tetraedra nivea ad marginem. *Femora* item omnia semicingulo niveo insignia sunt. Monet cl. *Scopoli* hanc albedinem non semper adesse. Margo alarum niger.

Convexa. 32. A. (la convexe) nigra, rufo-pubescent, abdomine excavato, punctato.

Scop. 798. an ?

Hab. in Europa.

Desc. Nigra tora, fatis glabra, abdomine

præsertim punctis minutis copiosis impressis. *Frons* albo villosa. *Thorax* utcumque pilosus, pilo rufescente. *Apices segmentorum* pilis ciliati. *Alæ superiores* fuliginose nigrescentes.

Cetii. 33. A. (la soufrée) nigra, abdomine ferrugineo, segmentorum apicibus flavis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra tota. In *fronte* pili flavescentes, subtus & postice villus cinereus. *Thorax* *pectus*que nigra. *Thorax* tomento cano rufescente leviter tectus: segmentum primum *abdominis* nitide nigrum; reliqua ferruginea, apicibus sulphureis. *Abdomen* totum subtomentosum; apices vero segmentorum multo magis, unde color sulphureus, quod ibi quasi cilia quædam densa flava existant. *Pedes* nigri. *Alarum anticarum* margo niger.

Leucozo- 34. A. (l'herminée) nigra, abdominis
nia. segmentis basi albis.

Hab. in sylvis. In Gallia Aust. V.

Desc. Tota nigra, pilosa, non hirsuta. *Abdomen* nitidum constat segmentis quinque, quorum tria intermedia basi albissima, candore orto ex pilis densis decumbentibus. *Pedes* rufescente villo pubescunt.

Leucoflo- 35. A. (le demi-deuil) nigra tomentosa,
ma. abdominis segmentis albo-ciliatis, ore ventreque albis.

Schæff. icon. t. 22. f. 14.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Tota nigra, tomentosa, minime hirsuta. *Frons*, *os*, regio post alas,

apices segmentorum abdominis supra & venter albido canescentes. Albedo *ventris*, pro vario oculi situ, fuliginosa videtur, sæpe lineola transversa nigra interrupta. *Pedes* albido villo pubescunt. *Obs.* *Thorax* gibbosus est. *Tibiæ* quatuor posteriores supra albæ, infra nigræ, saltem in nostris speciminibus. *Abdomen* coniforme. V.

Agilissima. 36. A. (l'agile) nigra, fronte thoraceque villoso pubescentibus, abdomine oblongo lucido.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 14. sp. 12.

Hab. in Europa.

Desc. Variat nonnihil colore.

Frons glabriuscula. *Thorax* rufo villo pubescit. *Abdomen* nigrum, pilis raris ferrugineis, *subtus* longioribus. *Pedes* ex pilis fulvescentes.

Frons & thorax albido villo pubescunt.

Abdomen nigrum, pilis raris albidis, *subtus* longioribus. *Pedes* ex pilis canescentes. *Abdominis* segmentum primum supra numero 7 duplici, sibique obverso inscriptum.

Hirta. 37. A. (la mandarine) nigra, alis anticis violaceo - nigris, abdomine cingulo duplici flavo.

Hab. in Europa infra muscum, sine cellula aut nido.

Desc. singulare insectum, de quo dubites, an tenthredinem, vespam apemve conspicias, nisi rostrum breve dubium omne dirimeret.

Caput atrum, uti & *antennæ*, quæ fractæ non sunt, extrorsumque incrassescunt. *Oculi*, ut in vespis, reniformes; *stemma* unicum & supra illud

lineola transversa impressa utrinque in lunulam desinens ambaſque a ſeſe averſas connectens, hac figura c-c. *Thorax* ater, uti & pedes & pectus, parum pilofus. *Pedes* atri, pilofi; *tarsi* ſpinofi, intermixtis pilis aut ſetis potius. *Tibiae* undique ſpinis horrent brevioribus, pilis intermixtis. *Metatarsus* nullus & univerſim pedes colligendo pollini inepti. *Abdomen* atrum, pilofum, ſegmentorum apicibus nigro-ciliatis, ſegmento ſecundo fascia lata flava, tertio fascia ſimili, ſed antice bifida. *Subtus* totum abdomen homogenee nigrum. *Totum* inſectum punctis non confertis impreſſis perſeminatum. *Alae ſuperiores* violaceo-nigræ. *Inferiores* decolores, nec niſi modice fulceſcentes.

Obſ. Ex hac deſcriptione patet hoc inſectum ſcoliae *D. Fab.* 4-maculatae valde eſſe affine & inter vespas potius quam inter apes relegarem. *Roſtrum* breve, inquit *D. Schrank*, dubium omne dirimit; ſed ſi Entomologos conſulamus, roſtri brevitās inter vespas collocat: *outré les dents, la bouche des abeilles eſt encore accompagnée d'une longue trompe flexible coudée, pliée en arriere & couchée en-deſſous, & le contour de leurs yeux eſt ovalé; égal & uni, ſans avoir cette échancrure & cette ſinuofité qu'on obſerve conſtamment dans les yeux des guêpes.* *D. Geer*, tom. 2. p. 748. ſi alae plicatae ſunt, certe vespa eſt; ſi non plicatae, oculis & roſtro vespis quam apibus propior. V.

Vespoïdes. 38. A. (la vespoïde) antennis, ore,

scutello pedibusque, fulvis, abdomine supra cingulis flavis nigrisque alternis.
Hab. in Europa. In Gallia Australiori. V.
Desc. Labium, maxillæ, antennæ, fulvi coloris; reliquum caput nigrum. *Thorax* niger, subpubescens, ad collum lineola, ad exortum alarum anticarum puncto, ad scutellum punctis duobus contiguis saturate fulvis. *Pectus* utrinque linea longitudinali lunulata saturate fulva. *Femora* basi nigra, reliquo pede geniculisque omnibus fulvis. *Abdomen* ovatum, glaberrimum, nitens, nigrum, cingulis quinque flavis; subtus ex fusco fulvescens, cingulis tribus flavis. *Alæ* apice obscuriores.
Obs. In nostris subtus sæpe cinguli quatuor flavi. V.

Sphegoides. 39. A. (la sphégoïde) ore flavo, antennis pedibusque fulvis, abdomine fulvo testaceo, cingulis flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud frequens. V.

Desc. Caput nigrum. Os cum maxillis flavum. Antennæ fulvæ. Frons & caput subtus albido pilosum. *Thorax* niger cum pectore, albidoque villo pilosus; ad exortum alarum punctum fulvum & ad latus versus pectus punctum flavum; intra alas in medio thoracis puncta duo fulva distantia. *Pectus* in medio longitudinaliter depressum, utroque quasi ubere puncto flavo notatum. *Pedes* antici toti; secundi paris, demta basi femorum, tertii, demto femore, fulvi. *Abdomen* fulvo-testaceum, glabrum, segmento primo basi nigrum, reliquis basi flavis, unde quinque fasciæ flavæ; subtus segmentum

primum lineola, reliqua basibus flavis.
Alæ apice obscuriores.

Obs. In his speciebus corpus glabrum;
 ergo inter notas characteristicas, hæc,
corpus villosum; non admittenda. V.

Vespiformis. 40. A. (la vespiforme) ore, antennis,
 scutello pedibusque fulvis, abdomine
 cingulis flavis tribus, primo interrupto,
 subtus tribus nigris.

Scop. 808.

Hab. in Europa.

Desc. *Labium maxillæque* cum *antennis*
 fulvi coloris, reliquum *caput* nigrum:
Thorax niger pubescens, ad alas
 puncto lineolaque fulvis. *Alæ* hyali-
 næ, apice obscuro. *Abdomen* ovatum,
 nitens, fulvo-testaceum, *supra*, cin-
 gulis tribus flavis, quorum primum
 interruptum, cingulis præterea nigris;
 at gracilioribus; omnium ordo hic est:
 basis abdominis nigra; tum fascia lata,
 testaceo-fulva; dein fascia angusta nigra
 & hac terminatur primum segmentum;
 segmentum sequens totum testaceum
 macula ovata, introrsum acuta flava,
 utrinque notatur: inter utramque macu-
 lam adparet alia macula fuliginosa, vin-
 culi instar, ambas conjungens; segmen-
 tum tertium testaceum, apice nigrum,
 utroque latere macula exigua flava;
 segmentum quartum testaceum, basi
 cingulo nigro, medio linea transversa
 flava, hæc interrupta est, sed ruptura
 non nisi armato oculo visibilis, sub
 apice cingulum obscurum, seu nigri-
 cans; segmentum quintum, id est, ulti-
 mum, testaceo-fulvum, parallelo-
 grammo flavo. *Pectus* nigrum, sed
 latera obscurius rufescenti-testacea,
 pube

pube sparsa albiba. *Abdomen subtus* testaceo-fulvum, fasciis tribus nigris. *Pedes* testacei, sed femora postica nigra;

Bicincta. 41. A. (la cordelière) nigra, ore cingulifque duobus abdominis albis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra. *Antennæ* non fractæ. *Os* ex lana albida argenteum. *Thorax* *pectus*que ex villo albido hirsutula. *Abdomen* nigrum nitens, apicibus segmentorum pallidioribus rufescentibus; segmento secundo tertioque cingulo albido ex pilis. *Tarsi* omnes albidii. *Tibiæ* posticæ basi albæ.

Hemisphærica. 42. A. (l'hémisphérique) nigra, rufo subhirsuta, abdomine hemisphærico.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. sed rara. V.

Desc. Nigra, sed *abdomen* fuscum, subæneum. *Frons* & *pectus* albido villo hirsuta. *Thorax* cano, *abdomen* rufo, eoque longo villo horrêt, non tamen ita denso, ut non tranfluat color abdominis; aut segmenta numerari nequeant.

Fulviven- 43. A. (la bedeaude) nigra, abdomine nitente, basi fulva, apice nigro.

Scop. 807.

Geoff. inf. tom. 2. p. 415. n. 17.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. frequens. V.

Desc. Nigra, parum tomentosa. *Frons* cana. *Os* flavum. *Thorax* lateribus & subtus villosulus. *Abdominis* primum segmentum apice, secundum & tertium tota fulva, seu potius ferruginea.

ginea, cum lunula nigra. *Tibiæ* flavæ.

Sanguino- 44. *A.* (la fanguinolente) nigra, thorace lenta. rubro.

Fab. 40?

Hab. in Europa.

Desc. I. fracticornis, tota nigra, pilosa, abdomine magis; *thorax* supra ruber, vix pilosus.

Minuta. 45. *A.* (la petite) nigra nitens, antennis subtus fulvescentibus.

Hab. in Europæ foraminibus palorum antiquorum apricorum. In Bressia frequens. V.

Desc. Nigra. *Alæ* diaphanæ corpore longiores. V.

Ex entom. Carn.

Sordida. 46. *A.* (la tachée) nigra, thorace hirsuto, ano tibiisque rufis.

Fab. andrena 13?

Hab. in Europa. In Sueciæ nemoribus. *Fab.*

Desc. Ape longicorni paullo minor. *Antennæ* thorace breviores. *Alæ* anticæ lineola ferruginea marginali. *Abdomen* nitidum. *Tibiæ* palmæque rufæ. *Anus* rufus.

Atra. 47. *A.* (le velours noir) nigerrima tota, fronte & thorace antice ac postice albo-tomentosis, abdomine subrotundo, alis semifuscis.

Enum. n. 814, tota nigra, abdomine nitenti, alis fuscis.

Schæff. monog. an?

Hab. in Europa. Capta super flores *laserpitii latifolii*. In Gallia Aust, V.

Desc. Statura apis *longicornis*, sed crassior. Ad basin maxillæ cujusque tubercula tria, intermedio majore. *Abdomen* nitens æque crassum. *Alæ* fuscescentes, basi excolores.

Farfarise- 48. A. (du tussilage) nigra, rufo-tomentosa, abdomine ovato.

Hab. in Europa. Conspicua dum floret *tussilago farfara*, cujus floribus insidet, aprili. M.

Desc. Statura fere *longicornis*. *Antennæ* sublucidæ. *Maxillæ* unidentatæ, longæ; basi tuberculis duobus. *Alæ anticæ*, lineola ferruginea marginali.

Sabulosa. 49. A. (la pressée) pubescens, antennis longitudine thoracis, abdomine elliptico.

Hab. in Europa. Aprili mense conveniunt in sabulo ab aquis disperso ibique nuptias instituunt, de loco in locum volitantes, zephyro plaudente choreis.

Desc. *Mas fronte* barbata pilis flavescens, *thorace* albido, pilis rufis utrinque pubescente.

Fæmina pigrior, crassior, *fronte* barbata pilis nigricantibus, maxillis longioribus; *thorax* rufus-pubescent. *Pedes* subtus longius barbati.

Riparia. 50. A. (des rivages) nigerrima tota, capite thoraceque pubescentibus, abdomine lucido elliptico.

Hab. in Europa. In floribus *erysimi barbareæ* prope litus fluvii Idriæ capta. In floribus diversis prope litus Rhodani circa Lugdunum. V.

Desc. *Alæ* fusco-ferruginæ, nube in medio obductæ. *Maxillæ* apice bidentatæ,

Obs. Nostra major antennæque longiores, sed similis. V.

Calcarata. 51. A. (l'éperonnée) nigra, capite crasso pubescente, femoribus posticis dente instructis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Nemausum capta. V.

Desc. Antennæ extrorsum rufæ, thoracis longitudine. Caput thorace crassius, pilosum. Abdomen ovatum.

Obs. Parva, non minor. Femora postica crassa, incurvata, appendice acuto instructa. V.

Præcox. 52. A. (la printanière) capite, thorace, abdomine, basi albis villis pubescentibus, antennis longitudine abdominis elliptici.

Hab. in Europa. Primo verè flores adit. In Gallia circa Lugdunum. V.

Desc. Nigra tota. Maxillæ longæ, apice rufescentes, caput crassum. Alæ hyalinae, linea ferruginea marginali. Variat fronte densis longioribusque villis barbata, qualis in amentis salicis copiosa reperitur.

Montana. 53. A. (la montagnarde) nigra, antennis abdomine pedibusque fulvis.

Hab. in Europa. In floribus laserpitii fileris capta.

Desc. Antennæ articulis (10) 7, 8, 9, nigricantibus. Tuberculum fulvum in singulo latere thoracis supra alas. Scutellum fusco-fulvum. Thoracis latera sub alis & ejusdem pars postica subargenteis villis pubescentia. Alæ limbo obscuriore. Pedes fulvi, femorum basi nigra. Abdomen antennarum

longitudine, ellipticum, nitens, fulvum, in singulo latere maculis tribus flavescens.

Variat, tuberculis thoracis anticis flavescens unicoque puncto luteo in latere singulo abdominis, necnon ore antice rufo antennisque totis rufis.

Ex spec. D. Fab.

Pilipes. 54. A. (l'aigrette) grisea, pedibus intermediis fasciculato pilosis.

Enum. n. 804.

Pall. spicil. zool. fasc. 9. 24. t. I. f. 14.

Geoff. inf. tom. 2. p. 412. n. 9. an?

Hab. in Anglia. D. Lewin. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus totum hirsutiae cinerea tectum. *Pedes* nigri, postici quatuor, imprimis intermedii, pilis longioribus fasciculatis hirti.

Desc. Labium superius flavum; *frons* ferruginea; hæc & illud teguntur villo cano. *Thorax* totus flavo-hirsutus. *Abdomen* a basi versus medium villoso-flavescens, non nihil tamen, quam in thorace, villo rariore hirsutum. Apex ipse nigro villosus, hæc tamen nigredo non abrupte incipit, sed ipsa baseos flavedo quibusdam veluti umbris penumbrisque in eam degenerat. *Caput* subtus, *pedum anticorum* pars postica, *pectus*, cano villo valde barbata. *Pedes* intermedii graciliores, longiores. Metatarsi parte antica scopa nigra densa, postica cum tarsis pilis longis nigris, rarioribus tamen, barbata; ad apicem tarsi verticillus pilorum nigrorum: juncturae pedum omnes albicant. *Tibiae*

posticæ pilis albis densis brevioribus ciliatæ. *Enum.*

Obs. An in hac divisione, an in sequenti collocanda? V.

Hæmorrhoa. 55. A. (la rouillée) thorace villoso ferrugineo, abdomine atro, lateribus glauco maculatis, ano ferrugineo.

Hab. in Germania. *D. de Hattorff.* In Gallia Aust. V.

Desc. Caput cum antennis nigrum, fronte cinereo pubescente. *Thorax* niger, lana ferruginea tectus. *Abdomen* atrum, nitidum, maculis lateralibus glaucis anoque rufo. *Pedes* nigri, tibiis posticis rufo hirtis.

Florentina. 56. A. (la Florentine) abdomine maculis flavis lateralibus subtus hirsutissimo, segmentis tribus ultimis utrinque dentatis.

Hab. in Europa Australi. *Mus. Com. Excell. D. Tott.* In Gallia Aust. non rara. V.

Desc. Summa affinitas A. *maculata*. *Labium* flavum. *Thorax* hirtus, cinereus. *Abdomen* supra glabrum, maculis lateralibus flavis. Segmenta tria ultima utrinque dente valido, acuto, & anus præterea tridentatus. *Pedes* flavi, femoribus nigris.

Obs. Ape Florentina *Syst. major.* Cinguli flavi, puncto nigro in medio notati. *Pedes* lana albida vestiti, nigri. *Femora* nigra. V.

Ireos. 57. A. (de l'Iris) thorace hirto ferrugineo, abdomine atro, fasciis tribus interruptis albis, tarsis posticis angulato-dilatatis.

Pall. iter 2. 2. p. 731. 93.

Hab. in floribus iridis Ruffiæ. Muf. D. Banks.

Desc. Major fequenti. *Os & labium flava. Abdominis* ſegmentum primum lana ferruginea, 2, 3, 4, fascia interrupta alba. *Pedes* flavi, tarſis poſticis baſi valde angulatis.

Maculata. 58. A. (la tachetée) nigra, thorace maculato, abdomine maculis utrinque ſex tranſverſis flavis, ano integro.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. *Caput* nigrum, ore punctiſque verticalibus flavis. *Thorax* niger, ſubpubeſcens, maculis lateralibus flavis. *Abdomen* glabrum, atrum, nitidum, maculis utrinque ſex tranſverſis flavis. *Femora* ruſa. *Tibiæ* ſupra flavæ, ſubtus nigræ.

Interrupta. 59. A. (l'interrompue) pubeſcens nigra, abdomine ſtrigis quinque flavis, anticis duabus interruptis, ano bidentato.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Auſt. V.

Desc. Statura omnino præcedentis, at *thorax* magis pubeſcens nec maculatus. *Caput* nigrum, clypeo punctoque ſupra oculos flavis. *Abdomen* glabrum, nigrum, ſtrigis quinque flavis obſoletis, anticis interruptis. *Anus* bidentatus.

Variegata. 60. A. (la variée) nigra, abdominis ſegmentis maculis quatuor flavis tranſverſis.

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Auſt. V.

Desc. Affinis A. maculatæ. *Caput* fuſcum, *labio* utrinque macula flava & puncto parvo pone oculos. *Thorax* fuſcus, linea marginali maculiſque duabus

scutellaribus flavis. *Abdomen* globosum, atrum, maculis quatuor flavis in singulo segmento, subtus pilis rufis hirtum. *Pedes* flavi, *femoribus* supra nigris. *Anus* niger.

Pubescens. 61. A. (la cotonneuse) corpore cinereo pubescente immaculato.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Parva corpore toto pube cinerasciente recto. *Abdominis* segmenta margine albidiora.

Punctata. 62. A. (la ponctuée) nigra, cinereo villosa, abdomine atro, segmentis utrinque puncto albo, scutello integro.

Hab. in Angliæ floribus.

Desc. *Antennæ* nigrae, breves. *Caput* & *thorax* tomento cinerasciente. *Abdomen* atrum, laeve, nitidum, acutum, primo secundoque segmento utrinque fasciculo pilorum albicantium; tertio, quarto quintoque utrinque puncto albo, ultimo immaculato. *Pedes* nigri, tibiis basi cinereo annulatis.

Cæcutiens. 63. A. (le Lynx) fusca, abdomine glabro ferrugineo, utrinque nigro maculato.

Hab. in Lipsiæ hortis.

Desc. *Antennæ* breves, nigrae. *Oculi* vivacissimi, albi, nigro punctati, qui vero colores cum vita pereunt. *Abdomen* subrotundum, rufum, utrinque punctis tribus s. quatuor nigris.

Quadricinc-64. A. (la quadrifasciée) nigra, abdomine cylindrico, fasciis quatuor albis.

Hab. in Soroea Danorum. *D. de Slangbusch.*

Desc. Magnitudo *A. florifomnis*. *Antennæ* supra fuscæ, subtus fulvæ. *Corpus* nigrum, pube parva cinerascens. *Abdomen* cylindricum, segmentorum quatuor marginibus albis, anteriorum interruptis. *Pedes* flavi.

Albipes. 65. *A.* (l'albipede) fusca, abdominis medio rufo, tibiis albis.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni*. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva. *Caput & thorax* fusca, parum pubescentia. *Abdominis* segmentum secundum apice, tertium totum quartumque basi rufum. *Pedes* nigri, tibiis albis macula baseos fusca. Variat interdum segmento secundo tertioque rufis, macula media nigra.

Linguaria. 66. *A.* (l'horrible) antennis nigris longitudine corporis, thorace cinereo, abdomine nigro.

Hab. in Saxonix floribus.

Desc. Statura *A. longicornis*. *Caput* nigrum, labio flavo. *Lingua* septemfida.

Scutellaris. 67. *A.* (l'écussonnée) nigra cinereo villosa, abdomine atro, utrinque albo punctato, scutello porrecto bidentato. *Nom.* 2.

Hab. in Siberia. *D. Pallas. Mus. D. Banks.*

Desc. *Caput* nigrum, fronte albo pubescente. *Thorax* niger, antice cinereo pubescens. *Scutellum* postice productum, emarginato bidentatum. *Abdomen* totum glabrum, atrum, segmento I. Punctis utrinque duobus, reliquis utrinque unico albis. *Pedes* nigri, tibiis macula magna alba. *Alæ anticae* fuscæ, litura marginali alba.

Gibba. 68. A. (la bossue) nigra , abdomine rufo apice nigro. *Nom.* 6.

Scop. ann. hist. nat. 4. 45. 2.

Hab. in Anglia. *Mus. D. Banks.* Prope Lugdunum in floribus. V.

Hattorfia- 69. A. (l'Hattorf) nigra , abdominis secundo segmento ferrugineo , maculis tribus nigris.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. Caput & thorax immaculata , atra , nitida. Abdominis segmentum primum atrum , nitidum , margine ferrugineo ; secundum ferrugineum , maculis tribus nigris , intermedia majori quadrata ; segmentum tertium quartumque nigra , marginibus albis ; quintum nigrum , ano rufescente. *Pedes* nigri , postici lanugine alba tecti.

Cingulata. 70. A. (l'entourée) cinereo villosa , abdomine glabro nigro , segmento secundo tertioque ferrugineis.

Hab. in Sueciæ nemoribus. In Bressia. V.

Desc. Alæ albæ.

Labiata. 71. A. (la labiée) villosa nigra , abdominis segmento secundo tertioque rufis. *Andrena* 2.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In Italia.

Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus totum villosum , nigrum , abdominis segmentis duobus solis ferrugineis ; labium flavum.

Variat rarius abdominis apice ferrugineo fusco nec nigro.

Marginata. 72. A. (la bordée) thorace pubescente , abdomine ferrugineo segmentorum

marginibus cinereis, primo segmento atro. *Andrena* 3.

Hab. in Europa.

Desc. Parva, statura *A. helvolæ*. *Caput* & *thorax* nigra, lana cinerea pubescentia. *Abdominis* primum segmentum atrum; reliqua ferruginea marginibus cinereis.

Bicolor. 73. *A.* (la bicolor) thorace villoso ferrugineo, abdomine atro immaculato. *Andrena* 4.

Hab. in Daniæ nemoribus.

Desc. Affinis *A. succinclæ*, at abdomen immaculatum.

Hæmorrhoidalis. 74. *A.* (l'hémorroïdale) nigra, ano ferrugineo. *Andrena* 13.

Hab. in Sueciæ nemoribus.

Desc. Media. *Labium* tomento cinereo. *Tibiæ* posticæ rufæ.

Thoracica. 75. *A.* (l'ardente) atra, thorace rufo, alis apice fuscis.

Hab. in Daniæ nemoribus. In Galliæ Aust. sylvis. V.

Desc. Statura & magnitudo *A. mellificæ*. *Frons* *thorax*que pilis rufis hirsuta. *Abdomen* nigrum, lucidum. *Alæ* magnæ, apice fuscæ. *Femora* postica valde pilosa, unde reliquis crassiores adparent. V.

Rotundata. 76. *A.* (l'arrondie) nigra cinereo hirta, abdomine subglobofo, segmentorum marginibus albis. *Mantiff. tom. I. p. 303.*

Hab. Hafniæ. *D. Pflug.*

Desc. *Caput* nigrum, labio tomento flavefcente. *Thorax* niger, cinereo hirtus, *Abdomen* rotundatum, nigrum,

segmentorum marginibus albis. *Pedes* nigri.

Rufipes. 77. A. (la rufipede) fusco ferrugineoque varia, abdomine flavo, segmentorum marginibus atris. *Mantiss.* ibid.

Hab. in Hispania. *D. Vahl.*

Desc. Statura & magnitudo A. *variegatæ*. *Labium* flavum. *Caput* ferrugineum, inter antennis nigrum. *Antennæ* nigrae. *Thorax* niger, margine omni ferrugineo. *Abdomen* flavum, segmentorum marginibus atris. In primo & secundo segmento linea dorsalis nigra. *Pedes* ferruginei, *femoribus* basi nigris.

Ferruginea. 78. A. (la ferrugineuse) capite thoraceque nigris ferrugineo maculatis, abdomine pedibusque ferrugineis. *Mantiss.* ibid.

Hab. in Hispaniæ floribus. *D. Vahl.*

Desc. Statura præcedentium, at duplo minor. *Caput* nigrum, ore margineque postico ferrugineis. *Thorax* niger, punctis duobus marginis antici & postici ferrugineis. *Abdomen* & *pedes* ferruginea, immaculata, *Alæ* fusca.

Trispinosa. 79. A. (l'épineuse) nigra, abdomine utrinque punctis duobus flavis, scutello trispinoso. *Mantiss.* ibid.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Statura parva præcedentium. *Corpus* nigrum, obscurum. *Os* pube argentea. *Thorax* immaculatus. *Scutellum* bidentatum & sub scutello dens porrectus, incurvus, acutus. *Abdomen* utrinque punctis duobus flavis. *Pedes* nigri, apice ferruginei, ungulis arcuatis validis, nigris.

Flavipes. 80. A. (la flavipede) nigra æneo-nitida ; pedibus flavis.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorff.* In Gallia Aust. V.

Desc. Statura omnino A. *florisomnis*, at duplo minor. *Caput* nigrum, labio flavo. *Thorax* niger, nitidus, immaculatus. *Abdomen* cylindricum, nigrum, æneo-nitidum. *Pedes* omnes fulvi.

Lineata. 81. A. (la rayée) nigra, thorace flavo lineato, sub scutello emarginato spinoso, abdomine fasciato. *Mantiss.* tom. I. p. 306. nomada 3.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. *Caput* cum antennis brevibus fuscum. *Thorax* niger, striga antica, lineolis quatuor dorsalibus abbreviatis punctisque duobus ante scutellum flavis. *Scutellum* emarginato - bidentatum, flavum. Sub scutello spina elongata, incurva, plana, canaliculata, obtusa, nigra, apice flava. *Abdomen* atrum, nitidum, fasciis quinque flavis. *Anus* rufescens. *Pedes* rufi.

Agrestis. 82. A. (la rustique) hirta, abdominis segmentis apice nigris. *Mantiss.* ibid. nomada 3.

Hab. in Hispaniæ agris. *D. Vahl.*

Desc. Colore variat. *Antennæ* nigræ. *Caput* & *thorax* rufo hirta. *Abdomen* rufum, primo segmento omnibusque apice nigris.

Variat. Flavescens, thorace cinereo hirta.

Ex Hist. inf. paris. Entom. que paris.

Muraria. 83. A. (la solitaire) nigro-cærulescens ;

alis nebulosis, fronte femoribusque posticis hirsutie flavis.

Hab. in Europa. In Galliæ antiquis muris.

Desc. Nigro-cærulea, sed frons apexque thoracis vellere nigricante tecta. Cætera similia.

Hortensis. 84. A. (la jardiniere) hirsuta, pedibus croceis, abdomine nigro, incisuris albis.

Hab. in Europa. In hortorum floribus non rara.

Desc. Nigra. *Antennæ* mox flavæ, mox nigræ. *Corpus* elongatum angustatum, nigrum. *Abdominis* segmenta margine albida. *Pedes* flavi. Datur alia paullo major, sed adeo similis A. *bicinctæ*. *D. Fab.* ut pro eadem specie facile sumeretur, sed hæc in America.

Interrupta. 85. A. (la fasciculée) nigra, segmentis abdominalibus fasciis albis, pilosis; interruptis, alis nigris punctis albis.

Hab. in Europa.

Obs. Differt ab A. *interrupta* *D. Fab.* licet sub eodem nomine triviali, inde nomen Gallicum mutatum. V.

Ex nost. Mus.

Elongata. 86. A. (l'alongée) nigra, segmentis abdominis albo marginatis, albedine sinuata.

Hab. in Europa. Frequens in Bressia.

Desc. Singularis apis. *Corpus* elongatissimum, nigrum, valde angustatum, primo intuitu sphex esset, sed lingua apis. *Antennæ* nigræ. *Maxillæ* flavescentes. *Thorax* niger, longus, lineolis

flavis, vix sine lente conspicuis, in parte antica. *Abdomen* nigrum. Omnia segmenta albo marginata. *Alæ* flavescentes, in uno sexu longiores. *Anus* duobus appendicibus.

Gallica. 87. A. (la Françoise) nigra, fronte argentea, abdomine quinque fasciis flavis, pedibus flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Inter magnas numeranda. *Antennæ* breves, nigræ. *Clypeus* maxillæque flava. *Frons* argentea. *Thorax* niger, antice linea flava, postice duabus in regione scutelli latioribus. *Abdomen* nigrum, sed flavum adparet latitudine fasciarum flavarum. *Pedes* flavi. *Subtus* concolor, apice fusco. *Mas.*

Cærulea. 88. A. (la bleue) cærulea, alis violaceofuscis. t. 8. f. 25.

Hab. in Europa.

Desc. Tota cærulea. *Clypeus* flavus. *Thorax* cæruleo-nigricans. *Alæ* obscuræ violaceo nitentes. *Tarsi* pallidi.

Purpuraf- 89. A. (la pourprée) violacea purpureo
cens. micans, alis diaphanis.

Hab. in Europa.

Desc. Præcedenti minor. *Clypeus* luteus. *Antennæ* fuscae, breves. *Abdomen* violaceo-purpurascens. *Pedes* fusci.

Quadrifaf- 90. A. (la quadrifasciée) nigra, thorace
ciata. rufo, incisuris abdominis postice albidis.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Ape mellifica crassior. *Thorax* rufus. *Abdomen* nigrum, incisuris postice pilis tenuioribus albidis dense tectis; inde fasciæ albidæ. *Pedus* subtus album.

Pedes hirsuti, sed posteriores hirsutissimi s. lana albida tecti.

Fulvipes. 91. A. (la fulvipede) fronte alba, pilis fuscis, pedibus fulvis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. *Mus. D. Blain.*

Desc. Statura & facies ap^{is} *Florentinae*. *Antennae* basi ad medium fulvae, a medio ad apicem nigrae. *Caput* nigrum, fronte alba. *Thorax* niger, pilis aureis lateralibus. *Abdomen* nigrum, primo segmento nigro, fulvo marginatum. *Maculae* duae fulvae in singulis aliis segmentis. *Anus* quinque dentatus. *Pedes* omnes fulvi. *Femora* antica basi nigro lineata.

Fuscescens. 92. A. (la brunette) nigra, abdomine fuscescente.

Hab. in Europa.

Desc. Parva. *Alae* amplae, diaphanae. *Thorax* niger. *Abdomen* fuscescens. *Pedes* abdomini concolores.

Lunulata. 93. A. (la Turque) nigra, abdomine quatuor lunulis fasciisque sex flavis.
t. 8. f. 26.

Hab. in Gallia. Prope Massiliam capta.

Desc. Magna, vespae simillima. *Caput* postice nigrum; antice flavescens. *Antennae* nigrae, in infima parte flavae. *Thorax* niger, antice linea flava, postice macula flava punctisque duobus flavis. *Abdomen* nigrum. *Maculae* flavae lunares in primo secundoque segmento: fascia flava interrupta in tertio: reliqua, luteo minime interrupto, fasciata. *Alae* lutescentes. *Pedes* flavi. Halteres nigri.

* *Bombinatrices*

* *Bombinatrices hirsutissimæ.*

Violacea. 94. A. (la violette) hirsuta atra , alis
cærulescentibus. *

Scop. carn. 812.

Pet. gaz. 1. t. 12. f. 5. bombylius lusi-
tanicus e nigro cærulescens.

Reaum. inf. 6. t. 5. f. 1, 2.

Geoff. parif. 2. p. 416. n. 19.

Fab. 2.

De Geer tom. 3. p. 576. t. 28. f. 15 ?

Enum. n. 796.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 11. 12. 4.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 416.

Hab. in truncis exsiccatis Europæ Aus-
tralis , quos perforat , longitudinaliter
excavat . ibique plures nidos a fundo
incipiens polline herbarum melle mixto
replet & unicuique ovum concredit. Nidī
distinguntur 4, l. 5. annulis ligneis.
Nymphæ caput deorsum spectat , ut in
fundo exitum quærat apis perfecta.

Desc. Caput supra glabrum. Puncta 3 in
vertice. Antennæ thorace breviores ,
articulo infimo elongato. Thorax ater ,
supra glaber. Alæ atro-cærulescentes.
Abdomen hirtum , supra glabrum ;
atrum. M. L. U. 415.

Terrestris. 95. A. (la terrestre) hirsuta nigra , tho-
racis cingulo flavo , ano albo. *

Scop. carn. 815. *Scop. Ann: 4. p. 11. n. 3.*

Mouff. inf. 52.

Gad. inf. 2. t. 46.

Lit. Gad. 105.

Reaum. inf. 6. t. 3. f. 1.

Bradt. natur. t. 26. f. 1. D.

Raj. inf. 247. n. 5.

Frisch. inf. 9. t. 13. f. 1.

Sulz. inf. t. 19. f. 124.

Fab. 5.

Schæff. elem. t. 20. f. 6.

—— *icon.* t. 69. f. 7.

Faun. Fridr. n. 648.

Enum. n. 796.

Müll. Lin. Nat. cl. IV. p. II. n. 3.

Geoff. tom. 2. p. 418. n. 24.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 10. n. 3.

Hab. in Europæ terra sub qua profunde nidum ponit.

Desc. Inter bombylios dictos hæc maxima est. Totum corpus undique hirsutum & nigrum. Abdomen antice nigrum, dein flavum, medio nigrum, postice album. Thorax antice flavo colore cingitur.

Faun. 1709.

Obs. Variat magnitudine, quadruplo minor. V.

Hortorum. 96. A. (des jardins) hirsuta nigra, thorace abdomineque antice flavo, ano albo. *

Fab. 15.

Faun. Fridr. n. 648.

Enum. n. 797.

Scop. carn. 815. 817.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 10. n. 2.

Geoff. tom. 2. p. 419. n. 26.

Hab. in Europa.

Desc. Simillima præcedenti a qua differt fascia abdominis flava basin abdominis occupante, nec utrinque nigra fascia distincta. *Faun.* 1710.

Obs. Affinis A. hortorum, at triplo minor
Fab. hoc posito, apis hirsuta hortorum
a D. *Fab.* descripta, nostris multo minor. V.

Pratorum. 97. A. (des prés) hirsuta nigra, thorace antice flavo, ano rubro. *

Scop. 818.

Enum. n. 798.

Faun. Fridr. n. 650.

Geoff. tom. 2. p. 417. *n.* 22.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 904.

Fab. 16.

Hab. in Europa. In Daniæ nemoribus. Fab.

In Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. Corpus nigricans. Thorax antice sulphureus. Abdomen ano rubro.

Faun. 1711.

Obs. Sub nomine apis pratorum alia indicatur in spec. *D. Fab.*

Lapidaria. 98. A. (des pierres) hirsuta atra , ano fulvo. *

Scop. carn. 813.

Frisch. inf. 9. p. 25. *n.* 2.

Reaum. inf. 6. t. 1. f. 1.-4.

Fab. 17.

Geoff. tom. 2. p. 417. *n.* 21.

Schæff. icon. t. 69. *f.* 9.

Enum. n. 799.

Scop. ann. hist. nat. IV. p. 10. *n.* 1.

Pod. gr. p. 110.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 904.

Faun. Fridr. n. 651.

Hab. in acervis Lapidum , strenue mellificans.

Desc. Tota atra est , excepto apice abdominis tribus incisuris rufo-fulvis.

Faun. 1712.

Obs. Varietas triplo minor , vix distincta.

Fab.

Sylvarum. 99. A. (des forêts) hirsuta pallida , thoracis fascia nigra , ano rubro. *

Scop. carn. 822.

Fab. 18. hirsuta pallida , thoracis fascia abdomineque posticis rufis , ano rufo.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. sylvis. V.

Desc. Simillima sequenti, sed vellere pallido. *Thorax* fascia nigra inter alas. *Abdomen* pallidum, interlucente nigredine corporis tanquam obscuris fasciis. Anus ruber. *Faun.* 1713.

Muscorum. 100. A. (de la mouffe) hirsuta fulva, abdomine flavo. *

Frisch. inf. 9. p. 26. n. 8.

Reaum. inf. 6. t. 2. f. 3, 4.

Fab. 20.

Raj. inf. 246. 3.

Schæff. icon. t. 69. f. 3.

Faun. Fridr. n. 652.

Geoff. inf. tom. 2. p. 419. n. 28.

Enum. n. 801.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 905.

Hab. sub musco terrestri.

Desc. *Thorax* fulvus. *Abdomen* luteum f. pallidius fulvum, ano concolore. *Faun.* 1714.

Hypnorum. 101. A. (des hypnes) hirsuta fulva, abdominis fascia nigra, ano albo. *

Scop. carn. 820.

Reaum. inf. 6. t. 4. f. 1.

Fab. 21.

Faun. Fridr. n. 653.

Geoff. tom. 2. p. 418. n. 25?

Hab. sub muscis.

Desc. *Thorax* fulvus. *Abdomen* nigrum, basi fulvum, ano albo. *Faun.* 1715.

Lucorum. 102. A. (des taillis) hirsuta flava, ano albido. *

Fab. 24.

Schæff. icon. t. 78. f. 5.

Faun. Fridr. n. 654.

Hab. in Europa. In Galliæ umbraticis. V.

Desc. Media. *Corpus* totum flavescens,

ano albido. In abdomine translucet nigredo corporis quasi obsoletis fasciis.
Faun. 1716.

Acervorum. 103. A. (des monceaux) hirsuta atra, *
Fab. 25. hirsuta atra, tibiis posticis ferrugineis.
Schæff. icon. t. 78. f. 5.
Enum. n. 802.
Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 906.
Hab. sub terra.
Desc. Præcedenti similis, sed minor: toto corpore nigro immaculato, exceptis setulis quibusdam circa collum sulphureis. *Faun.* 1717.

Subterranea. 104. A. (la gnome) hirsuta atra, ano fusco. *
Raj. inf. 246. n. 1.
Geoff. paris. 2. p. 416. n. 20.
Fab. 26.
Hab. sub terra.
Desc. Præcedenti similis, solo apice abdominis minus nigro. *Faun.* 1718.

Alpina. 105. A. (l'Alpine) hirsuta, thorace nigro, abdomine luteo.
Hab. in Laponiæ Alpibus.
Desc. Magnitudine ad scarabæum *cervum* accedit. *Tota* hirsuta atra, excepto abdomine toto luteo seu ferrugineo solaque abdominis basi nigra. *Faun.* 1719.

Ex spec. Mantiss. que D. Fab.

Cryptarum. 106. A. (des cavernes) hirsuta nigra, abdominis fascia flava, ano albo.
Hab. Hafniæ. *D. Mohr.*
Desc. Statura & magnitudo *A. terrestris.*

Caput & thorax nigra, immaculata.
Abdomen fascia flava anoque albo.
Pedes nigri, apice fusci.

Ruderata. 107. A. (des graviers) hirsuta atra, thorace flavo, fascia atra, abdomine antice flavo, ano albo.

Hab. Hafniæ. *D. Mohr.* In Madera. *Mus.*
D. Banks. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura omnino præcedentis. *Caput* atrum. *Thorax* flavus, fascia media atra. *Abdomen* antice flavum, in medio nigrum, ano albo. *Pedes* nigri.

Nemorum. 108. A. (la sauvage) hirsuta atra, thorace fascia interrupta flava, ano pallido.

Hab. Hafniæ. *D. Mohr.*

Desc. Statura A. *terrestris*, atra. *Thorax* fascia antica, in medio interrupta, flava. *Abdomen* nigrum, ano pallidiore.

Soroeensis. 109. A. (la Danoise) hirsuta atra, ano albo.

Hab. in fylvis Soroeensibus. *D. de Slangbush*

Desc. Tota atra, solo ano albo.

Sibiriça. 110. A. (la Sibérienne) hirsuta flava, thoracis fascia anoque fulvis.

Hab. in Sibiria. *Dr. Pallas. Mus. D. Banks.*

Desc. *Caput* uti totum corpus atrum. *Thorax* flavo hirtus, fascia fulva inter alas. *Abdomen* flavo hirtum, ano fulvo.

Pratorum. 111. A. (des prairies) hirsuta flava, thorace fascia nigra.

Pallas iter. I. 474. 75.

Hab. in Dania nemoribus. In Sibiria *Pallas.*

Desc. Color totus flavus, excepta fascia nigra inter alas. *Pedes* nigri.

Obs. Fœminæ odore roseo fragrantissimæ.
Pallas.

Mniorum. 112. A. (des mnies) hirsuta atra, scutello abdomineque pallescentibus.

Hab. Kiloniæ. *D. de Schefted.*

Desc. Caput & thorax hirta, atra, im-maculata. Scutelli regio uti & abdomen pilis pallidis tecta. Anus rufescens. Pedes nigri.

Senilis. 113. A (la vieille) hirsuta cinerea.

Hab. in Daniæ nemoribus. In Bressiæ sylvis. V.

Desc. Tota pilis cinereis tecta.

Seminuda. 114. A. (la femi-velue) thorace hirtro atro, antice flavo, abdomine nudo atro, fascia interrupta hirta.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. Media. Caput vix pubescens, atrum. Thorax valde hirtus ater, antice fascia flava. Abdomen ovatum, atrum, nitidum in medio fascia interrupta hirta. Pedes nigri.

Hirsuta. 115. A. (la hériffée) ferrugineo-hirta, pedibus posticis elongatis, apice hirsutissimis. *Mantiss.* ibid.

Hab. in Hispaniæ floribus. *D. Vahl.*

Desc. Antennæ piceæ basi nigræ. Caput, thorax, abdomen pilis densis, cinereo-ferrugineis tecta. Abdomen subtus glabrum, atrum. Pedes hirsuti, postici elongati, femoribus incurvis, nigris, villosis, tibiis tarsisque rufo-hirsutissimis.

Hispanica. 116. A. (l'Espagnole) hirsuta flavescens, abdomine apice nigro, pedibus intermediis fasciculato-pilosis. *Mantiss.* ibid.

Hab. in Hispania. D. Vahl.

Desc. Magna, statura *A. virginicæ*. *Antennæ* nigræ. *Labium* flavum. *Thorax* hirtus, flavescens, immaculatus. *Abdomen* hirtum, basi flavescens, apice nigrum. *Pedes* nigri, intermediis fasciculato pilosis.

Agrorum. 117. A. (des champs) hirsuta atra, thorace toto anoque ferrugineis. Mant. ibid.

Hab. in Europæ floribus. In Gallia Aust. V.

Desc. Magna atra, valde hirta. *Thorax* ferrugineus. *Abdomen* atrum, anoque ferrugineo.

Ex Enum.

Agrorum. 118. A. (la campagnarde) hirsuta nigra, thorace cano, cingulo nigro, abdomine toto ferrugineo, basi cano.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra. *Caput* & fere *pedes* paribus anticis glabronitentis nigredinis. *Thorax* hirsutus canus, canitie cingulo nigro divisa. *Abdomen* hirsutum fulvum, basi, seu primo segmento canum, subtus glabrum, nigrum.

Rufa. 119. A. (la rousse) hirsuta nigra, thorace abdominisque apice rufo.

Scop. 816.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Mus. D. Blain. V.

Desc. Nigra tota. *Frons* lutescente villo pubescit. *Thorax* hirsutus, fulvus ad pectus latera villo albido tegitur. *Abdomen* minus hirsutum, versus apicem rufo villo pubescit. *Alæ* fuscæ.

Fulva. 120. A. (la fauve) hirsuta nigra , thorace abdomineque fulvis.

Hab. in Europa.

Desc. Thorax & abdomen eleganter fulva. Reliquæ partes omnes , pectore etiam & abdomine fubtus nigris , alis non coloratis.

Bicolor. 121. A. (la bicolor) hirsuta nigra , abdomine fulvo.

Geoff. inf. tom. 2. p. 419. n. 27.

An Apis Alpina. Linn.?

Hab. in Europa.

Desc. Tota nigra hirsuta , villo tamen rariusculo. Abdomen villo densiori fulvo hirsutum.

Sylvarum. 122. A. (des forêts) hirsuta pallida ; thoracis fascia nigra , abdominis basi nigro.

Hab. in sylvis , carduo delectatur.

Desc. Nigra. Forma & fere pictura apis terrestris , sed minus hirsuta. Caput atrum. Thorax basi flavo villo , inter alas nigro & apice iterum pallide flavo villosus. Abdominis basi intima pallide flavo villo tegitur , postea fascia nigra , quæ totam basin supra occupat. A medio ad apicem villus pallide flavus ; in toto tamen abdomine color niger nitens abdominis transluçet. Alæ apice paullo obscuriores.

Ex Entom. Scop.

Argillacea. 123. A. (l'architecte) hirsuta nigra , thorace rufo , fascia nigra.

Hab. in Sylvestribus , imo & circa domos , favos fluens cretaceos. In Galliæ Aust. montibus. V.

Desc. Magna nigra. *Thorax* antice pallide rufus, in medio niger, postice albido-rufus. *Abdomen* nigrum. *Alæ* obscuræ. *Subtus* tota nigra. *Femora* & *tibiæ* incrassata, compressa, hirsutissima, nigra adparent, sed rufa. V.

Pascuorum. 124. A. (des pâturages) hirsuta rufa, antennis pedibusque nigris.

Hab. in Europæ herbidis sterilibus. In Gallia Aust. *Mus. D. Blain.* V.

Desc. *Thorax* & *abdomen* rufo-tomentosa ut & *frons*. *Alæ* apice paullo obscuriores; sed *subtus thorax* albido pilo tomentosus. *Abdomen* vero nigrum.

Obs. Nostra differt magnitudine. *Abdomen* rufo-villosum, ano nigro ut in ape *Americanorum.* V.

Nemorum. 125. A. (des bois) hirsuta, thorace albido, fascia media nigra, abdomine segmento 1 fusco, 2 fusco-ferrugineo, 3 nigro, cæteris flavescentibus.

Hab. in Europæ nemoribus.

Desc. Minor si non minima. *Alæ* apice obscuriores. *Pedes* nigri.

Collium. 126. A. (des collines) hirsuta pallida; thorace rufo, abdomine pallidis villis tomentoso.

Hab. in Europæ collibus. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* nigrae. *Tota* supra hirsutissima. *Alæ* diaphanæ. *Abdomen* infra nigrum. *Rostrum* abdominis longitudinem æquans aut superans. V.

Ex nost. Mus.

Frontalis. 127. A. (la frontale) hirsuta, fronte

hirsutissima, antennis longis, abdomine pilis rufis vestito. *t.* 8. *f.* 28.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Affinis *A. longicornis*, sed minor & hirsuta. Fasciculus pilosus albus in fronte. *Antennæ* nigræ, corpore paullo minores. *Thorax* hirsutissimus, vellere griseo vel albido-griseo. *Abdomen* hirsutum, vellere rufo. *Pedes* nigri, femoribus latere uno pilis albis longis vestitis.

Brachiptera. 128. *A.* (la brachiptere) hirsuta nigra, alis fuscis, margine inferiori diaphanis, thorace antice tibiisque fulvis. *t.* 8. *f.* 29.

Hab. in Europa. In Gallia Australiore.

Desc. Omnium maxima. *Caput*, *antennæ*, *maxillæ* magnæ, *thorax* postice, *abdomen* antice, hæc omnia atra. *Thorax* antice pilis fulvis. *Abdominis* segmenta tria ultima pilis aureis supra ciliata. *Pedes* anteriores aliis breviores. *Alæ* fuscae, abdominis longitudinem nomine æquant. *Lingua* fusca, apice conica. Volans valde susurrat.



G E N U S X.

FORMICA *Squamula* erecta, thoraci abdominique interjecta.

Aculeus fœminis & neutris reconditus.

Alæ maribus & fœminis ; sed neutris nullæ.

Herculeana. 1. F. (l'Hercule) nigra, abdomine ovato, femoribus ferrugineis. *

Scop. carn. 832.

Faun. suec. 1. n. 1019. Formica magna.

It. Gotl. 232. Formica magna. Hippomyrmex.

Raj. inf. 68. Formica maxima.

Fab. 1.

Enum. n. 832.

Faun. Fridr. n. 655.

Hab. in Europæ truncis putridis vagabunda. In America Septentrionali.

Kalm. In Gallia. V.

Desc. Caput nigricans ; in occipite puncta tria. Thorax ferrugineus, ad tergum nigricans. Pedes ferrugini. Squama integerrima ovata, integra, acutotundata. Abdomen fuscum, constans 5 segmentis. *Faun.* 1720.

Rufa. 2. F. (la rousse) thorace compresso, toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *

Formicæ vivunt in societate, indefesse corrodunt quisquillas & in ærarium societatis congerunt; at peblecula hæc spadonum sub nuptiis inservit novis nuptiis, & peradis puerperiis expellit parentes, retentis liberis pro conservatione familiæ. Pelluntur rejeclaneis piscium retibusque his immersis circumligatis arborum truncis.

Scop. carn. 836.

Faun. suec. 1020. *Formica rufa.*

Schæff. inf. t. 5. f. 3. & elem. t. 64.

Raj. inf. 69. *Formica media rubra.*

Geoff. inf. t. 2. p. 428.

Fab. 6. nigra, thorace compresso pedibusque ferrugineis.

De Geer. inf. tom. 2. p. 1053. t. 41. f. 1.-22.-t. 42. f. 1.-11. Ferruginea, capite abdomineque brunneis squamaque petiolari.

Enum. n. 834.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 912.

Faun. Fridr. n. 656.

Hab. in Europæ acervis acerosis sylvaticis, pungens; in America septentrionali. Kalm. Magna formica laboris ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo. Horat. Angustum formica terens iter. Virg. Ascendit arborem, ut aphides illius vaccas mulgeat nec occidat.

Desc. Corpus fuscum. Thorax ferrugineus, compressus. Pedes ferruginei. Squama interregima ferruginea, acuminata.

Mas. Corpus nigricans. Abdomen segmentis sex. Pedes ferruginei.

Fœmina. Corpus nigricans. Caput subtus ferrugineum. Thorax ferrugineus, dorso fusco. Abdomen segmentis quatuor, primo antice ferrugineo. Faun. 1721.

Obs. Ova prooscinibus expetuntur. Colligit resinam juniperi, suffumigationi aptam. Officinalis species. Skeleta elegantissima parat, si animalia minora, v. g. ranæ, lacertæ, occisa, ac scatulis ligneis, exiguis foraminibus pertusis inclusa his acervis injiciantur. Enum.

Fusca. 3. F. (la brune) cinereo - fusca , tibiis pallidis. *

Faun. suec. I. n. 1021. Formica fusca.

Raj. inf. 69. Formica media , nigro colore splendens.

Fab. 9. nigra , ore , thoracis apice pedibusque ferrugineis.

Enum. n. 833.

De Geer tom. 2. p. 1082 t. 42. nigra nitida , squama petiolari.

Geoff. inf. t. 2. p. 428. n. 5.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 912.

Hab. in Europæ terra fabulosa. Ascendit arbores. In ejus acervis hab. scarabæi aurati larva. V.

Desc. Corpus cinereo-fuscum , pilis cinerascens minutissimis vestitum , unde certo modo ad lucem visum , videtur nigrum , alias cinereum. *Caput* fere thorace angustius. *Thorax* teretiusculus. *Squama integerrima* , quadrato-emarginata. *Antennæ* infimo articulo longissimo rufo. *Femora* fusca. *Tibiæ* pallidæ. *P. Forskæhl. Faun. 1722.*

Obs. Harum formicarum acervi ubique in sylvis obvii. In his acervis formicæ operariæ apteræ , fœminæ & mares. Nymphæ ut ova falso a rusticis considerantur. V.

Nigra. 4. F. (la noire) tota nigra nitida , tibiis cinerascens.

Scop. carn. 834.

Faun. suec. I. n. 1023.

Raj. inf. 69. Formica minor , e fusco nigricans.

Fab. 8. nigra nitida , ano piceo.

De Geer tom. 2. p. 1085. t. 42. f. 16.-23. nigra , pedibus dimidioque antenarum fusco-flavescentibus , petiolo abdominis squamifero.

Enum. n. 832.

Geoff. inf. t. 2. *p.* 429.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 913.

Swamm. bibl. nat. t. 16. *f.* I.-II.

Faun. Fridr. n. 657.

Hab. in Europæ terra.

Desc. Minor. Nigra. Pars antennarum infima lutescente - fusca. In capite stemmata nulla. V.

Obsoleta. 5. F. (la passée) supra nigra, subtus testaceo-rufa, abdomine subglobofo. *

Fab. II.

Enum. n. 838.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 913.

Hab. in Europæ terra. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput vix thoracis crassitie. Thorax teretiusculus. Squama interregima humilis, truncata. Abdomen ovatum, acuminatum, longitudine thoracis, pilis rufescentibus minimis. Tibiæ & plantæ cinerascens. Corpus cæterum nigro-nitidum. Abdomen huic tantum longitudine thoracis; in formica fusca abdomen longitudine thoracis cum capite. P. Forskæhl. Faun. 1724.

Rubra. 6. F. (la rouge) testacea, oculis punctoque sub abdomine nigris. *

Faun. suec. I. n. 1022. *Formica rubra.*

Raj. inf. 69. Formica minima rubra.

Fab. 10.

De Geer tom. 2. p. 1093. *t.* 43. *f.* I.-14. rufo-flava, aculeata, thorace bispinoso.

Faun. Fridr. n. 658.

Enum. n. 837.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 914.

Hab. in Europæ tuberibus graminosis; pessima nostratum pungit. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput thorace latius, testaceum. *Antennæ* testaceæ. *Thorax* pallidus, parum compressus. *Abdomen* ovato-oblongum, pilis albicantibus; punctum nigrum sub abdomine. *Faun.* 1725.

Cæspitum. 7. F. (des gazons) abdominis petiolo binodi, priore subtus, thoraceque supra bidentato.

Faun. suec. 1726. * *Formica* petiolo nodis duobus alternis, posteriore majore.

Amæn. acad. 6. p. 413. n. 54. * *Formica binodis* nigra, abdomine glaberrimo, segmentis duobus primis subglobosis.

Scop. carn. 837.

Ad. Berol. vol. 5.

Hamb. Magaz. vol. 5. p. 393.

Fab. 21. nigra, abdominis petiolo binodi, scutello bidentato.

De Geer t. 2. p. 1105. t. 43. f. 15.-22: rufo-fusca, capite thoraceque fuscis, aculeata, thorace bispinoso.

Enum. n. 836.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 837.

Hab. in terra sub muscis, in pratis scioribus Europæ; mares sæminæque examinant medio Augusti, meridiæ calido, more Phryganearum in aere choreas agentes turba volatili, depluentes per paria jundæ.

Corpus ferrugineo-fuscum, magnitudine F. nigræ. Scutelli loco dentes 2 distantes. Abdomen ovatum, petiolo articulis 2 subrotundis, priore subtus dentibus 2. Pedes testacei. Alæ hyalinæ asque stigmate; non pungit.

Obs. 1. In Suecia formicarum quinque species reperiuntur, inquit celeb:

Formicæ Indiæ summa calamitas; consumuntur a *Myrmecophagis*.

Lin.

Linn. Herculeana vagabunda videtur;
reipſa Gregaria. Inermis.

Obſ. 2. Rufa. Acervos conicos conf-
truit. Fatigata, liquorem acidum
ejicit: *hic liquor phosphoricus*. V.
Inermis. Colligit refinam ſuffumigationi
aptam.

Obſ. 3. Fuſca ſub terrâ laborat, Horti-
colis infeſta, inermis.

Obſ. 4. Rubra. Sub terra vivit, pungit.

Obſ. 5. Sub terra. *Inermis. Act. acad. de*
Suede. 1741. p. 37.

4-Punctata. 8. F. (la ponctuée) rubra abdomine ni-
gro, punctis quatuor albis. *Linn.*
Mantiff.

Fab. 12. thorace compreſſo, ferrugineo;
abdomine atro, punctis quatuor niveis.

Hab. in Alſatia.

Deſc. Caput globofum, atrum, *antennis*
ferrugineis. *Squamâ* petiolaris, brevis;
obtufa. *Abdomen* atrum, nitidum;
primo ſecundoque ſegmento utrinque
puncto albo. *Pedes* ferruginei, femo-
ribus nigris.

Ex Inſt. parif. Entom. quæ parif.

Fuſcoptera. 9. F. (la bedeaude) nigra, alarum di-
midio fuſco.

Hab. in Europæ ſylvis: In Gallia.

Deſc. Nigra, lævis. *Alæ* abdomine lon-
giores, in parte ſuperiori brunneæ;
in parte infima albæ.

Flavipes. 10. F. (la flavipede) nigra, *antennis*
pedibusque flavis. t. 8. f. 31.

Hab. in hortis.

Deſc. Nigra. *Alæ* albæ. *Antennæ* pedes-
que lutei. V.

Ex oper. D. de Geer.

Pratenfis. 11. F. (des prés) rufa , capite abdomine-
que nigris , petiolo abdominis squami-
fero. *Retz.* 325. — *De Geer tom. 2. p. 1030.*
t. 42. f. 12. — 15.

*Hab. in pratis ubi acervos ædificant , per
anum ejiciunt liquorem acidum. An
species? An form. rufæ varietas?
Acervi aliter conftructi.*

Flava. 12. F. (la jaune) flava petiolo abdominis
squamifero. *Retz.* 328. — *De Geer tom. 2.*
p. 1089. t. 42. f. 24. — 28.

*Fab. 20. flava , abdomine ovato pu-
bescente.*

*Hab. in Europa , sub lapidibus. In Gallia
Aust. V.*

*Desc. Parva. Tota ochracea. Oculi nigri.
Stemmata nulla. Caput magnum postice
dilatatum. Thorax elevatus , partibus
inæqualibus compositus. Petiolus bre-
vissimus , squamifer. V.*

Ex spec. D. Fab.

Didyma. 13. F. (la doublée) nigra , abdomine
cinerascens , squama petiolari didyma.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

*Desc. Statura. F. rufæ. Caput nigrum ,
antennis piceis. Thorax gibbus , niger ,
immaculatus. Abdomen ovatum , pube
cinerea nitidum. Squama petiolata ,
ovata vel potius emarginata. Pedes
nigri , tibiis piceis.*

Pubescens. 14. F. (la velue) atra , abdomine pu-
bescente. *t. 8. f. 32.*

Hab. in Hungaria. Mus. Tottianum.

Desc. Statura. F. rufæ. Totum corpus

atrum, immaculatum. *Abdomen* pilis cinerascens pubescit.

Tuberum. 15. F. (la nouée) rufa, capite abdominisque fascia nigris, petiolo binodi.

Hab. in Suecia.

Desc. F. *cespitum* minor. *Antennæ* rufæ, apice nigræ. *Thorax* ferrugineus, postice bidentatus.

Viatica. 16. F. (des chemins) ferruginea, abdomine ovato nigro. *Mantiss.* p. 308.

Hab. in Hispaniæ viis velocissime cursitans. *D. Vahl.*

Desc. Media. *Caput* magnum cum antennis ferrugineum, maxillis apice nigricantibus. *Thorax* compressus, ferrugineus, immaculatus, petiolo nodo unico. *Abdomen* glabrum, atrum, immaculatum. *Pedes* ferruginei, postice elongati, tibiis fuscis.

Ex Ent. D. Scop.

Vaga. 17. F. (la vagabonde) nigra, abdomine ovato, piloso.

Hab. in putridis arboribus & sub cariosis corticibus, lignum omne meatibus multifariam partitis perterebrans.

Desc. Puncta aut foveæ in capite nullæ. *Thorax* postice in singulo latere duo parva tubercula gerit. *Abdomen* pilosum.



GENUS XI.

MUTILLA. *Alæ nullæ in plerisque.*

Corpus pubescens.

Thorax postice retusus.

Aculeus reconditus, punctorius.

Europæa. I. M. (l'Européenne) nigra, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *

Uddm. diff. 98. t. 17. Apis aptera.

Fab. 7. nigra, thorace rufo, abdominis segmentis margine albis.

Sulz. inf. t. 27. f. 23, 24.

Enum. n. 839.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo vespæ cribrariæ. Caput & antennæ nigræ thorace breviores.

Thorax rufus, antice niger. *Abdomen* nigrum, hirtum, fasciis tribus albis, quarum duæ posteriores interruptæ.

Pedes nigri. *Faun.* 1727.

Obs. 1. *Mas* *Fæminæ* fere similis. *Antennæ* paullo longiores, nigræ. *Thorax* in medio posticeque ruber. *Alæ* fuscæ, apice fuscissimæ. *Anticæ* puncto marginali ovato pallido. In terra capta a Domina Blain. V.

Obs. 2. Variat certe hæc mutilla. In desc. DD. Linn. & *Fab.* *Thorax* antice niger vel nigricat: in *Enum.* *thorax* ruber: insuper duæ posteriores fasciæ interruptæ sunt, quæ in nostris

Mutillæ species raræ occurrunt & plerumque apteræ: nec ultra ira specimina alata nobis visa; harum domicilia & vivendi modus etiamnum late.

contiguæ; attamen eadem est. *Thorax* igitur vel totus ruber vel antice nigricans. V.

Maura. 2. M. (la Maure) nigra, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo.

Fab. 10.

Hab. in Mauritania. E. Brander. In Germania. D. Schreber. In Europa Australiori *Fab.* In Gallia Aust. V.

Desc. F. atrata minor, tota nigra, sed maculæ supra abdomen albæ; una parva ad basin; una ad apicem; duæ paullo majores ad latera in medio abdominis paria.

Acarorum. 3. M. (des tiques) glabra rufa, capite abdomineque postico nigris. *

Fab. ichn. 128.

De Geer tom. 2. p. 907. t. 31. f. 19.-21.

ichn. nigricornis, ferrugineus, apterus, capite, ano antennisque nigris.

Enum. n. 840.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 921.

Hab. Inter acaros quibus victitat. In curculionum larvis. V.

Hæc differt a reliquis, quod glabra nec tomentosa sit, & videtur potius sphex aptera esse; segmentum 1 & 2, abdominis rufa, reliqua nigra.

Desc. Parva. *Antennæ* nigræ, longitudine fere corporis. *Caput* nigrum. *Thorax* niger. *Abdomen* nigrum, segmento primo ferrugineo. *Pedes* ferruginei, tibiis posticis nigris. *Famina* immillima, aculeo exserto abdomine brevior. *Faun.* 1729.

Obs. Marem alatum esse suspicatur. D. de Geer. sed utrumque sexum vidit

Linn. ut ex descriptione patet. In
plerisque igitur *alæ* nullæ. V.

Formicaria. 4. M. (la fourmi) glabra rufa , capite
abdomineque rubescente nigris.

Fab. ichn. 130. apterus rufus , capite
abdomineque nigris.

Hab. in Europa. *D. C. Solander.* In
Succiæ hortis. *Fab.* In Gallia Aust. V.

Præcedenti duplo major. Abdomen totum
nigrum & parum villosum. Ichneumon
apterus potius dicenda.

Obs. Ad ichneumones forsan hæc duæ
referendæ. V.

Ex D. Fab. Mantiss. tom. 1.

Halenfis. 5. M. (de Hall) hirta nigra , thorace
rufo , abdomine punctis duobus fascia-
que postica albis.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Desc. Duplo minor. mut. *Europea.* Caput
atrum , immaculatum. *Thorax* rufus ,
immaculatus. *Abdomen* atrum , punctis
duobus & pone hæc fascia alba. *Pedes*
nigri , *tibiis* basi rufis.

Arenaria. 6. M. (des sablonnières) hirta nigra ,
fronte , thoracis dorso abdominisque
maculis quatuor albis. *Mantiss.* ibid.

Hab. in Hispaniæ arena mobili. *D. Vahl.*

Desc. Caput nigrum , macula magna fron-
tali alba. *Thorax* hirtus , niger , ma-
cula magna dorsali alba. *Abdomen*
atrum , maculis quatuor albis 1, 2, 1
basios & apicis minoribus. *Pedes*
nigri.

Rufipes. 7. M. (la rufipede) hirta nigra , an-
tennis thoraceque rufis , abdomine

puncto faciliſque duabus approximatis
albis. *Mantiff.* ibid.

Hab. Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

Deſc. Parva. *Caput* nigrum, antennis
rufis. *Thorax* rufus, immaculatus. *Ab-*
domen atrum, puncto magno baſeos
faſciſque duabus valde approximatis
albis. *Pedes* rufi.

Ex noſt. Muſ.

Argentata. 8. M. (l'argentée) nigra, thorace me-
dioque abdominis pilis argenteis. t. 8.
f. 39.

Hab. in Europa. In Gallia Auſt. circa
Nemaufum.

Deſc. Inter maximas hujus generis
mihi cognitæ certat. *Thorax* pilofus,
vellere argenteo, uti abdominis *pe-*
tiolus. Segmentum ſecundum atrum,
margine posteriore pilis argenteis
cincto; faſcia in medio protenſa in
nigredine pediculum argenteum ejicit;
idem ſegmentum in parte anteriore
pilofum; inde exſurgit faſcia lata ar-
gentea. *Anus* inermis.

Calva. 9. M. (la chauve) occipite thoraceque
rubris. t. 8. f. 34.

Hab. in Europa. Prope Maſſiliam capta.

Deſc. Mutil. *Europeæ* valde affinis, ſed
caput poſtice rubrum, *antennæ* *palmæ-*
que rufæ.

Obſ. Inter ichneumones hoc genus re-
duxit *D. de Geer.* conſervarunt. *DD.*
Fab. & Schrank in *Enum.* ſed cum
hac nota; *mutillæ* genus fortasſe totum
delendum; dantur enim certe ichneu-
mones apteri, quales poſtremæ duæ
ſpecies *mutillæ* (*acarorum* & *melano-*

cephala ; alios apud cl. *Geoffroy* videre licet ; reliquæ vero mutillæ species recte forte ad alia genera amandantur. Certe characteres quos illustr. *Linnaeus* mutillæ adscripsit, tanti non sunt, qui genus constituere proprium videantur. Præsentia defectusve alarum nec species in aphidibus & formicis nec sexum proprie, sed ætates distinguit. *Corpus* pubescens in sphægibus apibusque occurrit ; & mutilla *acarorum* glabra utique est. *Aculeus* punctiorius reconditus in sphægibus, vespis, apibus est. *Thorax* pollice retusus solus genus constituat ?


Similibus rationibus mutillas inter ichneumones ordinavit *D. de Geer*. Quædam mutillæ, fateor, ad ichneumones pertinere videntur ; sed dantur aliquæ quarum structura faciesque propria ab hoc genere recedunt. Nec ob pilos nec ob alarum defectum nec ob aculeum reconditum ex. gr. mutilla *Europæa*, *calva*, *argentata* ab ichneumonibus certe differunt. In Syst. *D. Fab.* genus proprium constituunt & optimo jure.

Melanoce- 10. M. (la Mélanocéphale) mutila rufa ;
phala. capite abdominisque cingulo nigris.

Hab. in Europa.

Desc. *Caput* atrum. Medio abdomine fascia fusca. *Antennæ* fuscæ. Cætera rufa.

Obs. Licet ad ichneumones retulendam judicaverit *D. Schrank*, inter mutillas nihilominus ordinavit, uti M. *acarorum* quæ ichneumonis scæmina visa fuit. V.





VI.

DIPTERA.

Alæ duæ.

*Halteres clavati, solitarii pone singulam alam,
sub squamula propria.*

GENUS PRIMUM.

OESTRUS. Os nullum punctis tribus, absque
proboscide aut rostro exserto.

Bovis. 1. Oe. (des bœufs) alis maculatis, tho-
race flavo, fascia fusca, abdomine
flavo apice nigro.

It. Wgot. 202.

Raj. inf. 271.

Derham. theolog. 1. 8. c. 6. n. 11.

Vallisn. nat. 1. t. 28.

Reaum. inf. 4. t. 36.-38.

Frisch. inf. 5. p. 25. t. 7.

Sulz. inf. t. 20. f. 127.

Geoff. paris. inf. 2. p. 456. n. 3.

Schæff. elem. t. 91.

*Fab. 2. thorace flavo, fascia nigra, alis
albis fusco fasciatis.*

*De Géer tom. 6. p. 297. t. 15. f. 22.
niger, alis immaculatis, thorace an-
tice posticeque pilis griseis, abdomine*

*Oestri Larvæ latent intra Pecorum corpus, ubi per totam hyemem
patriuntur; fœtuli vices gerunt; extrahuntur a Buphaga.*

antice villis griseis apiceque flavo-fulvis.

Enum. n. 842.

Faun. Fridr. n. 660.

Hab. Intra *Boum* dorsum; in ventriculo equorum, sæpe ipsis lethalis.

Hoc illud insectum, cui nomen Asilo.

Romanum est, Oestrum graji vertere vocantes, Asper, acerba sonans, quo toto exterrita sylvis Diffugiunt armenta.

Virg.

Desc. Magnitudo muscæ majoris. Os nullum: rima absque dentibus & proboscide. Oculi nigri. Antennæ articulo lentiformi cum seta. Thorax flavus, cingulo nigro inter alas conspicuo. Scutellum nigris pilis, intermediis fulvis reflexis. Abdomen flavum, segmentis margine fuscis, ultimo articulo abdominis nigro. Pedes pallidi, Halteres sub alis. Cauda exserta inermis, sub abdomine valde inflexa. Alæ albæ, incumbentes, in medio fascia lata transversa fusca, puncto gemino fusco in apice alarum & tertio puncto inter fasciam & corpus versus marginem tenuiorem.

β. *Varietas* fronte infra oculos etiam hirsuta, abdomine & pectore subtus nigricantibus, abdomine toto flavo, alis uno puncto in apice. *Habitat* intra ventriculos equi. *Faun.* 1730.

Tarandi. 2. Oe. (des rennes) alis immaculatis, thorace flavo fascia nigra, abdomine fulvo apice flavo. *

Flor. lapp. 360. n. 517.

Linn. Ad. Stockh. 1739 t. 3. f. 5, 6.

— *Ad. Upsal. 17.*

Fab. 3.

Hab. intra cervi tarandi dorsum.

Hujus caussa Lappones quotannis cum grege nigrant e Lapponia sylvatica in Alpes Lapponicas.

Desc. Præcedenti duplo major. Alæ immaculatæ. Abdomen magis hirsutum, ipsa tunica nigra, sed lana fulva, excepta basi abdominis flava lana. Thorax flavus, fascia atra inter alas. Pedes nigri.

Larva per totam hyemem latet sub cute Rhenonum in dorso, caussans fontanellas illas, quibus emaciantur Rhangiferi & cicatrices quibus contaminantur eorum coria. Dicitur & œstrus & œstrum. Faun. 1731.

*Nafalis. 3. Oe. (le nasal) alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro pilis flavis. **

Fab. 4.

Hab. in equorum fauce, per nares intrans.

Corpus nigrum, sed caput, thorax, abdomen teâa pilis helvolicis s. luteo-ferrugineis, verum primum segmentum abdominis teâum pilis albis.

Desc. Oculi magni, nigri. Frons lutea. Thorax ferrugineus, villosus. Abdomen alis longius, nigrum, vestitum pilis raris, flavis, fericeis. Femora nigra. Tibiæ flavæ. Antennæ clavatæ, nigrae, triplici articulo, aristatæ. Faun. 1732.

*Hæmorrhoidalis. 4. Oe. (l'hémorrhoidal) alis immaculatis, thorace nigro, scutello pallido, abdomine nigro, basi albo apiceque fulvo. **

Reaum. inf. 4. t. 35. f. 3.-5.

Geoff. parif. 2. p. 455. n. 1.

Fab. 5. alis immaculatis, abdomine nigro, basi albo apiceque fulvo.

De Geer tom. 6. p. 292. t. 15. f. 13.-21.-23. intestinalis, fulvo-griseus, thorace fascia transversa nigra, alis maculatis, pedibus fulvis.

Frisch. inf. 5. t. 7.

Raj. inf. 27. musca bipennis, œstrum dicta, alis membranaceis punctis crebris nigrioribus velut adpersis.

Hab. in equorum intestino recto, mire per anum intrans.

Desc. Caput album. Oculi nigri. Thorax niger, scutello pallido. Abdomen cingulo nigro, basi album, apice fulvum. Alæ immaculatæ, quem puto eundem esse. Faun. 1733.

Obs. 1. Thorax antice pallidus, postice niger. Fab.

Obs. 2. Oestrus nasalis & hæmorrhoidalis meræ varietates nullo modo specie, sed tantum loco diversæ. Mantiff.

Obs. 3. Oestrum intestinale D. de Geer. Oestrum bovis Linn. credidit D. Retz. Oestrumque bovis D. de Geer. ad oestrum hæmorrhoidalem Linn. retulit; contra D. Fabricius hujusque opinioni assensus sum. Dubium oritur ex eo quod Linn. non citaverit D. de Geer. V.

Ovis. 5. Oe. (des moutons) alis subpunctatis, abdomine albo nigroque versicolore.

Schreber. inf. 15. n. 12.

Vallish. nat. 1. p. 224. t. 27.

Reaum. inf. 4. t. 35. f. 21.-24.

Geoff. parif. 2. p. 456. n. 2. t. 17. f. 1.

Fab. 6.

Faun. Fridr. n. 661.

Enum. n. 843.

Hab. in ovium sinu frontis.

Corpus reliquis minus, tomentosum nec villosum. Oculi ferruginei. Alæ venosæ, versus basin punctatæ. Abdomen ovatum, albido-cinereum, colore nigro maculatum, fugax. Vertex capitis punctis numerosis excavatis.

Ex Enum.

Elaphi. 6. *Oe.* (du cerf.)

Obs. Nullum harum specierum examinare datum est; aliena fide huc refero. Fors postrema primæ varietas, aut eadem, aut oestrus *tarandi*. Etiam cervo *capreolo* suus est oestrus, sed cum animal hoc cum cervo *elapho* conveniat genere, fortasse ab eodem insecto infestatur. *Enum. p.* 418.

Ex nost. Mus.

Lineatus. 7. *Oe.* (le rayé) alis albis, thorace lineis nigris, latis, lineato, pedibus fulvis.
t. 9. f. 1.

Hab. in Europa. In Bressia semel legi.

Desc. *Oris* loco valde tomentosus. *Thorax* octo lineis nigris latis, lucidis. *Coma* albida scutellum tegens. *Abdomen* rufotomentosum. *Pedes* fulvi, femoribus basi nigricantibus.



G E N U S I I.

TIPULA. *Os* capitis elongati maxilla superiore fornicata.

Palpi duo incurvi capite longiores.

Proboscis recurvata brevissima.

* *Alis* patentibus.

Pectinicornis. I. T. (la Pectinée) antennis pectinatis ;
 alis macula nigra, thorace flavescente.*

Scop. carn. 839.

Raj. inf. 73. n. 12.

Fab. I. antennis pectinatis, alis macula nigra, abdomine basi rufo, medio flavo fasciato, apice atro.

De Geer tom. 6 p. 400. t. 25. f. 1.-6.
 flavo crocea, antennis pectinatis,
 capite thoraceque supra nigris, abdomine maculis nigris, alis puncto fusco.

Schæff. elem. t. 13. f. 8.-t. 129. f. 3.

— *icon.* t. 106. f. 5, 6.

Enum. n. 853.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 930.

Faun. Fridr. n. 662.

Hab. in Suecia. In Gallia Aust. V.

Antennæ pectinatae radiis oppositis, sed in altero sexu intra singulum par radiorum mucro capitatus solitarius, in altero geminus.

Desc. Major. Antennæ nigræ, plumosæ, basi luteæ. Caput nigrum, collari flavo. Thorax nigricans, lateribus flavis.

Tipulæ Larvæ communiter sub radicibus vegetabilium degunt & radices exedunt, quas eradicant cornices, ne præta minis destruant:

Abdomen flavum, linea dorsali & lateribus nigricantibus. *Pedes* flavescentes. *Faun.* 1735.

Larva sordide alba, diaphana, ita ut nigra ab ingestis alimentis intestina transpareant. *Caput* nigrum. Anus spinis armatus; ultimo segmento puncta duo nigra ocellaria sub aculeis.

Puppa terrei coloris, tota undique aculeis hispida, quod inde fit, quia singula segmenta quasi verticillatim cinguntur aculeis brevibus; anus magis spinosus. *Antennæ* porrectæ curvæ, concavitate sua faciem, seu partem illam, in qua alarum tegumenta sunt, respiciente.

Hab. in carie arborum solitaria larva puppaque: declarata hortos nemoraque frequentans.

Obs. Puppæ uni unam antennam amputavi, prodiit tamen tipula & antennis & palpis & alis instructa. Alteri, *fæminæ*, utranque abscidi antennam & prodiit tipula solis alarum rudimentis instructa.

Imago maris. Color totius niger. *Caput* & *oculi* nigri. *Frons* alba. *Oculi* nigro ciliati. *Antennarum* basis nuda, sub primi articuli finem fascia nigra, tum *subtus* clavula quædam apicem respiciens, tandem pectines antennarum, qui toti nigri, radiis utrinque quatuordecim, alternis minoribus; radius terminalis impar; rachis ferruginescit. *Thorax* niger, lateribus flavis. *Abdomen* rufum. In singuli segmenti dorso macula nigra trigona; ex omnibus istis linea longitudinalis nigra exfurgit. Linea tenuior nigra ad latera. *Alæ* hyalinæ cum macula nigra ad marginem

exteriorem. *Halteres* ferruginei, clava flava. *Pedes* fulvi, geniculis & tibiis secundariis nigris, primariis fuscis.

Imago *femina* mari similis. Nigra sunt, oculi, frons, thorax, apex abdominis supra infraque & linea longitudinalis ex maculis trigonis per medium abdominis decurrens & alia *subtus* ex maculis rotundis; item *tibiæ* secundariæ & *antennæ* moniliformes, primi tamen tres articuli fusco-testacei sunt. Flava sunt, maculæ duæ laterales thoracis, apices segmentorum abdominis supra infraque, non tamen per modum fasciæ, macula enim illa trigona flavi margines in medio infuscantur. Hinc tantum latera segmentorum flava. Testacea reliqua. *Enum. p. 421.-23.*

Obs. Maculæ trigonæ abdominales maris aliquoties oblitteratæ. V.

Rivosa. 2. T. (la sinuée) alis hyalinis, rivulis fuscis maculaque nivea. *

Scop. carn. 846.

Ad. Stockh. 1739. t. 9. f. 8.

Sulz. inf. t. 20. f. 128.

Raj. inf. 72. n. 1.

Geoff. paris. 554. n. 2.

Fab. 2.

De Geer tom. 6. p. 341. t. 19. f. 1: griseo-fusca carneo mixta, antennis setaceis brevioribus, alis albis, rivulis longitudinalibus fuscis.

Faun. Fridr. n. 664.

Enum. n. 845?

Hab. in Europa.

Desc. Maxima est. *Corpus* & *abdomen* cinereo-fuscum, caudâ bifida. *Alæ* hyalinæ seu exalbidæ; rivulus fuscus secundum marginem anteriorem longitudinaliter

rudinaliter extenditur, qui ramum versus marginem interiorem oblique emittit & inde oblique extrorsum, ubi coadunatur cum eodem a quo ortus; macula magna nivea occupat spatium sub ramificatione maculæ fuscæ, adeoque inter omnes nostras speciosissima est. *Faun.* 1738.

Quadrimalu-3. T. (la quadrimaluée) alis fusco-venosis, margine maculisque 4 fuscis, abdomine supra flavo. *

β. Tip. *calmariensis* alis fusco-venosis, maculis 4 marginalibus fuscis, abdomine lutescente, segmento primo nigro. *

Fab. 4.

De Geer tom. 6. 343. alis fusco-venosis, margine maculisque fuscis, abdomine supra flavo.

Faun. Fridr. n. 663.

Enum. n. 855.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 931.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. E maximis nostratibus. *Thorax* flavescens, nigro maculatus. *Abdomen* flavescens margine fusco; segmentum primum supra macula magna nigra; secundum lineola. *Femora* pallida, apice & annulo ad apicem nigro. *Alæ* venis fuscis maculisque obsolete fuscis, ad costam maculis duabus fuscis saturatioribus.

Obs. In *Faun.* tip. *calmariensem* & *quadrimalulatam* separaverat *Linn.* quas sub una specie in *Syst.* optimo jure collocavit.

Desc. Tip. *calmariensis* maximas inter numeranda. *Alæ* maculis 4 fuscis ad costam crassiorem. *Thorax* flavescens, maculis fuscis. *Abdomen* lutescens,

versus margines magis fuscum, primo segmento macula quadrata atra testo.
Faun. 1737.

Obs. Ne fidas numero punctorum. V.

Crocata. 4. T. (la saffranée) alis macula fusca, abdomine atro fasciis fulvis. * t. 9. f. 2.

Scop. carn. 818.

Raj. inf. 72. n. 4.

Fab. 5.

De Geer tom. 6. p. 349. aterrima, abdomine fasciis transversis flavis, antennis filiformibus, pedibus punctisque alarum fuscis.

Faun. Fridr. n. 665.

Schæff. icon. t. 126. f. 4.

Hab. in Europa.

Desc. Corpus atrum & saturatissime nigrum est. Articuli abdominis, excepto exteriore margine, crocei seu fulvi; variæ lituræ fulvæ in ipso thorace. Alæ subfulvescentes, venis fuscis, puncto marginali obscuro. Femora versus basin lutescentia. *Faun.* 1739.

Obs. 1. Certe. *Schæff. t.* 126. n. 4. tipulam crocatam *Linn.* exhibet; sed licet *DD. Linn. Fab. Schrank. que n.* 1. p. 553. & *tab.* 19. f. 1. *D. Geoff.* citaverint, synonymia deceptoria. Antennæ quæ in tip. *D. Geoff.* pectinatae, simplices in utroque sexu in tipula *crocata Syst.* speciminaque nostra *D. Scop. de Geer.* que descriptionibus conformia.

Obs. 2. *Reaumurium DD. Fab. de Geer.* que non sunt memorati tipulaque hujus *Entomologi. tom.* 5. t. 1. f. 14, 15, 16, nec imagini *D. Schæff.* nec *Linn.* descriptioni convenit. Quamobrem synonymiam supressi tipulaque *D. Geoff.* species propria a tip. *crocata* diversa

ut ex *D. Schrank*. descriptione apparebit.

Crocata D. Schrank. Geoff. que. t. 9. f. 3.

Geoff. inf. paris. tom. 2. 553. n. 1.

Desc. Maris. Niger, antennis nigris pectinatis, pectinibus utrinque septemdecim, ultimo impari; rachis nigro fulvoque variegatur. *Frons* alba; *oculi* nigri. *Thorax* basi linea transversa fulva, utraque latere ante alas lineæformi macula flava. *Abdomen* nigrum, basi, ubi thoraci adnectitur, flavum; segmentum secundum subtus fascia flava latera obvolvante, non tamen in dorso in se redeunte, cingitur; segmenti tertii apex superior fulvus; quartum supra subtusque fulvum, basi sola modice nigra; quintum & sextum supra fasciæ fulva in medio abrupta. *Pedes* fulvi; *femora* & *tibiæ* cingulo nigro. *Alæ* hyalinæ, macula nigra. *Halteres* fulvi, clava flava.

Desc. Fœminæ. Nigra. *Frons* fulva. *Thoracis* basi linea transversa, maculæ duæ, punctumque ante alas, saturate fulva; aliud punctum ad latus cujuscvis alæ antèrius & aliud ad latus thoracis post alam, omnia fulva. *Abdomen* nigrum, cingulis tribus & punctis duobus croceis. *Halteres* fusci, capitulo compresso, summo apice albo. *Antennæ* moniliformes; *alæ* ut in mare.

Oleracea. 5. T. (le Tailleur) alis hyalinis costâ marginali fusca. *

Scop. carn. 854.

Gæd. inf. 2. t. 44.

List. Gæd. f. 139.

Leuwenh. nat. 1693. f. 4, 5.

— 1704. f. 4.

Bradl. nat. t. 25. f. 3.

Frisch. inf. 4. t. 12.

Geoff. inf. p. 555. n. 3.

Fab. 7.

De Geer t. 6. p. 339. t. 18. f. 12. - 18.
griseo-fusca, antennis filiformibus, alis
pallide fuscis, immaculatis, costa mar-
ginali fusca.

Faun. Fridr. n. 666.

Enum. n. 850.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 932.

Reaum. inf. tom. 4. t. 11. f. 7.

— *tom. 5. t. 2. f. 11. - t. 3. 1, 2. 10.*

Schæff. icon. t. 15. f. 6.

Hab. in Europa ad radices plantarum ;
oleribus & plantis cultis infesta.

Larva griseo-alba, cylindrica, apice pos-
ticeque attenuata. *Reaum.*

Desc. Tota cinerea. *Alæ* membranacei
coloris, margine exteriori longitudi-
naliter (non tamen usque ad summum
apicem) linea lata, longa, fusca
pictæ, quæ linea quasi ex plicis constat ;
sub hac linea ala albidior est. *Faun.*
1740.

Hortorum. 6. T. (la Jardiniere) alis hyalinis, ma-
culis sparsis albis obsoletis. *

Raj. inf. 72. n. 6.

Alb. inf. t. 61.

Fab. 6.

De Geer tom. 6. p. 344. griseo-fusca ;
antennis filiformibus fuscis, alis fusco
alboque maculatis.

Schæff. icon. t. 15. f. 3, 4.

Enum. n. 852.

Faun. Fridr. n. 667.

Hab. in Europa.

Desc. Tota cinerea. *Alæ* cinerascens ;
maculis aliquot albis vix manifestis

sparsis : vasa alarum fusca sunt , absque macula aliqua obscura marginali. *Faun.* 1741.

Obs. Alæ fuscae , maculis aliquot hyalinis , & una , fasciæ instar , non procul apice totam alam cingente. *Enum.*

Variegata. 7. T. (la variée) alis hyalinis , macula pallida obsoleta , corpore nigro luteoque variegato. *

Fab. 10. nigra , abdominis basi lateribusque rubris , flavo maculatis.

De Geer tom. 6. p. 346. nigra antennis filiformibus , thorace abdominisque lateribus luteo maculatis , alis puncto venisque latis fuscis.

Faun. Fridr. n. 668.

Schaff. icon. t. 15. f. 7.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Alæ hyalinæ , vasis pallidis , puncto marginali obscuriore , macula pallida. *Corpus* viridi nigroque variegatum , præsertim pectus perbelle pictum. Magnitudo media seu proxime præcedentis. *Maris* cauda obtusa , pene capillaris , longissima. *Fæminæ* cauda acuta , ut in reliquis. *Faun.* 1742.

Latera abdominis rubra & in singulo segmento punctum flavum. *Scutellum* rubrum , macula nigra. *Pedes* rubri. *Fab. Entom.*

Contamina- 8. T. (la tachée) alis nigro maculatis , corpore nigro. *

Fab. 11. atra , alis albis , fasciis duabus punctisque nigris.

Geoff. inf. tom. 2. p. 558. n. 8. nigra , pedibus abdominisque maculis utrinque lividis , alis nigro maculatis.

Hab. in Europa.

Desc. Est e mediæ magnitudinis speciebus.
Alæ hyalinæ, nervosæ, triplici fascia
 punctorum conglomeratorum nigrorum:
 singulam fasciam punctum interjacet
 nigrum junta marginem majorem alæ.
 Totum corpus nigrum, etiam oculi.
Pedes lividi. *Antennæ* quindecim ar-
 ticulis. *Faun.* 1743.

Lunata. 9. T. (la lunule) alis cinerascens, luna marginali alba. *

Scop. carn. 847.

Geoff. inf. p. 555. n. 4.

Raj. inf. 73. n. 10.

Reaum. inf. 5. t. 2. f. 11.

Fab. 12.

De Geer. tom. 6. p. 342. flavo-grisea;
 antennis filiformibus, alis pallide fuf-
 cis, puncto fusco fasciaque obliqua
 alba.

Schæff. icon. t. 162. f. 5, 6.

Faun. Fridr. n. 669.

Enum n. 849.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 933.

Hab. in Europa.

Desc. Noscitur a reliquis facile alarum
 colore cinereo una cum venis unicolori-
 bus in loco; ubi punctum marginale
 solet collocari, huic lunula alba.
Dorsum abdominis fuscum. *Faun.* 1744.

Prætenfis. 10. T. (des prés) alis subcinereis, vasis
 fuscis punctoque marginali obscuro,
 fronte fulvâ. *

Scop. carn. 848.

Frisch. inf. 4. t. 12.

Fab. 13. thorace variegato, abdomine
 fusco, lateribus flavo maculatis, fronte
 fulva.

Faun. Fridr. n. 670.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus obscurum seu nigrum, lateribus flavis. *Thoracis* lituræ luteæ. *Alæ* subcinereæ, vasis fusco-nigricantibus, macula seu puncto marginali nigricante. *Halteres* pallidi, apice albo. *Antennæ* atræ. *Pedes* nigri, *femoribus* ferrugineis. *Faun.* 1745.

Terrestris. 11. T. (la terrestre) alis hyalinis puncto marginali fusco, abdominis dorso cinereo.

Frisch. inf. 7. t. 22.

Enum. n. 857.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 934.

Faun. Fridr. n. 671.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Differt a præcedentibus, quod dimidio minor, tam mas quam foemina. *Pedum* genicula nigra. *Corpus* subincarnatum. *Alæ* hyalinæ, venis cinerascens; punctum marginale ferrugineum seu fuscum. *Faun.* 1746.

Cornicina. 12. T. (la bruyante) alis hyalinis puncto marginali fusco, abdomine flavo lineis tribus fuscis. *

Ræf. inf. 2. *musc.* t. 1.

Fab. 16.

De Geer tom. 6. p. 347. t. 19 f. 2.-9. capite thoraceque citreo-nigro-maculato, abdomine flavo-testaceo, lineis nigro punctatis.

Faun. Fridr. n. 672.

Geoff. inf. tom. 2. p. 556. n. 5. alis subfuscis, thorace flavo characteribus nigris, abdomine luteo, punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus.

Hab. in Europa.

Desc. Est inter majores, non maximas,
Z iv

numeranda. *Alæ* hyalinæ, puncto fusco. *Abdomen* flavum, lineis tribus longitudinalibus fuscis, quarum una in dorso, una in singulo latere; apex abdominis fuscus. *Thorax* flavus, a tergo lineis tribus fuscis. *Faun.* 1747.

Nigra. 13. *T.* (la noire) alis fuscis, corpore atro. *

Fab. 18.

Faun. Fridr. n. 673.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 559. n. 10.

Enum. n. 864.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 933.

Hab. in Europa.

Desc. Est e mediæ magnitudinis speciebus. *Alæ* fuscæ, vasis nigricantibus cum puncto marginali. *Thorax* & *abdomen* atra. *Pedes* fusci. *Fœminæ* gaudent ano subulato, *mares* vero obtuso. *Faun.* 1748.

Obs. Acaro coccineo frequenter obnoxia. *Enum.*

Atrata. 14. *T.* (la prolongée) alis glaucis puncto marginali corporeque atro, abdominis segmento primo pedibusque rufis. *

Fab. 17.

De Geer tom. 6. p. 350. t. 19. f. 10, 11. atra, antennis filiformibus, abdomine antice pedibusque rufis, alis puncto nigro.

Poda gr. p. 112.

Enum. n. 848.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 934.

Schæff. icon. t. 32. f. 1.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Est inter maximas sui generis, capite, thorace, abdomine, atris, nitidis. *Pedes* omnes ferruginei. *Antennæ* atræ,

nodosæ, articulis duodecim, longitudine thoracis. *Alæ* glaucæ, præfertim inter punctum marginale & corpus, vasis nigricantibus, puncto marginali majusculo, atro. Basis abdominis rubra. *Anus* fœminæ in stilum trivalvum definit. *Faun.* 1749.

Obs. *Mas* variis Entomologis incognitus fuit, inde antennæ filiformes pronuntiatae fuerunt, sed in mare pectinatae. Caput, thorax, alæ pedesque, ut in fœmina. *Abdomen* rubescens, apice incrassatum. In utroque sexu *thorax* valde fornicatus. *Antennæ* pallide basi nigræ. *Pictura* DD. de Geer & Schæff. vera, sed fœmina. V.

Bimaculata. 15. T. (la bimaculée) alis hyalinis, maculis duabus fuscis, abdominis medio maculato - ferrugineo, antennis plumosis. *

Fab. 20.

De Geer tom. 6. p. 402. nigra, antennis pectinatis, abdominis lateribus pedibusque flavis, alis maculis duabus fuscis,

Reaum. inf. tom. 5. t. 4. f. 1, 2.

Schæff. icon. t. III. f. 5. *Mas* 6. *Fœmina*, *Faun. Fridr.* n. 674.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. arborum truncis. V.

Desc. Media. *Caput*, *antennæ* & *thorax*, nigra. *Abdomen* nigrum, in medio tam lateribus quam subtus, ferrugineum s. lividum. *Alæ* in medio macula nigra & apices alarum fuscae. *Pedes* lividi, flavescentes, articulis apice nigris. *Faun.* 1750.

Annulata. 16. T. (l'entourée) alis fusco variegatis, femoribus annulo albo. *

Scop. carn. 849.

Reaum. inf. 5. t. 4. f. 1, 2.

Fab. 21.

Faun. Fridr. n. 676.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Corpus totum cinereo-fuscum. *Alæ* subcinereæ, versus marginem anteriorem fasciis quatuor vel quinque fuscis, versus marginem posteridrem circulis tribus fuscis, cum puncto in medio fusco. *Pedes* grisei. *Femora* versus apices annulo nigro cincta. *Antennæ* 14 articulis, quorum 1 rectus, oblongus, niger; 2 globosigibbus; 3-13 subrotundi; 14 acuminatus. *Faun.* 1752.

Ocellaris. 17. T. (l'oculée) alis albidis, maculis ocellaribus nigricantibus plurimis. *

Gadd. satag. 87.

Fab. 22.

Enum. n. 856.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 934.

Faun. Fridr. n. 675.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Media. Alæ expansæ, albidæ, duplici serie ocellorum fuscorum, quorum margine exteriori adjacentes obscuriores. *Faun.* 1751.

Fasciata. 18. T. (la fasciée) alis albidis, fasciis quatuor cinereis flexuosis, abdomine pedibusque flavescantibus.

Fab. 24.

Hab. in Europa. Fabricius.

Magnitudo culicis. Alarum fasciæ inæquales, margine magis fusca.

Flavescens. 19. T. (la jaunâtre) alis immaculatis, corpore flavo, dorso fusco. *

Fab. 27.

Enum. n. 859.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 935.

Faun. Fridr. n. 677.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Mediæ magnitudinis sive culice vulgari paullo major. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Corpus* flavum, sed *caput, thorax & abdomen* a tergo fusca. *Faun.* 1753.

Ensicornis. 20. T. (l'ensicorne) antennis lanceolatis ferrulatis, alis venis maculaque nigra. *Hab. in Suecia. In prædio meo Hammarby.* *Corpus lividum, culice pipiente paullo majus. Antennæ nigræ, lanceolatæ, compressæ, articulatæ, ferrulatæ, erectæ, longitudine thoracis. Thorax linea nigra antice bifida & divaricata. Alæ venis nigris, macula marginis exterioris oblonga nigra. Abdomen ad singuli segmenti latus macula nigra.*

Regelatio- 21. T. (la précocce) alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo fusco. *

Fab. 28.

Enum. n. 873.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 935.

Faun. Fridr. n. 678.

Hab. in Europæ terrestribus, primo vere frequens, choreas in aere agens. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo culicis. *Corpus* læve, cinereo - fuscum. *Antennæ* thorace paullo longiores. *Alæ* hyalinæ venis fuscis, nitentes e glauco - cinereo, extensæ, s. patentes, uno puncto s. anastomosi in medio. *Abdomen* tenue. *Faun.* 1754.

Obs. Ad tipulas culiciformes in *System. amandanda. Enum.*

Replicata, 22. T. (la repliée) alis hyalinis margine tenuiore recurvato , corpore fulco , antennis simplicibus.

De Geer. Ad. Upsal.

Fab. 29.

De Geer tom. 6. p. 351. t. 20. f. 1.-16.
fusca, antennis filiformibus, alis pallide fuscis margine tenuiore recurvato.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Oculi palpique nigricantes. Antennæ fusco-nigricantes 15 articulis lente pilosis. Thorax crassus, rotundatus, griseus. Alæ lucido-griseæ, secundum longitudinem plicatæ, sed supra & non infra ut in vespis. Alam extendit ad volatum.

Larva apoda, spinosa viridi - fusca , infra castaneo-fusca.

Puppa viridi-fusca, fascia lata obscura dorsali; infra fasciæ tres longitudinales. Spiracula in thorace. *De Geer.*

Monoptera, 23. T. (la Monoptere) nigra , pedibus palpisque pallidis. *

Fab. 30.

Faun. Fridr. n. 679.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Similis tipulis alis patentibus, sed alam alteram alteri imponit, quasi unica esset & culice minor.

Desc. Dimidio minor culice. Corpus nigricans. Alæ hyalinæ. Antennæ corpore dimidio breviores. Pedes omnes pallidi f. lividi, ut etiam palpi. Similis tipulis alis patulis, sed alam alteri imponit, quasi unica esset. Faun. 1756.

Arundineti, 24. T. (des roseaux) albida , antennis villosis, oculis atris. *

Fab. 42. Inter tipulas alis incumbentibus.

Faun. Fridr. n. 680.

Enum. n. 868.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 936.

Hab. in arundinetis, ubi choreas agit, In Bressia. V.

Desc. Magnitudo culicis. Alæ hyalinæ, incumbentes, margine interiore subciliatæ. Antennæ subciliatæ, thorace breviores. Oculi magni, atri. Corpus flavescens - pallidum. Fæminæ anus mucronatus, adscendens, testaceus, maris furca obtusa. Faun. 1757.

Barbicor- 25. T. (la demi-panachée) nigra, antennis plumosis apice simplicioribus.

Enum. n. 875.

Beytr. Zur. nat. p. 56. §. 9.

Hab. passim per Europam. In fenestris prope Lugdunum capta M. Martio. V. Antennarum barba non patens, sed apicem versus coarctata; magnitudo pulicis.

Ex spec. D. Fab.

Sinuata. 26. T. (l'échancrée) alis albis, margine sinuato maculisque fuscis, corpore cinereo, pedibus ferrugineis tip. 3.

Iter. Norwag.

Hab. in Europa Boreali. Hafniæ.

Desc. Corpus magnum cinereum. Thorax margine antico, usque ad alas ferrugineo. Alæ albæ, margine crassiori late ferrugineo, sinibus duobus magnis albis. Maculæ duæ obscuræ præterea ad marginem tenuiorem. Pedes ferruginei, geniculis nigris.

Triangula- 27. T. (la triangulaire) alis dimidiato fuscis, macula triangulari alba tip. 9.

Hab. in Scotia. De Walker.

Desc. Corpus magnitudine *T. oleraceæ* ; fuscum , linea abdominis laterali cinerea. *Alæ* albæ , dimidia parte costam adjacentem fusca , macula magna triangulari alba. *Pedes* elongati , fusci , geniculis nigris.

Dorsalis. 28. *T.* (la dorsale) flavescens , dorso fusco , alis hyalinis , macula marginali nigra tip. 14.

Hab. in Germania. *D. de* Hattorf. *In* Italia. *Dr.* Allioni.

Desc. Statura & magnitudo *T. pratensis*. *Antennæ* porrectæ , obtuse ferratæ , nigrae. *Thorax & abdomen* flavescencia , dorso omni fusco. *Alæ* hyalinae , macula ordinaria marginali nigra.

Plumbea. 29. *T.* (la plombée) fusco-cinerea , alis albis , costa nervisque nigris tip. 15.

Geoff. inf. parif. p. 559. *n.* 13 ?

Hab. in Italia. *Dr.* Allioni.

Desc. Corpus inedium totum cinereo-fuscum s. plumbeum. *Antennæ* nigrae. *Alæ* albæ , costa exteriori nervisque nigris. *Pedes* nigri , femoribus basi testaceis.

Cinerea. 30. *T.* (la cendrée) alis albidis , maculis tribus fuscis , corpore cinereo immaculato tip. 23.

Iter. Norwag.

Hab. in Norwagia.

6-Puncta- 31. *T.* (la 6-punctuée) alis albis , punctis tribus marginalibus fuscis , thorace compresso fulvo , linea dorsali nigra tip. 25. t. 9. f. 5.

Hab. in Italia. *Dr.* Allioni, *In* Gallia Aust. V.

Desc. Statura omnino sequentis. *Caput* nigrum, postice valde attenuatum. *Thorax* compressus, elevatus, fulvus, linea dorsali atra. *Abdomen* fuscum, ano rufo. *Alæ* albæ, punctis tribus marginalibus distinctis fuscis. *Pedes* nigri, *femoribus* basi testaceis.

Tripuncta- 32. T. (la triponctué) alis hyalinis ;
ta punctis tribus marginalibus fuscis ,
corpore flavo tip. 26.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.*

Desc. Statura & magnitudo omnino T. *flavescentis*, distincta tamen punctis tribus alarum marginalibus fuscis.

Turcica. 33. T. (la Turque) alis venosis, lunula
marginali alba, corpore cinereo, ab-
domine linea dorsali nigra. *Mantiss.*
tip. 13.

Hab. Kilix. *D. Daldorf.* In Gallia Aust. V.

Desc. Statura omnino T. *lunata*. *Corpus* cinereum, linea dorsali lutea abdominis nigra. *Pedes* nigri, *femoribus* testaceis. *Alæ* nigro-venosæ, lunula marginali alba.

Albimana. 34. T. (la gantée) nigra, femoribus testaceis tarsisque posticis albis. *Mantiss.*
tip. 20.

Hab. Kilix. *D. Daldorf.*

Desc. Media. *Caput* atrum, ore testaceo. *Thorax* ater, nitidus, immaculatus. *Abdomen* nigrum, macula una alterave obsoleta apicis ferruginea. *Pedes* elongati, nigri, *femoribus* testaceis *tarsisque* posticis albis.

Flavipes. 35. T. (la flavipede) fusca, alis obscuris,
cinereo maculatis maculisque tribus

costalibus fuscis, pedibus flavescentibus, geniculis fuscis. *Mantiss.* tip. 29.
Hab. Kiliæ.

Desc. Media. *Caput* & *thorax* fusca, immaculata. *Halteres* flavi, annulo fusco ante apicem. *Abdomen* fuscum, segmentorum marginibus flavis. *Pedes* elongati flavescentes, geniculis fuscis. *Alæ* obscuræ, maculis cinereis sparsis maculisque tribus distinctis fuscis in margine crassiori.

Pilipes. 36. T. (la pilipede) cinerea, alis striatis fuscescentibus, tibiis anticis pilosis. *Mantiss.* tip. 33.

Hab. Kiliæ.

Desc. Media. *Corpus* cinereum, thorace substriato. *Abdomen* planum, cinereum, ano rufo. *Alæ* fuscescentes, nigro striatæ punctoque postico fusco, distincto. *Pedes* flavescentes, tibiis anticis pilosis.

Ex Enum.

Venosa. 37. T. (la nerveuse) alis hyalinis, venis fuscis fuscoque marginatis.

Beytr. Zur. Nat. p. 92. §. 60.

Hab. in Europa.

Plicata. 38. T. (la plissée) alis hyalinis, venis fuscis, margine externo lineaque media plicis parvis transversis indistinctis.

Hab. in Europa.

Desc. Cinerea. *Alæ* hyalinæ, venis fuscis. Duæ lineæ longitudinales, quarum una marginem exteriorem, medium altera occupat, ex plicis minutis transversalibus.

Punctata.

Punctata. 39. T. (la ponctuée) alis hyalinis nigro punctatis , margine exteriori nigro maculato.

Faun. Fridr. n. 691 ?

Hab. in Europa.

Desc. Longipes , cinerea. *Alæ* hyalinæ ; modice rufescentes. *Margo* crassior maculas aliquot nigras gerit ex punctis compositas. Reliqua alâ tota punctis nigris obsoletis creberrimis confita.

Phragmitidis. 40. T. (du roseau commun) flava , capite nigro , alis hyalinis ; punctis tribus nigris.

Faun. Fridr. n. 701 ?

Hab. in arundinetis.

Desc. Caput nigrum. *Antennæ* flavæ ; *Thorax* flavus , linea longitudinali nigra. *Alæ* hyalinæ , punctis prope marginem exteriori tribus nigris. *Abdomen* flavum. *Pedes* flavi , apice fuscis.

Obs. Affinis videtur T. tripunctata. *D. Fab. V.*

Ochreatea. 41. T. (la bigarrée) nigra , alis hyalinis ; nigro maculatis punctatisque , ante tarsos posticos fascia alba.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra. *Femora* , femorum apophyses , *palpi* halteresque ferruginei ; in abdomine maculæ duæ utrinque ferrugineæ. *Alæ* hyalinæ , macula una ad marginem , altera in medio punctisque duobus fuscis. *Tibiæ* fuscae ; ante pedum posticorum tarsos fascia alba.

Bifasciata. 42. T. (la bifasciée) flava , alis hyalinis ; fusco subbifasciatis.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Insect. Tomus III.

Aa

Desc. Mediocris. Flava. *Oculi* atri. *Alæ* hyalinæ, macula fusca prope marginem in medio & fascia fusca prope apicem alæ.

Ex op. D. de Geer.

Fulvipenn- 43. T. (l'aile fauve) grisea, antennis filiformibus, abdomine subtus thoracisque lateribus flavo-fulvis, alis fulvis medio puncto nigro.

Hab. in Europa.

Desc. Magna. *Oculi* nigri. *Caput* fuscum. *Thorax* & *abdomen* supra, fusca, sed latera thoracis & *abdomen* infra ochraceata. *Alæ* magnæ luteo-fuscæ, fascia pallida in medio, fascia fusca prope apicem marginis exterioris.

Maculata. 44. T. (la tachetée) griseo-fusca, antennis filiformibus nigris, abdominis segmentis flavo marginatis, alis fusco alboque maculatis.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* nigræ. *Thorax* fusco lineatus. *Alæ* maculatæ, maculis angularibus fuscis albisque. Incisuræ abdominis postice supra & infra luteo lineatæ. *Halteres* flavi. *Abdomen* fœminæ apice conicum.

Ex entom. Carn.

Idriensis. 45. T. (d'Idria) antennis maris pectinatis, alis fascia obsoleta lineaque media transversa fuscis, femoribus rufis.

Hab. in pratis udis.

Desc. *Mas.* *Antennæ* nigræ, falcatæ, absque clavulis e rachi genitis, ut in T. *pedinicornis*. *Caput* nigrum,

palporum articulis binis tribusve primis luteis. *Thorax* niger, immaculatus, dorso nitente politissimo. *Halteres* nigri, basi rufi. *Abdomen* totum nigrum. *Alæ* hyalinæ, apice fusco, fascia antica obsoleta & puncto medio fuscis. *Femora* rufa, *genubus* nigris. *Tibiæ* fusco-rufæ.

Femina. *Antennæ* setaceæ, articulis 14. Dorsum tuberculo rufo, loco scutelli. *Alæ* apice non fuscae, linea in medio fusca. *Abdomen* apice rufum, basi nigrum, segmentis intermediis rufis, sed annulis fuscis invicem distinctis. *Femora* fusco-rufa. *Tibiæ* nigræ.

Cimicoides. 46. T. (la cimicoïde) antennis articulis quatuor, longitudine corporis.

Hab. in Europæ aquosis.

Desc. *Alæ* patulæ, pallide fuscae, vasis obscurioribus. *Halteres* petiolo cinereo, capitulo fuscescente. *Antennæ* erectæ, setaceæ, nigræ, villosulæ, 4 lineis longæ, articulis 4. *Thorax* niger, lineis longitudinalibus cinereis. *Abdomen* nigrum, villosulum. *Pedes* nigri, *femoribus* rufescentibus.

Boleti. 47. T. (du bolet) testacea, abdomine fasciis fuscis, alis annulo marginali fusco.

Hab. in Europa, inter lobos & plicas boleti.

Desc. *Caput* subrotundum nigrum, palpis longis colore pedum, occipite piloso. *Antennæ* attenuatæ, thorace duplo longiores, articulis 14. *Thorax* nigricans, gibbus, punctatus, antice pilosus. *Abdomen* fuscis testaceisque annulis alterne fasciatum. *Alæ* hyalinæ

patentes. *Halteres* colore pedum. *Pedes* testacei , villosuli.

Obs. Valde affinis *T. Fungorum* *D. de Geer*. Sed in hac alæ supra abdomen cruciatæ , in illa patentes. *V.*

Ex Faun. Fridr.

Aurea. 48. *T.* (la dorée) subfulva , alis patulis aureis , macula media & marginali subfusca.

Hab. in Europæ hortis.

Desc. Maxima.

Ex nost. Mus.

Transver- 49. *T.* (la transversale) thorace nigro fascia fulva transversa , pedibus fulvis.

t. 9. *f.* 4.

Hab. in Europa. In Bressia , sed haud frequens.

Desc. *Antennæ* nigrae , nodosæ , apice fulvæ. *Caput* nigrum. *Oculi* nigri. *Thorax* niger , fascia fulva utramque alam attingens. *Alæ* albæ , puncto fusco. *Abdomen* petiolatum , clavatum. *Pedes* fulvi , anticorum genua nigra.

** *Alis incumbentibus.* Culiciformes.

Plumosa. 50. *T.* (la panache) thorace virescente , alis hyalinis puncto nigro.

Scop. carn. 841.

It. Æland. 40 , 41 , 36 , 160.

Gæd. inf. 3. *t.* X.

Lisf. Gæd. f. 140.

Reaum. inf. 5. *t.* 5. *f.* 10.

— 4. *t.* 14. *f.* 12.

Frisch. inf. *t.* 11. *f.* 12.

Geoff. paris. p. 560. *n.* 16.

Fab. 31.

De Geer tom. 6. p. 359. n. 18. t. 19.

f. 14, 15. griseo-fulca, antennis filiformibus, maris plumosis, abdomine fasciis nigris, alis hyalinis puncto nigro.

Enum. n. 866.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 936.

Faun. Fridr. n. 681.

Hab. in Europa, imprimis in maritimis.
In Gallia Aust. V.

Desc. Hæc culice *pipiente* duplo major est. *Alæ* incumbentes, membranaceæ, puncto nigro in medio alæ, ad marginem exteriorum ex anastomosi duorum vasorum orto. *Corpus* fuscum, sed nuper exclusum omnino viride, præsertim ad latera thoracis versus abdomen; hirsuties vix ulla in toto corpore; incisurarum margines pallidiores. *Gibber* seu sacculus sub thorace. *Pedes* antiqui reliquis longiores, non tamen elevati. *Os* palpis incurvis, non pungens. *Mas* antennis plumosis ex pilis pallidis undique spectantibus & ano seu cauda elevata, bifida. *Famina*, antennis modo villosis, cauda non elevata, nec alis longiore.

Larva filiformis, longa, læte rubra, mollis, 12 articulis composita, cauda bifida. *Pedes* duo pone caput et totidem ante caudam, omnes absque unguibus, obtusi, apice pilis ciliati, in penultimo segmento paria duo cirrhorum filiformium pedibus ipsis longiorum.
Faun. 1758.

Littoralis. 51. T. (la maritime) virescens, alis immaculatis, pedibus anticis longissimis. *

Geoff. paris. p. 561. n. 17.

Reaum. inf. 5. t. 6. f. 12, 13, 14.

Aa iij

Fab. 43.

Faun. Fridr. n. 682.

Enum. n. 874.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 936.

Hab. in Europæ maritimis. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput, thorax & tria posteriora segmenta abdominis, fusca sive nigricantia. Abdomen teres, viride, exceptis articulis ultimis. Alæ albæ, immaculatæ. Pedes longi, ex parte albi. Antennæ maris plumosæ, fuscæ. Magnitudo culicis vulgaris. Pedum genicula nigricantia. Pedes antici longissimi. Faun. 1759.

Annulata. 52. T. (l'annulaire) livida, alis maculis tribus marginalibus nigris, abdomine nigro albo-annulato.

Fab. 41. cincta.

Hab. in Suecia. Lecta in meo Hammarby.

Statura tip. plumosæ f. littoralis. Caput parvum. Antennæ simplices, thorace fere breviores. Thorax lividus lineis 2 approximatis nigris & totidem exterioribus latioribus posterioribus. Alæ hyalinæ, margine exteriori maculis 3 nigris, quarum secunda fere in fasciam diducitur; complicatæ alæ videntur fasciis tribus constare. Abdomen nigrum, segmentis omnibus basi albidis, unde 5 s. 7 annuli albi. Totum corpus subtus, uti pedes, lividum.

*Motitatrix. 53. T. (l'agitée) pedibus anticis maximis moratoriis annulo albo. **

Frisch. inf. 21. t. 13.

Geoff. paris. p. 562. n. 18.

Fab. 32.

Enum. n. 872.

Müll. *Lin. Nat. cl. v. p. 938.*

Hab. in Europa frequens.

Desc. Corpus in aliis dilute viride, in aliis nigro & incarnato variegatum. A tergo thoracis lineæ tres, quarum intermedia brevior. Pedes antici duplo longiores, quos sedens erectos tenet & motitat instar antennarum, quas habet breves, in mare plumosas, non ita in foemina. Omnes *pedes* annulo nigro cinguntur. *Faun. 1760.*

Vibratoria. 54. T. (la vibrante) pedibus anticis maximis motatoriis apice albis. *

It. Œl. 160.

Fab. 37.

Scop. n. 857?

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Hæc antecedenti duplo major. Abdomen tenne, viride *Thorax* ater. *Pedes* albidii, sed antice versus basin nigri. *Antennæ* fuscæ, in mare plumosæ. *Faun. 1761.*

Tremula. 55. T. (la tremblante) pedibus anticis longissimis motatoriis nigris, annulis albis. *

Fab. 35.

Faun. Fridr. n. 689.

Hab. Upsaliæ. T. Bergman. In Bressia. V.

Desc. Oculi nigri. *Antennæ* pilosæ. *Thorax* pallidus, maculis tribus longitudinalibus nigris. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Abdomen* flavo-rubrum. *Faun. 1762.*

Flexilis. 56. T. (la souple) pedibus anticis motatoriis, omnibus pallidis, alis fasciâ fuscescente.

Fab. 36.

Geoff. inf. 2. p. 563. n. 19. pedibus antice maximis antenniformibus, motoribus, immaculatis.

Desc. Corpus minimum nigrum. *Antennæ* plumosæ. *Syst.*

Obs. Variat color. *Corpus* viride vel fuscum. In omnibus *thorax* lineatus, lineis tribus longitudinalibus, rubroluteis in prima, nigricantibus in altera. *Geoff.*

Monilis. 57. T. (la cerclée) pedibus albis annulis novem nigris, alis albo cinereoque variis. *

Geoff. paris. p. 564. n. 20.

Fab. 44.

Faun. Fridr. n. 683.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Magnitudo culicis vulgaris. *Alæ* albo cinereoque valde maculatæ. *Pedes* longi, nivei, singuli annulis circiter novem fuscis belle variegati, quibus ab omnibus facile distinguitur. *Faun. 1763.*

Virens. 58. T. (la verdâtre) viridis, alis immaculatis, plantis fuscis.

Hab. in Suecia. Henr. Gahn.

Similis fasciæ tip. plumosæ, sed minor.

Viridula. 59. T. (la vive) viridis, oculis fuscis, antennis verticulato-pilosis, pedibus pallidis.

Fab. 47.

Hab. in Suecia.

Corpus magnitudine pulicis, immaculatum. *Antennæ* thorace breviores. *Abdomen* angustatum.

Obs. Thorax antice parum ferrugineus. *Pedum articuli* nigri.

Macrocephala. 60. T. (la macrocéphale) virefcens, oculis thoracifque tergo nigris. *

Fab. 46.

Faun. Fridr. n. 884.

Hab. in littoribus humidis, agiliffima. In Breffia. V.

Antennæ breves, pilofæ, excepto ultimo articulo oblongo. Pedes longi, articulati annulis nigris, qui articulos terminant. Corpus pubefcens, pediculo minus. Abdomen incifuris 4, albis, lateralibus.

Desc. Vix pediculo major. *Ala* alæ incumbit, quafi unica efflet, nitida. *Corpus* fubflavum, a tergo thoracis nigrum. *Oculi* magni nigri, caput quafi nigrum efficiunt. *Antennæ* nigræ, articulis decem globofis. *Alæ* hyalinæ, nervis tribus, quorum marginalis cum apice intermedio jungitur; at nervus intimus verfus bafin marginis bifidus eft.

Faun. 1764.

Obf. Noftre *Syft.* descriptioni conformes. V.

Pufilla. 61. T. (la délicate) viridis, thoracis tergo maculis tribus nigris, antennis maris plumofis.

Fab. 48.

Hab. ad foffulas, choreas agens, paffim. *Corpus viride, longitudine pediculi. Abdomen filiforme. Thorax dorfo maculis tribus nigris, quarum media f. anterior bipartita. Pectus inter pedes gibbum nigrum. Antennæ fufcæ, plumofæ.*

Obf. Pectus inter pedes gibbum.

Marci. 62. T. (la St. Marc) nigra glabra, alis nigricantibus, femoribus anticis introrfum fulcatis, *

Reaum. inf. 5. t. 7. f. 17, 18.

Fab. 50. cum tipula hortulana.

De Géer tom. 6. p. 428. n. 33. atra tota, antennis brevibus subulatis, alis margine exteriori nigro, tibiis anticis spina terminatis.

Schæff. icon. t. 15. f. 1, 2.

Enum. n. 877.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 939.

Hab. in fimetis & terra prægnante primo vere.

Desc. Longitudo muscæ domesticæ, sed multo angustior. Totum corpus & artus omnes, nigra. *Antennæ* capite fere breviores, incurvatæ, boum cornua referentes, nigrae, singula septem articulis constat, quasi perfoliatæ essent, hinc brevissimæ; sub ore duo palpi inflexi. *Os* proboscis est, non aculeus. *Abdomen* maris lineare & atrum, foeminæ vero subtus flavescens, crassum. *Alæ* nigricantes, margine exteriori in medio nigrae, obscura macula, vel saltem margine ipso magis atro. *Thorax* glaber est, pone carinatus. *Alæ* incumbentes. *Femora* antica crassiora, interiore latere sulco longitudinali exarata. *Faun.* 1765.

Obs. Synonymia. *D. Geoff.* incerta.

1°. *D. Linnaeus* & *D. Schrank inf. paris.* non citaverunt amboque ad tipulam febrilem n°. 2. *D. Geoff.* retulerunt.

2°. *Tip. hortulana* & *Marci*, *le bibion de de St. Marc noir* & *le bibion de St. Marc rouge* una eademque species apud *D. Fab.* Hos duos bibiones, ut *D. Fab.*, copula junctos; semper vidi, præterea *T. Marci Mas* & foemina nigra reperiuntur; *T. hortulana* igitur non mera *Marci* varietas. V.

Thomæ. 63. T. (la Thomas) atra glabra , alis
nigris , abdominis lateribus linea
crocea.

Fab. 54.

Hab. in Europa. J. C. Fabricius. Prope
Lugdunum. V.

Simillima T. Marci. Antennæ longitu-
dine thoracis. *Distinctissima* linea ab-
dominis utrinque crocea.

Ferrugina- 64. T. (la rouillée) atra glabra , alis
fuscis , abdomine fusco-ferrugineo.

Fab. 49. cum tip. *brevicorni*.

Hab. in Europa Australi. In Gallia Aust. V.
Corpus structura T. Marci, sed minus.
Abdomen obscure ferrugineum.

Johannis. 65. T. (la St. Jean) atra glabra , alis
puncto nigro , tibiis pallidis , posticis
clavatis.

Fab. 51. nigra glabra , alis albis , puncto
nigro, antennis brevibus, pedibus nigris.

De Geer tom. 6. p. 425. n. 32. t. 27.
f. 12.-13. atra , antennis brevibus
subulatis , pedibus fœminæ rufis , alis
puncto nigro , tibiis anticis spina
terminatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. circa
Lugdunum. V.

Corpus culice pipiente minus , atrum.
Antennæ moniliformes , brevissimæ.
Thorax gibbus , immaculatus. Alæ
hyalinæ , stigmatè punctum fuscum men-
tiēte. Femora nigra. Tibiæ pallide
flavescentes , sed postici paris elon-
gatæ , clavatæ , compressæ.

Brevicor- 66. T. (la bordée) nigra glabra , alis
pallidis , margine nigris , tibiisque anticis
spina terminatis. *

Fab. 49. nigra glabra, alis margine nigricantibus, abdomine fusco, tibiis anticis spinosis.

De Geer tom. 6. *p.* 429. *n.* 35. nigra, antennis brevibus subulatis, abdomine foeminae flavo, alis obscuris, tibiis anticis spina terminatis.

Larva in terra.

Desc. Facies *T. Marci*, at magnitudo *Culicis pipientis*. Corpus nigrum, glabriusculum. *Antennæ* brevissimæ, filiformes. *Palpi* cauda longiores. *Abdomen* lineare. *Alæ* incumbentes, margine exteriori nigricante e lineis duabus crassioribus, quæ in medio maculam constituunt. *Pedes* postici abdomine paullo longiores. *Tibiæ* anticæ terminatæ spina gemina rigida, exteriori majore. *Faun.* 1766.

Obs. 1. *T. Ferruginata* alter sexus. V.

Obs. 2. Quiescit alis expansis abdomineque extenso. Variat tibiis anticis posticisque ferrugineis. *Fab.*

Putris. 67. *T.* (des immondices) fusca, alarum basi cinerea. *

Frisch. inf. 4. *t.* 22.

Faun. Fridr. n. 685.

Hab. in terra prægnante, primo vere. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo pediculi. *Tota* fusca. *Abdomen* glaucescens. *Antennæ* filiformes, longæ, 14 articulis constantes. *Thorax* gibbus. *Halteres* exalbidi. *Faun.* 1767.

Febrilis. 68. *T.* (la dépravée) atra oblonga hirta, alis nigricantibus. *

Gæd. inf. 1. *t.* 6.

List. Gæd. f. 108.

Pet. gaz. t. 14. *f.* 4.

Geoff. paris. 570. bibio. 2.

Fab. 55.

Enum. n. 878.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 941.

Hab. in locis suffocatis. In Gallia Aust.

Desc. Magnitudo muscæ domesticæ, sed magis oblonga, toto corpore & pedibus nigra, pilis hirsuta. Alæ dorso sibi invicem incumbunt, ac si unica esset ala; sunt etiam e membranaceo s. aquæ colore in nigredinem transeunte; certe margo alarum exterior omnino niger est. Faun. 1768.

Obs. Pro T. febrili D. Fab. iterum citavit le bibion de St. Marc noir, imitatus fuit D. Schrank & certe differunt. Tip. Marci & febrilis, nam prima glabra, 2 hirta. An sæpius apud ægros febre intermittente laborantes? V.

Florilega. 69. T. (la Flore) atra holofericea.

Reaum. inf. 5. t. 7. f. 7.-10.

Geoff. paris. p. 571. Bibio. 3.

Hab. in Pomonæ floribus, quos destruit.

Musca florilega nigra infesta florenti veri; hortos camposque suo flore spolians, spem anni exstinguens, hortis Belgii frequens. Swammerd.

Desc. Parva est, musca aterrima, holofericum superficie referens, mollis. Lente inspecta tota pilis tenuissimis densis vestita cernitur. Faun. 1769.

Hortulana. 70. T. (la Jardiniere) alis albis margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubro. *

Reaum. inf. 5. t. 7. f. 7.-10.

Geoff. paris. 2. p. 571. bibio. 3.

Fab. 50. alis hyalinis, margine exteriore nigro.

Hab. in Asparago & Pomonæ floribus ,
quorum pestis est.

Desc. Magnitudo muscæ domesticæ. Caput
parvum , nigrum. Thorax & abdomen
rubra , glabriuscula ; ubi abdomen
jungitur thoracis nigredo a tergo ad-
paret. Alæ albæ , sed margo crassior
longitudinalis ater est. Pedes nigri.
Femora longa. Sexus variat ; alter
totus ater est , sed femora longa &
crassiuscula. Faun. 1770.

Obs. Uterque sexus Linnæo cognitus
synonymiaque Syst. DD. de Geer,
Schränk.que confirmata. V.

Phalænoi- 71. T. (la phalénoïde) alis deflexis cinereis
des. reis ovato-lanceolatis ciliatis. *

Scop. carn. 864.

Leuw. epist. 1692. jan. 24. f. 2 , 3.

Frisch. inf. II. t. II.

Geoff. parif. p. 572. bibio. 4.

Fab. 62.

De Geer tom. 6. p. 422. n. 30. t. 27.
f. 6.-9. hirsutissima cinerea , antennis
nodosis , alis deflexis ovato-lanceo-
latis , hirsutissimis , ciliatis , imma-
culatis.

Enum. n. 883.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 942.

Faun. Fridr. n. 686.

Hab. in parietibus ad sterquiliniam. In
fenestris circa Lugdunum capta. V.

Desc. Minima est. Alæ ratione magni-
tudinis maximæ , ad latera deflexæ ;
ut in phalænis ; lanceolato-ovatæ ,
undique ciliatæ , striatæ , acutæ. An-
tennæ filiformes , cinereæ , articulis II
nigricantibus , globosis constructæ.
Faun. 1771.

Obs. Mirandum animal , si lente obser-

vetur. Non rarum. Humidorum locorum
vel latrinarum muros agile percurrit.

Hirta. 72. T. (la hérissée) hirsuta, alis deflexis
ovatis ciliatis albo nigroque tessellatis.*

Fab. 61.

De Geer tom. 6. p. 44. n. 31. t. 27.
f. 10, 11. hirsutissima nigro-cinerea,
antennis nodosis, alis deflexis ovatis,
hirsutissimis, ciliatis, nigro maculatis.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 572. n. 5.

Hab. in archio lappa.

Desc. Statura T. *phalænoidis*, sed alæ
dense tomentosæ ut in *phalænis*, ala-
rum margine omni hirsuto s. ciliato.
Antennæ filiformes, longitudine fere
corporis, verticillatim villosæ. *Syst.*
Faun. 1772.

Obs. Alæ squamosæ, sed non acutæ. V.

Perficariæ. 73. T. (de la persicaire) atra alis incum-
bentibus subciliatis.

Fab. 63.

Hab. sub persicarizæ amphibizæ foliis revo-
lutis rubris. *Petr. Hernquist.*

Corpus paullo majus pulice, totum cum
alis incumbentibus pellucidis atratum.
Alæ subciliatæ. *Antennæ* corpore triplo
breviores, moniliformes. *Pedes* longi-
tudine corporis.

Notata. 74. T. (la marquée) atra, alis albis,
abdomine lateribus antice macula alba.*

Faun. Fridr. n. 687.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. *Musca domestica* minor. *Thorax*
glaber, cum toto corpore ater. *Ant-*
ennæ 11 articulis, quasi perfoliatæ:
punctum unum utrinque in singulo la-
tere abdominis: juxta pectus album.

Margo thoracis interdum albus confpicitur, quasi lineola arcuata, reliqua omnino atra. *Faun.* 1773.

Juniperina. 75. T. (du génévrier) alis incumbentibus glaucis, margine tenuiore villoso.*

Fab. 60. cinerea, alis albis, margine villoso.

De Geer tom. 6. p. 404. n. 26. fusca, antennis nodosis, alis ovatis hirsutis, costis tribus.

Enum. n. 884 an?

Hab. in Juniperi triglochide, quam causat; quæ in gallis rubris piliformibus petiolorum populi tremulæ vix differt.

Desc. Facies culicis. Pedes animalculo longiores. Antennæ setaceæ five moniliformes, articulis circiter 14 globosis, remotis, pilis aliquot vagis ornatae. Caput minimum. Oculi nigri. Thorax & abdomen fusco-rufescentia; humeri gibbi. Alæ membranaceæ, margine exteriori nigricante, præter nervos in singula binos; at margo alarum exterior villosus est. Halteres sub alis, ut in reliquis.

Obs. 1. *Frisch.* *Germ.* 4. p. 38, t. 21. musca vermis rubri gemmarum salicis multa communia cum nostra habet, ut dubitemus an specie diversa; quum larvæ puppulae & tipulae ipsius plurima attributa eadem & margo alarum interior hirsutus.

Obs. 2. Ex ovo deposita in apicibus ramorum juniperi enascitur ibidem æstate quoddam triglochin (quo Smolandi in tussi ferina utuntur) constans foliis tribus crassioribus, conniventibus ventricosis, ore patulis, intra quæ tria alia foliola, minima, exacte conniventia, ne aerem admittant,

admittant, includentiā larvam rubram, quæ Majo mense in puppulam rubram, alis nigris, pedibus albis mutatur & hæc in tipulam; quæ sæpe consumitur ab *ichneumone juniperi*. Gallæ istæ rubræ in foliis & petiolis populæ tremulæ, magnitudinē pisorum, etiam muscam, juniperi & salicis simillimam & forte eandem, producunt; sed hanc sufficienter non examinavi. *Faun.* 1774. *Obs.* An hoc remedium vere tussicarium est? Experimentum sapiente medico dignissimum. V.

Culicifor- 76. T. (la culiciforme) cinerea, pedibus
mis. pallidis, alis maculis duabus nigricantibus.

Fab. 64.

Enum. n. 869.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 943.

Hab. in Suecia. In Gallia Aust. non Gregaria. V.

Simillima culici pipienti, sed dimidio minor. Thorax gibbus. Alæ hyalinæ, macula antica nigra, postica fusca. Pedes pallide ferruginei.

Incarnata. 77. T. (l'incarnat) incarnata, antennis mediocribus.

Hab. in Europa, Upsaliæ.

Corpus, exceptis oculis nigris, incarnatum.

Alæ incumbentes. Antennæ articulis 12, corporis longitudine. Pedes longi.

Palustris. 78. T. (des marais) atra; abdomine rufescente.

Fab. 65. pallida, capite atro, abdomine rufescente.

Faun. Fridr. n. 688.

Enum. n. 879. hæmorrhoea?

Insect. Tomus III.

25

Beytr. Zur. nat. p. 93. §. 62?

Hab. in Europæ paludosis. In Bressia. V.

Desc. Hæc omnium minima, vix pulicis magnitudine; grandinis instar copiosa supra aquas, lacus & paludes æstate volitat. Alæ huic incumbentes. Abdomen ovatum. Faun. 1775.

Longicor- 79. T. (la longicorne) antennis corpore
nis. incarnato longioribus. *

Fab. 66.

Hab. in Europa.

Desc. Minima est & pulice fere minor. Caput nigrum, fronte albida. Thorax a tergo fuscus. Antennæ & pedes nigri longi. Alæ abdomine longiores membranaceæ, incumbentes. Antennæ corpore & alis sesqui longiores. Faun. 1776.

Rufipes. 80. T. (la rufipede) atra, pedibus rufis,
alis medio nigris, basi flavescens. *

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo pulicis. Corpus atrum. Antennæ pallidæ, villosæ. Alæ incumbentes, basi flavescens, ceterum fusco hyalinæ, in medio macula s. fascia tota nigra. Pedes, exceptis plantis primis, rufi; anteriores longiores. Faun. 1778.

Bipunctata. 81. T. (la bipoñctuéé) fusca, alis cinereis,
puncto marginali albo.

Hab. in Europa: in meo Sæsia; salit ut ichneumon minutus in gyros obvolitans.

Corpus pulice minus, fuscescens. Alæ cinereæ, incumbentes: punctum ad medium marginis exterioris nivcum basique alarum albida. Halteres albi. Thorax lavis, ater. Abdomen ovatum.

Sericea. 82. T. (la soyeuse) nigra , dorso atro , thoracis lateribus calvis , halteribus flavis.

Fab. 67.

Hab. in Eurôpâ , Suécia. Chœreas agit in aere volatu flexuoso rapidoque.

Statura mûscæ. Pediculo paullo major.

Corpus nigrum. Dorsum thoracis & abdominis atra , quasi holofericea. Thorax lateribus lunula calva & apice calvo. Abdomen utrinque punctis duobus calvis ; omnis calvities , certo respectu , licet nigra , adparet alba. Antennæ filiformes , vix capite longiores. Oculi ænei. Alarum costa antica nigricans. Halteres lucide flavi. Tibiæ posticæ longiores , clavatæ , quasi saltatoriæ.

Minutissi- 83. T. (l'imperceptible) flava , oculis vertice concurrentibus nigris.

Enum. n. 880.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 945.

Hab. ad Suéciæ fossas.

Corpus dimidio pulice minus , totum flavum. Alæ & pedes hyalini. Antennæ moniliformes , corpore breviores , fuscescentes. Halteres flavi. Oculi nigri , vertice concurrentes nigredine.

Pulicaris. 84. T. (la puce) nigra , thoracis lateribus scutello abdomineque flavis.

Fab. 68.

Hab. ad fossas Europæ. In Gallia Aust. V.

Corpus pulice dimidio minus. Antennæ corpore breviores nigra. Thorax subglobosus , lateribus utrinque linea flava. Abdomen ovatum , flavum. Halteres flavi ; reliqua nigra.

Bb ij

Pennicor- 85. T. (la plume) antennis bipectinatis ;
nis, corpore atro , halteribus albis. *

Fab. 69.

Hab. in Suecia.

Desc. Pulice minor , angusta. *Corpus* aterrimum. *Faun.* 1777. *Thorax* aterrimus. *Syst.*

Obs. *Antennæ* maris bipectinatae , fœminæ moniliformes.

Ex spec. D. Fab.

Fascicula- 86. T. (la fasciculée) nigra , pedibus anticis
ta. maximis , motatoriis nigris , abdominis

lateribus ferrugineo maculatis. *Tip.* 33.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Parva. *Antennæ* fuscae fasciculato-plumosæ. *Corpus* nigrum , abdominis lateribus ferrugineo maculatis. *Pedes* nigri , anticis longioribus basi ferrugineis. *Alæ* albæ , puncto parvo fusco.

Tendens. 87. T. (la rusée) ferruginea , alis albis
immaculatis , pedibus anticis longissimis pallidis. *Tip.* 34.

Hab. in Daniæ paludosis.

Desc. *Statura* T. *littoralis*. *Corpus* ferrugineum. *Alæ* immaculatæ & *pedes* omnes pallidi.

Stictica. 88. T. (la bigarrée) nigra , abdominis
segmentis apice albis , alis puncto
fusco. *Tip.* 38.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. *Affinis* tip. *cinclæ*. *Caput* parvum , nigrum. *Thorax* niger cinereo lineatus. *Abdomen* nigrum , segmentorum apicibus elevatis , niveis. *Alæ* albæ , puncto unico centrali fusco. *Pedes* albo nigroque varii.

Pallida. 89. T. (la pâle) pallida pilosa , pedibus nigro punctatis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Statura & magnitudo præcedentis. *Antennæ* fasciculatæ , pallidæ. *Thorax* pallidus, immaculatus. *Abdomen* pilosum , pallidum , segmentorum apicibus obscurioribus. *Alæ* pallidæ , immaculatæ. *Pedes* pallidi , punctis numerosissimis nigris.

Flabelli- 90. T. (l'éventail) pallida , abdomine
cornis. nigro , annulato , alis maculatis. Tip. 40.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Affinis præcedenti , at *Alæ* maculatæ & *pedes* omnino immaculati.

Zonata. 91. T. (l'entourée) pallida , alis fasciis duabus punctisque tribus fuscis , femoribus angulo fusco. Tip. 45.

Hab. Oxoniæ.

Desc. Magnitudo culicis. *Antennæ* breves, pilosæ. *Caput* & *thorax* pallida , oculis nigris. *Abdomen* pallidum , striis tribus dorsalibus punctorum fuscorum. *Alæ* albidæ , fasciis duabus mediis fuscis , quarum posterior dentem obtusum emittit. Puncta tria fusca , marginalia versus apicem. *Pedes* longiores , pallidi , *femoribus* , annulo apicis nigro.

Pomona. 92. T. (la fruitiere) nigra glabra , alis hyalinis , puncto nigro , femoribus ferrugineis. Tip. 52.

Hab. in Pomonæ floribus Angliæ , Norwagiæ.

Desc. Statura T. *Johannis. Atræ* , glabra. *Alæ* puncto nigro. *Tibiæ* pallidæ. *Femora* ferruginea.

Forcipata. 93. T. (la prolongée) abdomine cylindrico, atro, alis fusco-hyalinis, ano appendiculato. Tip. 58. t. 9. f. 6.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva. *Antennæ* subulatæ, multo articulatae. *Corpus* glabrum, nigrum immaculatum. *Alæ* hyalinæ, costâ obscuriore. *Anus*, appendiculis duobus clavatis.

Vernans. 94. T. (la vernale) cinerea, thorace nigro lineato, alis albis fusco-maculatis. Tip. 59.

Hab. primo vere, in Daniæ pratis.

Desc. *Thorax* cinereus, lineis nigris. *Abdomen* ferrugineum, lineis duobus punctorum fuscorum. *Alæ* albæ, fusco-maculatæ. *Anus* appendiculis duobus clavatis.

Pilicornis. 95. T. (la pilicorne) nigricans, pedibus anticis maximis, motatoriis, thorace lineato, alis albis immaculatis. Tip. 39. *Mantiss.*

Hab. Kilicæ. D. Daldorf.

Desc. Statura omnino T. Fasciculata, at paullo major. *Antennæ* magnæ, fasciculato-plumosæ. *Thorax* obscure cinerascens, nigro lineatus. *Abdomen* nigrum. *Alæ* albæ, omnino immaculatæ. *Pedes omnes* nigri.

Varia. 96. T. (la variée) fusca, pedibus anticis elongatis, abdomine flavescente, alis albo nigroque variis. T. 45. *Mantiss.*

Hab. Kilicæ.

Desc. Media inter congeneres. *Caput* & *thorax* fusca immaculata. *Abdomen* flavum. *Alæ* albo fuscoque valde variegatæ. *Pedes* flavescents, antici parum elongati.

Pilicornis. 97. T. (la pilicorne) fusca , thoracis linea laterali pedibusque albidis immaculatis.

Hab. Hafniæ. *D. Lund.*

Desc. Summa affinitas T. *pallidæ* , at pedes omnino immaculati. *Antennæ* flavellatæ. *Alæ* ciliatæ , albidæ.

Geniculata. 98. T. (l'agenouillée) subtus flavescens , thorace , lineis , abdomine , dorso , nigris , alis albidis immaculatis. Tip. 58. *Mantiss.*

Hab. Kiliæ. *D. Daldorf.*

Desc. Corpus parvum flavescens. *Caput* flavescens. *Thorax* supra lineis tribus nigris , lateralibus marginem anticum haud attingentibus. *Abdominis* dorsum nigrum. *Alæ* albæ , immaculatæ. *Pedes* pallescentes , geniculis nigris.

Pallipes. 99. T. (la pallipede) glabra fusca , alis hyalinis immaculatis , pedibus pallescentibus. Tip. 59. *Mantiss.*

Hab. Kiliæ.

Desc. Parva. *Corpus* totum fuscum , immaculatum. *Alæ* hyalinæ , nitidæ. *Pedes* pallescentes.

Chrysan- 100. T. (du chrysanthème) atra glabra ,
themi. abdomine basi rufo , antennis incrassatis pilosis. Tip. 66. *Mantiss.*

Hab. in Hispaniæ chrysanthemo coronario. *D. Valh.*

Desc. Statura omnino & magnitudo T. *Thomæ*. *Caput & thorax* nigra , glabra , immaculata. *Abdomen* cylindricum , basi rufum , apice nigrum. *Alæ* obscuræ. *Pedes* nigri. *Antennæ* singulares vix hujus generis , articulo primo majori , cylindrico , crassiori , piloso , secundo breviori subulato.

Ex Enum.

Verna. 101. *T.* (la vernale) alis hyalinis , fasciis duabus punctoque fusco.

Beytr. Zur. nat. p. 93. §. 61.

Hab. in Europa.

Obs. An T. vernante D. Fab. diversa ?

Puppiva- 102. *T.* (l'errante) alis fuscis , maculis tribus fasciisque duabus albis.

Beytr. Zur. Nat. p. 1.

Hab. in aquis pigris usque ad declarationem.

Ichneumo- 103. *T.* (l'ichneumon) nigra sericea , alis albis , puncto marginali nigro , pedum pulvilis albis.

Hab. in Europa.

Desc. Tota hirta ex pilis cinereis. Pedes postici longiores.

Berberina. 104. *T.* (de l'épine-vinette) alis incumbentibus fuliginosis , basi margineque macula albis.

Hab. in berberidis strumosis excrescentiis , ramulis prioris anni innatis.

Desc. Magnitudo tipulæ phalænoidis , uti & habitus , sed alæ incumbentes , nec deflexæ.

Puppa rubra , antennis setiformibus instructa.

Tipula alis invicem impositis , quasi unica esset. *Antennæ* articulis circiter 20 , moniliformes , singulis articulis corona ex ciliis brevibus verticillatis. *Alæ* fuliginosæ , latere interiore ciliatæ , basi & in decursu marginis exterioris macula nivea , tectæ totæ squamulis ovoidibus. *Abdomen* cum thorace rubrum.

Ex oper. D. de Geer.

Hiemalis. 105. T. (l'hiémale) nigro-fusca, antennis longis setaceis, alis amplissimis, pedibus longissimis.

Hab. in Europa.

Obs. Ano affinis T. *forcipatæ* D. Fab. Apparitio ut T. *regelationis*. utrumque sexum descripsit D. de Geer. An species diversa ?

Fungorum. 106. T. (des champignons) rufo-fusca, antennis filiformibus, simplicibus, abdomine ovato, coxis longissimis, tibiis spinosis.

Hab. in boleto luteo.

Larva alba, cylindrica, capite nigro, antennis conicis.

Desc. Caput inclinatum. Oculi nigri. Thorax crassus, rotundatus. Antennæ thoracis longitudinem æquantes, elevatae, curvæ. Abdomen basi tenue, in medio latum, apice acutum. Coxæ femoris longitudine.

Agarici. 107. T. (de l'agaric) nigra, antennis filiformibus simplicibus, thorace rufo, pedibus flavis, coxis longissimis, tibiis spinosis.

Hab. in agaricis.

Larva griseo-albida, longa, cylindrica, utroque apice acuminata, nerens ut phalænæ.

Desc. Affinis præcedenti. Agilis. Nigra sunt, antennæ, caput, abdomen, tarsique. Thorax fusco-luteus. Pedes, femora, tibiæ, ochraceata. Halteres citrini. Alæ nigricantes.

Culicifor- 108. T. (tipule - cousin) fusca , antennis
mis. filiformibus , maris plumosis , abdomine

pedibusque griseis , costis alarum hirtis.

Hab. in Europa.

Larva culicis larvæ affinis , sed positio
horizontalis & non verticalis.

Desc. Antennæ maris jucunde plumosæ.

Oculi nigri. Alæ hyalinæ , nervis
pilosis. Abdomen longum , cylindricum.

Anus forcipatus. Pedes longissimi.

Pedella. 109. T. (la bedeaude) nigra , antennis fili-
formibus plumosis , abdomine viridi
apice nigro , alis hyalinis , pedibus
griseis nigro maculatis.

Hab. in Europa.

Desc. Griseo - fusca. Alæ hyalinæ , ni-
griantes , puncto nigro abdomine bre-
viores. Antennæ maris plumosæ , fæ-
minæ simplices.

Amphibia. 110. T. (l'amphibie) nigra , antennis fili-
formibus simplicibus , costis alarum
villosis.

Reaum. Ad. acad. reg. parif. anno. 1714.
p. 203.

Hab. in Europa.

Larva in aquis extraque aquas , caudata.

Puppa obscure fusca.

Desc. Parva. Oculi magni , nigri. Caput
rostratum. Halteres incrassati. Alæ albæ ,
nervis villosis. Pedes longi , hirsuti ,
duobus unguibus terminati.

Cryfalli- 111. T. (la crystalline) griseo - cinerea ,
na. antennis filiformibus , maris plumatis ,
corpore villoso , thoracis lateribus
fusca , pallide grisea.

Reaum. inf. tom. 5. p. 40. - 43. t. 6.
f. 4. - 15.

Hab. in Europa.

Larva alba, diaphana, in aquis non facile distinguitur.

Desc. Culice minor. *Antennæ* in uno sexu plumosæ, in altero simplices. *Thorax* nigricante-griseus, lateraliter albo-griseo strigatus. *Alæ* griseæ. *Corpus* villosum.

Nigra- 112. T. (l'aquatique-noire) nigra, antennis filiformibus, maris plumatis, alis albis abdomine brevioribus, puncto nigro, pedibus anticis longioribus.

Hab. in Europa.

Desc. Parva, nigra. *Alæ* albidæ, abdomine breviores, puncto nigro. *Antennæ* maris pilosæ, *fæminæ* brevès filiformes. *Pedes* anteriores aliis longiores. volando acute stridula.

Stercora- 113. T. (du fumier) nigra, antennis filiformibus, maris plumatis, alis niveis totis.

Hab. in Europa.

Larva a poda serpentiformis, saltatrix.

Desc. Parva, nigra. *Antennarum* barbæ superiores albidæ, interiores nigræ. *Alæ* lacteæ. *Corpus* pilosum.

Pini. 114. T. (du pin) nigro-fusca, antennis longis villosis, collare rubro, pedibus argenteis, alis ovatis hirsutis, costis tribus.

Hab. in pino.

Larva rubra.

Desc. Parva. *Antennæ* maris longitudine corporis, nodosæ, nodis fasciculatis. *Collum* rubrum. *Alæ* amplæ, albæ, basi rubellæ, pilosæ, pulchre certo situ coloratæ. *Anus* maris forcipatus.

Fæminæ alæ nigricantes ; antennæ articulis ovalibus. Affinis T. Juniperinæ.

Loti. 115. T. (du lorier) nigra, antennis longis nodosis, alis ovatis hirsutis, costis tribus.

Hab. in Europa, in loti corniculatæ floribus.

Larva albido-lutea, a poda.

Desc. Affinis T. Juniperinæ, sed minor.

Antennæ nodosæ. Alæ opalideæ, hirsutæ, cruciatæ. Halteres clavati.

Abdomen crassum, fusiforme.

Marci- 116. T. (de St. Marc à cuisses rouffes) fulvipes. nigra, antennis brevibus subulatis, femoribus rufis, alis albis, tibiis anticis spina terminatis. t. 9. f. 7.

Hab. in Europa.

Desc. Affinis T. Marci. Femora in utroque sexu rufa.

Latrina- 117. T. (des latrines) nigra, antennis brevibus subulatis, abdomine ovato, alis albis costis duabus nigris, tibiis muticis.

Hab. prope latrinas. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra. Latera thoracis abdominique viride maculata. Antennæ breves, claviformes, thoracis longitudine. Alæ albæ, abdomine longiores.

Erythroce- 118. T. (l'erytrocéphale) nigra, cinereo-albido maculata, antennis brevibus subulatis, corpore brevi, capite magno rubro.

Hab. in Europa.

Desc. Parva. Muscis similis. Corpus nigrum, cinereo maculatum. Oculi

magni, fusco-rubri. *Alæ* amplissimæ, certo situ opalidæ. *Antennæ* nigrae, cylindraceæ. *Pedes* nigri; *tibiæ* latere anteriori argenteo-albæ.

Ex Inf. paris. Entom. que paris.

Tessellata. 119. T. (la marquetée) alis albo fuscoque tessellatis, corpore fusco.

Hab. in Europa. In pratis.

Desc. Parva. *Caput* parvum, rotundatum, nigrum. *Antennæ* nigrae, breves. *Corpus* livido-fuscum. *Alæ* maculis fuscis, alternis.

Fasciata. 120. T. (la verte) viridis, alarum fascia transversa fusca.

Hab. in Europa.

Desc. Minuta. *Tota* viridis aut viridescens. *Alæ* abdomine longiores, fascia lata fusca.

Obs. Affinis T. *virentis*, sed *alæ* fasciatæ. V.

Punctata. 121. T. (la quadriponctuée) fusca, alis albis puncto quadruplici fusco.

Reaum. inf. tom. 5. t. 5. f. omnes.

Hab. in Europa. In vitris domorum.

Larva rubra, brachiis filiformibus 6.

Desc. *Mus* fuscus, *antennis* plumosis.

Fæmina minus fusca. *Thorax* tribus lineis fuscis. In omnibus *alæ* albæ, in singula puncta quatuor fusca.

Reticulata. 122. T. (la réticulée) fusca, alis albis fusco reticulatis.

De Geer tom. 6. p. 394. n. 23. t. 24. f. 15.-19. cinerea nigro maculata, *antennis* clavatis, *maris* plumatis, alis albidis, maculis pallide nigris.

Hab. in Europa. In aquis stagnantibus.
Larva filiformis, tortuose natans.

Desc. *Antennæ* maris hirtæ. *Alæ* pulchre maculatæ. *Pedes* longi, cinerei, nigro variegati. *Halteres* luteo - albi. *Tota* villosa.

Immacula-123. T. (l'immaculée) atra, alis nigris.

Hab. in Europa. In hortis.

Desc. *Corpus* obscure nigrum; *mas.* *Femina* lutea, brevior. *Oculi* nigri. *Alæ* in omnibus lacteæ.

Variegata. 124. T. (la variée) luteo fuscoque variegata, pedibus nigris, tibiis albis.

Hab. in Europa.

Desc. *Caput* luteum supra fuscum. *Oculi* nigri. *Thorax* quatuor maculis fuscis, quarum una antice, altera postice, aliæ laterales. *Abdomen* fasciis luteis fuscisque alternis. *Pedes* nigri; *tibiæ* intermedie albæ.

Conica. 125. T. (la conique) atro-fusca, alis nigris; abdomine conico acuto.

Hab. in locis humidis domorum & hortorum.

Desc. Nigra. *Antennæ* filiformes. *Alæ* nigricantes. *Abdomen* crassum conicum. *Mas* foemina dimidio minor. *Muscæ* similis.

Scathopse. 126. T. (le scatopse) nigra, alis incumbentibus hyalinis.

Enum. n. 881, antennis moniliformibus.

Hab. in latrinis; diebus sæpe pluribus in copula perseverat. Tardum animal.

Desc. Nitido-nigra. *Antennæ* moniliformes, 11 articulis. *Alæ* abdomine multo longiores, nervo unico.

Buxi. 127. T. (du bouis) flava, capite thoraceque nigris, alis fuscis incumbentibus.

Geoff. Scatopse 2.

Enum. n. 882.

Beytr. Zur. nat. p. 55. §. 8.

Hab. in buxo.

Desc. Minuta. Oculi nigri. *Antennæ* fuscescentes. *Thorax*, *abdomen* pedesque lutea. *Alæ* albæ, corpore longiores.

Obs. Larva lutea.

Ex entom. Carn.

Obs. *Antennis* & non alarum situ tipulas ordinavit D. Scopoli, inde ad divisiones Linnæi plerasque non retuli.

Lacustris. 128. T. (des lacs) nigra, antennis plumatis, extimo articulo crassiore albisque villis adperso.

Hab. circa lacus. In Bressia frequens.

Desc. Statura T. *plumosæ*, sed nigra tota. *Alæ* hyalinæ absque puncto. *Abdomen* segmentis villosis, latere pallidioribus. *Femora* rufescentia. Recens nata, spumam albam pone thoracem, loco scutelli gerit. Majo M.

Graminea. 129. T. (des graminées) luteo-virens, antennis plumatis, alis pedibusque albidis.

Hab. in herbidis udis.

Desc. Parvula. *Antennæ* albidæ, hyalinæ. *Alæ* immaculatæ. *Abdomen* villosum. Aprili M.

- Convall- 130. T. (du muguet) antennis plumatis ;
 lium. albidis ; thorace rufo , abdomine fusco
 piloso.
Hab. fœcus rivulos , fruticibus insidet.
 Junio M.
Desc. *Abdominis* segmenta 1 , 4 albida ;
 colore pedum. *Alæ* hyalinæ , imma-
 culatæ. *Oculi* nigri.
- Chirothe- 131. T. (la gantée) nigra ; palmis pedum
 cata. albis , alis fuscis , hyalinis.
Hab. in Carniolæ Superioris sylvestribus
 & aquosis.
Desc. *Antennæ* setaceæ. *Thorax* laterali
 linea pallida. *Abdomen* nigrum. *Pedes*
 an motatorii fuerint , non adnotavi ,
 sed statura & habitus removet a mo-
 tatricibus. *Tipula vibratrix* Lin. plu-
 ribus notis a nostra differt. *Mas.*
- Ferrugi- 132. T. (la ferrugineuse) tota ferruginea ,
 nea. oculis nigris , alis hyalinis , basi puncto
 ocellari.
Hab. in Europæ.
Desc. *Caput* villosulum. *Antennæ* breves ;
 attenuatæ. *Abdomen* subtusque punctis
 fuscescentibus in unum feriem dispositis
 lineatum. *Alæ* basi puncto oblongo s.
 annulo fusco.
- Fasciata. 133. T. (la fasciée) alis hyalinis , fasciis
 duabus fuscis obsoletis , abdomine
 nigro.
Hab. in Europæ paludosis.
Desc. *Antennæ* utrique sexui setaceæ ;
 quibus differt a T. *idriensi*. *Halteres*
 pallidi. *Femora* flavescencia.
- Inquieta. 134. T. (l'inquiète) alis hyalinis , punc-
 tis 4 marginalibus fuscescentibus ,
 pedibus

pedibus anticis longissimis, motoriiis.

Hab. in pratis paludosis, umbrosis, sylvestribus.

Desc. *Oculi* nigri. *Antennarum* articuli apicibus nigris. *Corpus* ferrugineum. *Pedes* pallide ferruginei. Huic similis in omnibus, sed alis unico puncto obsoleto.

Fenestra- 135. T. (des fenêtres) alis hyalinis fusco maculatis, abdomine fasciis fuscis 6, pedibus ferrugineis, geniculis fuscis.

Faun. Fridr. n. 705?

Hab. in Europa. In fenestris intra cubilia frequens, ex hortis involans.

Desc. *Alæ* costæ, inter duas maculas fuscas marginales majores, flavescens. *Oculi* subvirides. *Abdomen* ferrugineum, fusco fasciatum, villosulum.

Degener. 136. T. (l'intruse) antennis articulis 24 pilosis.

Hab. in aquosis, Junio M.

Desc. *Caput* inflexum. *Oculi* nigri. *Alæ* immaculatæ, pallide ferrugineæ, costæ pilosa. *Color* totius corporis lateritius.

Hemero- 137. T. (l'hémérobioïde) nigra, alis hyalinis, nigricantibus, abdomine linea fulva laterali.

Hab. in fruticibus non rara, hemerobio similis.

Desc. *Alæ* immaculatæ. *Femora* atrorufa; *Succum* fulvum læsa fundit.

Labacen- 138. T. (la jaune) flava, thorace lineis tribus longitudinalibus nigris, abdomine fasciis 4 nigris, binis mediis approximatis.

Hab. in Europa.

Desc. Oculi nigri. Subtus tota flava; Alæ albidæ, immaculatæ. Pedes genibus palmisque nigris. Pedus ad latera punctis duobus atris.

Quadri- 139. T. (les quatre nœuds) virens, antennarum articulis 4, oculis nigris.
nodia.

Hab. in Europa, circa hortos, Junio M.

Desc. Linea paullo longior. Alæ immaculatæ. Abdomen villosum.

Ex Faun. Fridr.

Spinata. 140. T. (l'épineuse) nigra nitida, alis immaculatis, tibiis anticis spinatis.

Hab. in arvis.

Iris. 141. T. (l'iris) flava, alis hyalinis, puncto marginali duplici.

Hab. in Europa.

Veris. 142. T. (la précoce) viridis, alis albis, thorace tribus maculis lutescentibus.

Hab. in Europa.

Desc. Culice minor.

Tenera. 143. T. (la délicate) anticis plumosis, thorace luteo, abdomine virescente.

Hab. in Europa.

Plicata. 144. T. (la papillaire) alis deflexis lacteis, puncto nigro, abdomine plicato-pappilloso, pedibus luteis.

Hab. in Europæ hortis.

Velata. 145. T. (la hérissée) alis hyalinis, margine subfusco, thorace abdomineque lutescente.

Hab. in ripa.

Flavicans. 146. T. (la jaunâtre) antennis moniliformibus , alis macula nigra , abdomine flavo , articulis duobus nigris.

Hab. in Europæ pratis.

Riparia. 147. T. (des rivages) flava , antennis fetiferis , oculis viridibus , alis lunula alba.

Hab. in Europæ ripis.

Bilineata. 148. T. (la doublée) nigra , alis lacteis ; costa marginali duplici punctoque medio nigro.

Hab. in Europa.

Atomata. 149. T. (la ponctuée) alis fusco punctatis ; corpore cinereo , pedibus flavis , geniculo nigro.

Hab. in Europa.

Lineata. 150. T. (la rayée) alis immaculatis ; abdomine fasciis tribus longitudinalibus luteis , punctis nigris.

Hab. in Europæ ripis.

Obs. Tipularum genus in duo genera divisit clariss. Geoff. tipula & bibio : sed character , e sola antennarum differentia sumtus , ad novum genus condendum , minus valet quam plures æstimant. Fab. V.



GENUS III.

MUSCA. Os proboscide carnosâ, labiis 2 lateralibus.
Palpi nulli.

Filatæ, antennis simplicibus absque filo laterali.

Plebeia. 1. M. (la Plébéienne) antennis filatis
 subulatis, corpore cinereo hirtâ, ab-
 dominis incisuris margine albidis. *

Fab. bibio 5. cinereo hirtâ, abdomine
 conico, segmentis margine albis.

Enum. n. 890.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 950.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

*Variat thorace flavescente abdomineque
 ferrugineo.*

*Desc. Media. Corpus nigrum, hirtum. Oculi
 brunnei. Alæ & tibiæ subtestaceæ. Abdo-
 men conicum, hirtum, segmentorum
 marginibus pallidis. Faun.* 1779.

Chamæleon. 2. M. (chaméléon) antennis filatis cla-
 vatis, scutello bidentato luteo, abdo-
 mine nigro, fasciis lateralibus luteis. *

It. Wgoth. 84.

Gæd. inf. 1. t. 70.

Swamm. metam. t. 4.

Muscæ distinguuntur antennis inermibus l. armatis.

Filatæ antennis absque seta aut pluma laterali.

Armatae antennis cum seta aut pluma laterali.

- Tomentosæ corpore pubescentes, sæpe vix manifestæ.

- - Plumatis antennis pedinatis.

- - Setariis antennis simplici seta.

- Pilosæ raris setis, imprimis in thorace conspicuis.

- - Plumatis antennis.

- - Setariis antennis.

— bibl. t. 42. f. 1.

Frisch. inf. 5. t. 10.

Reaum. inf. 4. t. 25.

Ræf. inf. musc. 2. t. 5.

Sulz. inf. t. 20. f. 130. musca fellata.

Geoff. parif. 2. p. 479. t. 17. f. 4. stratiomys 1.

Fab. stratiomys 1.

De Geer tom. 6. p. 151. nigra, scutello luteo, abdomine supra maculis sex lateralibus citreo-luteis.

Schæff. elem. t. 121.

— icon. t. 14. f. 16.

Enum. n. 886.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 950.

Faun. Fridr. n. 706.

Hab. larva in aquis dulcibus.

Larva conica. Longa.

Desc. Musca domestica major. *Thorax* fusco-cinereus, villosus, apice flavus. *Oculi* fusci, lineola transversa obscuriore. *Alæ* subferrugineæ. *Abdomen* ovatum, nigricans, segmento singulo apice utrinque (non in medio) flavo, excepto 4to. quod terminatur triangulo flavo. *Halteres* albi. *Antennæ* nigræ, clavato-subulatæ. *Femora* nigra, tibiis ultimis flavis. *Faun.* 1780.

Microleon. 3. M. (microléon) antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine atro, strigis lateralibus albis. *

Fab. stratiomys 3.

De Géer tom. 6. p. 152. n. 2. t. 9.

f. 1. - 3. thorace scutelloque æneis, abdomine supra nigro, lineis sex lateralibus flavis.

Enum. n. 887.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 951.

Geoff. inf. tom. 2. p. 480. n. 2. fusca.

thorace hirsuto ferrugineo, abdomine glabro, ovato, plano, immaculato.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. 1. Larva similis præcedenti, inde ut muscæ prioris varietatem judicavit D. Geoff. sed diversa. V.

Desc. Similis præcedenti, sed duplo minor. *Corpus* nigrum. Scutelli dentes ferruginei. Abdominis segmenta ad latera linea transversa flava, angusta. *Faun.* 1781.

Obs. 2. Differt a priore *thorace* tomentoso, *scutello* nigro, *abdomine* nigro & saltem lateribus lineolis quibusdam albis variegato, *alis* fuscescentibus, apice pallidioribus. *Enum.*

Hydroleon. 4. M. (hydroléon) antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine viridi, medio nigro angulato. *

Geoff. paris. 2. p. 481. stratiomys 4.

Fab. stratiomys 7.

De Geer inf. tom. 6. p. 154. n. 3. t. 9. f. 4, 5 fusca, abdomine viridi, fascia longitudinali nigra, pedibus flavis.

Enum. n. 888.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 951.

Faun. Fridr. n. 707.

Hab. in Europa.

Larva ut larvæ priorum. V.

Desc. M. *chameleone* minor. *Caput* & *thorax* nigra. *Scutellum* bidentatum, nigrum, dentibus pallidis. *Halteres* virides. *Abdomen* undique viride, dorso maculis tribus (prioribus sensim minoribus) nigris, connatis, antice lateribus angulatis. *Pedes* testacei. *Faun.* 1782.

Trilineata. 5. M. (la rayée) antennis filatis cla-

vatis, scutello bidentato, corpore viridi, thorace lineis abdomineque fasciis nigris.

Fab. stratiomys 9.

Geoff. inf. tom. 2. p. 482. n. 7. luteo-virescens, thorace lineis tribus transversis, arcuatis, nigris.

Hab. in Suecia. Henric. Gahn. In Bressia. V.
Corpus viride, magnitudine vix *M. domesticae*. Antennae testaceae. Oculi fusci, fascia testacea. Thorax lineis 3 atris, apice connexis. Abdomen ovatum, fasciis 4 nigris, extrorsum angustioribus. Pedes pallidi.

Hypoleon. 6. M. (hypoléon) antennis filatis acuminato-setaceis, thorace bidentato, margine striisque duabus flavis.

Hab. in Germania. D. Schreber. In Gallia Aust. V.

Antennae obovatae, pallidae, in setam terminatae. Thorax nigricans, margine scutelloque luteo & striis 2 luteis. Abdomen flavum, fasciis abbreviatis 2 curvis, fere connexis. Pedes flavi.

Obs. 1. In nostris puncta duo occipitalia flava. V.

Obs. 2. Antennae apice setariae. Alae flavescences.

Pantherina. 7. M. (la panthere) antennis filatis, corpore atro, abdominis dorso maculis tribus, marginibus totidem connatis.

Faun. Fridr. n. 708.

Hab. in Suecia. In Bressia. V.

Similis *M. hydroleoni*, sed scutellum integrum. Antennae clavatae, breves. Corpus nudum. Abdomen depressum, marginatum, incisuris 3 margine medio albis & margine laterali; incisurae 2

ultimæ margine albo. Punctum album utrinque ad basin thoracis.

Desc. Minor. Caput nigrum, occipite puncto flavo. Antennæ flavescentes. Thorax, flavis lineis tribus latis, apice connexis. Scutellum flavum. Halteres flavi. Abdomen flavum, segmentis margine nigris, tribus prioribus macula nigra transversa. Alæ hyalinæ. Faun. 1783.

*Morio. 8. M. (le morio) antennis filatis subulatis, corpore hirto atro, alis dimidiato-nigris. **

Reaum. inf. 6. t. 27. f. 13.

Aldr. inf. t. 2. f. 13.

Geoff. paris. 2. p. 493. musca 2.

Scop. carn. 971. anthrax morio.

Fab. bibio 11, hirta atra, alis nigris apice hyalinis.

De Geer tom. 6. p. 192. t. 11. f. 53. nemotelus antennis acutis, corpore lato nigro hirsuto, lateribus villis nigris, ano fasciculis binis albis, alis dimidiato-nigris albisque.

Schæff. icon. t. 76. f. 7.

Enum n. 892.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 452.

Hab. in Europa.

Desc. Tota atra cum capite, thorace, abdomine, pedibus, alis; sed margo alarum tenuior albus est, vel potius exalbidus; dum hæc albedo sinus format alamque quasi obtuse reddit & in abdomine a tergo duo vel quatuor puncta nivea ad margines segmentorum. Faun. 1784.

Obs. 1. Stat alis expansis. V. D. Scop.

Obs. 2. An musca morio anthrax Linnæi?

Dubito: nam in Enum. describitur

alia cui *Scop.* descriptio magis convenit. Quid sentiendum videbitur infra. V.

Denigrata. 9. M. (la noircie) antennis filatis subulatis, corpore hirtio atro, thorace utrinque linea alba nigra, alis nigro variis.

Hab. in Europa.

Maura. 10. M. (la maure) antennis filatis subulatis, corpore hirtio atro albo fasciato, alis nigro variis. *

Fab. bibio 12. hirta atra albo fasciata, alis nigris, margine tenuiore sinuato hyalino.

Schæff. icon. t. 76. f. 8.

De Geer tom. 6. p. 191. n. 13. t. II. f. 11, 12. nemotelus antennis acutis, corpore lato nigro hirsuto, thorace lateribus villis flavo-albidis, abdomine fasciis villosis albis, alis dimidiato-nigris albisque.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Caput nigrum. *Oculi* fusci. *Antennæ* brevissimæ, cylindricæ, terminatæ seta. *Thorax* niger, villosus, utroque latere linea longitudinali exalbida. *Abdomen* ovatum, hirsutum, nigrum, in medio fascia lineari exalbida; ad basin vero & apicem abdominis pilis albidis. *Halteres* albi, capitellis niveis. *Pedes* nigricantes. *Faun. 1785.*

Clavipes. 11. M. (la clavipede) antennis filatis subulatis, corpore lævi atro, abdomine testaceo, plantis posticis clavatis.

Fab. stratiomys 11. atra scutello sex dentato, abdomine ferrugineo.

Enum. n. 894.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 953.

Geoff. inf. tom. 2. p. 483. n. 8.

Hab. in Europa. Fabricius. In Gallia
Aust. V.

Magnitudo formicæ. Alæ nigræ. Pedes
testacei, sed postici elongati, plantis
nigris clavatis. Thorax ad scutellum
aculeato-ciliatus.

Obs. Alæ fuscæ. Pedes rufi, plantis
nigris.

Hottentotta. 12. M. (la Hottentotte) antennis filatis
subulatis, corpore hirtio lutescente,
alis costâ fuscis. *

Fab. bibio 16. hirta flavescens, alis
hyalinis, costâ fusca.

Faun. Fridr. n. 756.

Schæff. elem. t. 76. f. 6.

De Geer. tom. 6. p. 189. n. 12. t. II.
f. 7, 8. nemotelus antennis acutis,
corpore lato nigro hirsutissimo, villis
viridi-flavis, alis costâ fuscis.

Hab. in Europa. In Gallia circa Lugdu-
num. V.

Desc. Media. Corpus nigrum, vellere
testaceo hirtum. Oculi brunnei. Abdo-
minis segmenta latitudine æqualia,
ultimo brevissimo, unde postice obtu-
sissimum. Faun. 1787.

Fenestralis. 13. M. (des fenêtres) antennis filatis
glabra atra, abdomine supra rugoso
strigis albis, pedibus ferrugineis.

Fab. musca 45. antennis setariis, glabra
atra, abdomine supra rugoso, strigis
albis, alis fuscis.

De Geer tom. 6. p. 189. n. 11. nemoletus
niger, antennis cylindricis muticis,
abdomine oblongo, fasciis quatuor
albis, alis nigro-fuscis.

Hab. in Europa, valde tarda noctu, calido die choreas agit.

Incisuræ dorsales abdominis 3. f. 4, dum abdomen extenditur, niveæ, latera tamen non attingentes. *Alæ* incumbentes.

β. *Simillima*, duplo triplove major, atra, tarda. Corpus læve. Abdomen supra magis rugosum, singulis incisuris ruga transversa. Pedes nigri.

Desc. Parva atra. Abdomen segmentis dehiscens ostendit strigas niveas, transversas, vix latera attingentes. Pedes testacei. *Halteres* albi. *Faun.* 1845.

Tarda. 14. M. (la lourde) antennis filatis subulatis lævis atra, thorace subæneo, pedibus subtestaceis. *

Hab. in Europa, valde tarda ob alas incumbentes ac si nullæ essent.

Desc. Musca domestica dimidio minor. *Antennæ* breviores. *Oculi* fusci. *Thorax* niger, parum cupreo colore lucens, non politus. *Halteres* albi. *Abdomen* oblongiusculum atrum. *Femora* lurida s. livido-testacea, ut & tibiæ, sed posticæ magis nigræ. *Alæ* incumbentes tegunt abdomen, ac si nullæ essent alæ, singulari modo. *Oculi* fascia fusca. *Faun.* 1786.

Scolopacea. 15. M. (la beccasse) antennis filatis apice setigeris, abdomine flavescente trifariam nigro-punctato, alis nebulosis. *
Reaum. inf. 4. t. 10. f. 3, 6.

Ordo dipteriorum ex ore potissimum in genera subdividitur cum antennæ in muscis & conopsibus diversæ; alioquin e prima sectione muscarum prodirent 4 genera, affinia chameleoni, morioni, scolopaceæ, conopsoidi, & genus conops excluderetur, distributum inter prædictas.

Fab. Rhagio 1.

De Geer tom. 6. p. 162. n. 1. t. 9. f. 6. 9.
nemotelus antennis filatis fetigeris,
 thorace nigro, abdomine flavescente
 supra nigro punctato, pedibus flavis,
 alis fusco maculatis.

Enum. n. 897.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 954.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Musca domestica longior. Caput
& thorax cinerea: in thorace striæ
tres fuscæ. Alæ fuscescentes, maculis
nigris & albidis. Abdomen flavescens
cum ordine longitudinali macularum
nigrarum a tergo & utrinque ordine
lateralis ad latera. Pedes pallidi. Oculi
fusci. Anus nigricans. Facies asili,
sed os muscæ. Faun. 1788.

Vermileo. 16. M. (le ver-lion) antennis filatis apice
 fetigeris, abdomine trifariam nigro
 punctato, thorace maculato, alis
 immaculatis.

De Geer act. Stockh. 1752. p. 180, 260.
t. 5.

Fab. Rhagio 3.

De Geer tom. 6. p. 168. n. 5. t. 10.
f. 1.-10. nemotelus flavus, antennis
filatis fetigeris, thorace striis quatuor
abdomineque quinquefariam nigro punctato,
alis immaculatis.

Reaum. Mém. de l'acad des sciences 1753.
p. 402. t. 17.

Enum. n. 896.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 954.

Hab. in Galliæ arena mobili.

Obs. Dum larvam observabant DD.

Reaum. & de Geer, historiam insecti
in acad. Lugd. legebam. V.

Desc. Flava. Caput nigrum. Thorax supra

cinereus. *Abdomen* serie una in dorso & una ex utroque latere, punctorum nigrorum; apex ipse niger. *Alæ* ferruginescentes.

Obs. Nostra differt descriptionique *D. de Geer* conformis. *Tota* ochracea. *Thorax* lineis duabus nigris, nitidis, longitudinalibus. *Abdomen* nigro maculatum; in singula incisura maculæ tres, una in medio, alteræ laterales elongatæ. *Pedes* posteriores fusci, crassiores longioresque.

Larva frequens in muris viæ vulgo *les Etroits* prope Lugdunum. V.

Tringaria. 17. M. (la triplée) antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigropunctato, thorace unicolore, alis immaculatis. *

Fab. Rhagio 2.

Hab. in Suecia. In Bressia. V.

Similis priori, a qua differt thorace cano, nec duobus callis fuscis longitudinalibus notato.

Desc. Similis M. *Scolopaceæ*, sed minor. *Thorax* cinereus. *Scutellum* flavicans. *Abdomen* oblongum, flavum, triplici ordine punctorum nigrorum: ultima duo segmenta nigra sunt. *Pedes* testacei. *Alæ* pallidæ, immaculatæ. *Faun.* 1789.

Diadema. 18. M. (le diadème) antennis filatis apice setigeris, cinerea, alis immaculatis, pedibus subferrugineis.

Fab. Rhagio 10. cinereus, alis albis, macula marginali fusca.

Enum. n. 898.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 954.

Hab. in Europa *Fabricius*.

Magnitudo formicæ. *Pedes* elongati.

Desc. *Alæ* subfuscæ cum puncto marginali vix sensibili; cætera nigra, pilis flavis tomentosa, unde nigro-cinerea evadit. *Femora* nigra; reliqui pedes longiusculi, flavescentes. *Enum.*

Anilis. 19. *M.* (la vieille) antennis filatis hirtis muticis, corpore villoso albo-canefcente.*

Fab. bibio 8. villosa, albo-canescens, alis hyalinis.

Hab. in Europa. *In* Gallia Aust. V.

Desc. Muscæ magnitudo fere domesticæ; sed *abdomen* oblongum, acuminatum, conicum, totum albo-canum. *Thorax* cinereus, villosus & *tibiæ* pallidæ.

Halteres albidii. *Antennæ* filiformes, truncatæ, obtusæ, basi pilis adpersæ, sed absque seta aut arista. *Alæ* venis fuscis, anastomosantibus. *Oculi* brunnei.

Faun. 1791.

Obs. *Pedes* postici elongati, pallidi.

Conopsoi- 20. *M.* (la conopsoïde) antennis clavatis mucronatis basi coadunatis, corpore atro, abdominis cingulis tribus flavis.*

t. 9. *f.* 8.

Reaum. inf. 4. *t.* 33. *f.* 12, 13.

Fab. syrphus 38. nudus niger antennis setariis, thorace lineis lateralibus, abdomine fasciis tribus flavis.

Faun. Fridr. n. 709.

Enum. n. 895.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 955.

Hab. in Europa. *In* loco vulgo les Brottaux, prope Lugdunum non rara, præsertim in floribus euphorbiæ cyparis. V.

Simillima conopsi *macrocephalæ*.

Desc. *Caput* nigrum. *Frons* utrinque flava.

Occiput margine flavo. *Antennæ* atræ ; clavatæ , acutæ , ultra medium versus basin connatæ. *Thorax* ater , lineola parva laterali ante singulas alas ; lineola flava ad scutellum. *Alæ* margine exteriori fuscae. *Abdomen* clavatum , segmentis tribus flavis integris & quarto ad basin flavedine interrupta. *Halteres* albidii. *Faun.* 1790.

Obs. Variat valde hæc elegans musca ; unde descriptiones dissimiles. Optima *Enum.* desc. nostris fere convenit. V.

Desc. Nigra. *Antennæ* porrectæ , basi connatæ , apice terminatæ , capitulo lanceolato. *Frons* flava , linea media nigra , longitudinali. *Thorax* arcte capiti connatus ; futura expletur linea antrorsum conum in caput exserente , sed pictum non excultum , flava , in ipso cono stenuata tria nigra. Ante alas linea flava cum puncto pectus versus. *Scutellum* nigrum , medio fascia flava. *Abdomen* cylindricum , basi flava cingulisque tribus flavis , nempe ob apices segmentorum secundi , tertii quartique flavos ; subtus fascia secunda non coit , tertia vero utrinque ramum obliquum immittit. *Pedes* fulvi , *femora* nigra vel fusca , basi apiceque flava. *Alæ* hyalinæ , margine exteriori fusco. *Halteres* flavi.

Obs. *Abdomen* in nostris , modo cylindricum , modo fusiforme : varietas sexus. V.

Variat adhuc magnitudine , basi abdominis non flava ; tunc nullum cingulum subtus conspicuum. V.

Obs. *Alæ* albæ , margine crassiori nigro.

Uiginosa, 21. M. (des marais) antennis clavatis

mucronatis , abdominis dorso albo ,
segmentis duobus penultimis striga
alba.

Fab. stratyom 14. atra scutello inermi ,
abdomine niveo apicè atro.

Hab. in Europa , frequens ubi triglochis
crescit. In Bressia. V.

Corpus M. domestica $\frac{1}{2}$ minus. Caput ni-
grum , fronte flava. Antennæ nigræ.
Thorax niger , nitidus , lateribus
utrinque punctis 2 oblongis albis. Ab-
domen subrotundum , depressiusculum ,
dorso album s. luteum , basi media
fuscum ; segmenta duo fere ultima ,
linea transversa nigra lata. Abdomen
subtus nigrum , marginibus segmentorum
albis. Genua alba. Tibiæ pallidæ.

Nectarea. 22. M. (la friande) antennis cylindricis
perfoliatis nigra , alis albis.

Hab. in floribus arborum Pomonæ nectar
hauriens e fundo calycis ubique tota
die hospitatur. In Gallia Aust. V.

*Magnitudo pulicis , oblongiuscula , nigra
etiam halteribus. Alæ solæ albæ. An-
tennæ cylindricæ , confertim perfoliatæ.
Pedes longiusculi.*

Obs. In nostris pedes variegati. V.

Ex Entom. Carn. D. Scop.

Rara. 23. M. (la rare) nigro-flavoque varia ,
scutello flavo bispinoso.

Hab. in Europa.

*Desc. Antennæ ferrugineæ. Frons flava ,
in medio nigra. Thorax niger , lineis
duabus dorsalibus & macula laterali ,
flavis. Scutellum flavum , spinis duabus
luteis. Abdomen ovatum , nigrum ,
maculis in singulo latere binis aliisque
terminali,*

terminali, flavis. *Pedes* flavi, *femoribus* basi nigris. *Halteres* flavi.

Ferruginea. 24. M. (la rouillée) magna, ferruginea, abdomine ovato, scutello bidentato.
t. 9. f. 9.

Hab. in Europa. In agro Gratianopolitano. *Mus. D. Blain.*

Desc. Omnium hujus divisionis maxima. *Antennæ* filatæ ferrugineæ, apice nigricantes. *Caput* parvum. *Oculi* nigri. *Halteres* diaphani. *Alæ* ferrugineæ. *Abdomen* triste, incisuris elevatis pilosis pilis vix conspicuis, subtus nigro ferrugineoque variegatum. *Pedes* omnes livido-ferruginei.

Formosa. 25. M. (la belle) antennis filatis apice setigeris, thorace lucido, viridi, abdomine lucido, violaceo, apice dilatato.

Enum. n. 899.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* setula basi villosa. *Caput* inter oculos nigrum, nitens. *Thorax* villosulus. *Abdomen* lateribus acutis, segmentis 5. *Halteres* nudi, albidii. *Rostrum* apice albidum. *Alæ* hyalinæ, ad apicem nulla anastomosi. *Pedes* nigri, geniculo primo albido.

Obs. Habitus M. *hydroleonis*.

Spatula. 26. M. (la spatule) scutello bicorni, abdomine spatulæ capitulo simili, thorace latiore.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. *Mus. D. Blain.*

Desc. *Corpus* nigrum, septem lineas longum. *Antennæ* nigrae, thorace vix breviores, alæ latitudinem æquantes.

Insect. Tomus III. Dd

Caput inter oculos flavum. *Scutellum* flavescens, spinis duabus. *Abdomen* lineas tres latum, tres & dimidiam longum, compressum, lateribus acutis, basi truncatum. *Alæ* ita impositæ, ut nuda sint latera abdominis. *Halteres* lutei. *Femora* fusca. *Tibiæ* ferrugineæ.

Ex op. D. de Geer.

Annulata. 27. M. (la cerclée) grisea, antennis filatis fetigeris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis, alis immaculatis. tom. 6. p. 164. n. 2.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Larva apoda, alba, in ligno putrido.

Desc. M. Scolopaceæ similis, sed aliter colorata. Grisea. *Antennæ* nigræ. *Alæ* diaphanæ, margine exteriori obscure luteo. *Abdominis* incisuræ, lineis transversis ochraceis marginatæ.

Maculata. 28. M. (la tachetée) griseo-nigra, antennis filatis fetigeris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis nigro maculatis, alis macula flava apicibus fusca. tom. 6. p. 165. n. 3.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Præcedenti minor. Caput & thorax griseo fusca. *Abdomen* nigrum, lucidum, fasciis transversalibus ochraceis incisuras postice marginantibus. *Alæ* magnæ, diaphanæ, macula lutescente marginali.

Rufa. 29. M. (la rouffe) antennis filatis fetigeris, abdomine rufo-flavo, foemina nigro maculato, pedibus rufis, alis maculatis. tom. 6. p. 166. n. 4. t. 9. f. 11.-18.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. fimo.

Larva alba, fere cylindrica, capite acuminato.

Desc. *M. Scolopaceæ* affinis. *Caput* griseum. *Oculi* fusco-rubri. *Thorax* fusco-cinereus, lineis, nigricantibus longitudinalibus. *Abdomen* fœminæ rufescenti-luteum, maculis nigris; maris immaculatum; in utroque sexu elongatum, acuminatum.

Cincta. 30. *M.* (l'entourée) antennis cylindricis muticis, abdomine elongato conico, nigro, annulis tribus femoribusque rufis. *tom.* 6. *p.* 183. *n.* 6. *t.* 9. *f.* 19.-21.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Facies afili*, nigra. *Antennæ* nigræ fere cylindræ, filo non armatæ. *Oculi* magni. *Thoracis* longitudo latitudinem superat. *Abdomen* conicum, acutissimum, immobile instar abdominis *panorpæ*, obscure rufo variegatum.

Flavipes. 31. *M.* (la flavipede) antennis cylindricis muticis, abdomine elongato conico, atro, nitido, pedibus rufo-flavis, alis maculatis basi flavis. *tom.* 6. *p.* 185. *n.* 7. *t.* 9. *f.* 22, 23.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ afili*, *muscæ* rostrum: Nigra, nitida. *Abdomen* conicum. *Pedes* longi. *Tibiæ* rufo-ochraceæ. *Femora* nigra. *Alæ* abdomine breviores, basi & in margine exteriori ochraceæ.

Fasciata. 32. *M.* (la fasciée) grisea, antennis cylindricis muticis, abdomine elongato

conico nigro, fasciis griseis, capite
subtus lanigero albido. *tom. 6. p. 186.*
n. 8. t. II. f. 1.-4.

Frisch. inf. tom. 1. t. 9.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Muscæ domesticæ magnitudo. Caput
& thorax infra vellere albo tecta. Thorax
tribus lineis nigricantibus. Oculi viri-
des, maris magni, fæminæ minoribus
inter quos duæ laminæ circulares ni-
græ, nitentes. Abdomen nigrum elon-
gatum, conicum, fasciis transversis
albicantibus. Alæ diaphanæ, nervis
fuscis. Pedes longi valde spinosi.

Hirta. 33. M. (la velue) flavo-fusca, antennis cy-
lindricis muticis, oculis æneis, corpore
elongato conico, villis rufis facisq[ue]
fulvis. *tom. 6. p. 187. n. 9.*

Merian. inf. Eur. t. 70.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Larva longa, utraque extremitate acu-
minata.

Desc. Præcedenti affinis. Oculi magni.
Caput, thorax, abdomen pilis rufis
vestita. Alæ fere nigricantes.

Nigra. 34. M. (la noire) nigra aterrima, an-
tennis cylindricis muticis corpore
oblongo, tarsis fuscis, alis nigris.
tom. 6. p. 188. t. II. f. 5, 6.

Hab. in Europa.

Desc. Parva. Nigra. Abdomen latum;
non acuminatum, rugis transversalibus.
Alæ nigræ. Abdomen tegunt.

Ex spec. D. Fab.

Ænea. 35. M. (la semi-bronzée) nigra tomen-
tosa, abdomine æneo. *Bibio 4.*

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In Gallia Aust. Musc. D. Blain. V.

Desc. Statura omnino syrphi ruficornis, at antennæ nigræ, extrorsum crassiores, apice subulatæ, albæ. Labium obscure flavescens. Thorax tomento ferrugineo pubescens. Pedes pallidi, femoribus nigris.

Marginata. 36. M. (la bordée) atra, abdomine conico, segmentis margine albis, alis maculatis. *Bibio 6.*

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. Statura & magnitudo M. plebeia; tota nigra, marginibus segmentorum abdominalium solis albis. Alæ maculis imprimis ad marginem crassiorem nigris.

Nobilitata. 37. M. (la livrée) ferrugineo-hirta, abdomine conico fulvo, ano atro. *Bibio 7.*

Hab. in Daniæ nemoribus.

Desc. M. plebeia nimis affinis.

Lugubris. 38. M. (la lugubre) hirta atra, ore cinereo, tibiis testaceis. *Mantiss. Bibio 8.*

Hab. Kiliæ.

Desc. Statura omnino M. anilis, at tota hirta atra. Os cinereo-pilosum. Alæ albidæ, immaculatæ. Pedes testacei, femoribus nigris.

Æthiops. 39. M. (l'Ethiopienne) hirta atra, alis nigris apice albis, punctis duobus, ano argenteo. *Bibio 13.*

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura omnino M. Mauræ. Caput & thorax nigra, immaculata. Alæ basî nigræ, albo punctatæ, apice albæ.

punctis duobus distinctis nigris. *Abdomen* atrum, albo subfasciatum anoque læte argenteo nitido.

Sabæa. 40. M. (la Savoyarde) hirta atra, abdomine segmentorum marginibus albidis, alis albis basi exteriori nigris. *Bibio* 18.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Magnitudo & statura M. *hottentottæ*. *Corpus* hirtum, atrum. *Halteres* apice terminantur puncto flavo. *Abdomen*, segmentorum marginibus parum albicantibus. *Alæ* albæ, margine exteriori ultra medium nigro. *Pedes* nigri.

Obs. Variat marginibus luteis. V.

Strigata. 41. M. (la fillonnée) scutello bidentato, abdomine atro, subtus strigis albis. *Stratiomys* 4. tom. 9. f. 9, 10.

Hab. in Europa. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. M. *microleoni* nimium affinis. *Antennæ* basi connatæ, atræ. *Caput* & *thorax* cinereo pubescentia. *Dentes scutelli* flavi. *Abdomen* atrum, supra vix maculatum, subtus vero strigis tribus albis.

Tigrina. 42. M. (la tigrée) scutello bidentato, abdomine subtus rufo. *Stratiomys* 6.

Hab. in Danicæ paludosis.

Desc. Magnitudo M. *microleonis*. *Corpus* atrum. *Dentes scutelli halteresque* flavi. *Abdomen* subtus rufum, margine omni nigro. *Alæ* albæ, costa fusca.

Obs. Variat abdomine subtus rufo, pedibus lividis, femoribus fuscis, abdomine subtus viride, pedibus flavicantibus, femoribus nigris. V.

Viridata. 43. M. (la verte) atra viridis, scutello bidentato, abdomine flavescente, macula apicis atra. *Stratiomys* 8.

Hab. Hafniæ. In Bressia. V.

Desc. Statura M. *hydroleonis*, at triplo minor. *Corpus* totum virescens, abdomine pallidiore, linea dorsali tenuissima maculaque magna apicis atris. *Alæ* hyalinæ, costa flavicante.

Sexdentata. 44. M. (la sixdentée) scutello sexdentato, thorace æneo, abdomine nigro. *Stratiomys* 12.

Hab. in Anglia. *Mus. D. Banks.*

Desc. Statura oblonga fere muscæ *cuprariæ*, at *antennæ* & os hujus generis. *Antennæ* filatæ, basi connatæ absque seta. *Thorax* æneus nitidus, scutello dentibus sex elongatis nigris. *Abdomen* elongatum, supra planum, pubescens, nigrum, nitidum. *Alæ* albidæ, macula marginali nigra. *Pedes* flavi, postici elongati, plantis fuscis.

Mutica. 45. M. (la défarmée) scutello inermi, atra, abdomine niveo, apice atro. *Stratiomys* 14.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. Parva. *Caput* atrum, fronte puncto albo. *Thorax* niger. *Halteres* albi. *Abdomen* niveum, apice atrum, ano tamen albido. *Pedes* pallidi.

Lineata. 46. M. (la tracée) thorace lineato, abdomine nigro, alis hyalinis macula apiceque fuscis. *Rhagio* 4.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. *Caput* parvum, nigrum. *Antennæ* cylindricæ, incurvæ, longiores quam in reliquis. *Pedes* antici elongati nigri.

Splendens. 47. M. (la brillante) scutello bidentato aureo , tomentosa , abdomine fasciis nigris. *Mantiss.* strat. 3.

Hab. in Hispania. D. Valh.

Desc. Statura & magnitudo omnino M. *chamæleonis*. *Antennæ* nigræ. *Corpus* tomento aureo splendens , *abdominis* segmentis basi nigris.

Punctata. 48. M. (la ponctuée) nigricans thorace cinereo , lineis duabus nigris , alis hyalinis , maculis marginalibus nigris. *Mantiss.* Rhagio 10.

Hab. Kilix. D. Daldorf.

Desc. Parva. *Caput* nigrum , *antennis* filiformibus. *Thorax* cinereus , lineis duabus dorsalibus abbreviatis , nigris. *Abdomen* planum , nigrum , segmentis margine parum pallidis. *Alæ* hyalinæ , margine crassiori , in medio maculis aliquot nigris. *Pedes* nigri , *femoribus* testaceis.

Cincta. 49. M. (la noircie) testacea , abdomine nigro fasciato , alis hyalinis nigro maculatis. *Mantiss.* Rhagio 12.

Hab. Kilix. D. Daldorf.

Desc. *Caput* globosum , testaceum , *antennis* filiformibus nigris , corpore duplo longioribus. *Thorax* testaceus , immaculatus. *Abdomen* testaceum , segmentis basi nigris. *Pedes* testacei , geniculis nigris. *Alæ* hyalinæ , maculis plurimis parvis sparsis nigris.

Fasciata. 50. M. (la fasciée) testacea , abdomine nigro fasciato , alis hyalinis macula apicis fusca. *Rhagio* 5.

Iter. Norwag.

Hab. in Norwagiæ nemoribus.

Tipuliformis. 51. M. (la tipuliforme) fusca, alis albis apice nigris. *Rhagio* 6.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Antennæ breves, cylindricæ. Corpus totum cinereo-fuscum, immaculatum.

Alæ latæ, explanatæ, albæ, margine postico late nigro.

Flavipes. 52. M. (la bizarre) thorace ferrugineo, abdomine atro, maculis lateralibus flavis. *Rhagio* 7.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Caput globosum, atrum. Thorax lævis, ferrugineus, immaculatus. Abdomen cylindricum, incurvum, atrum, maculis utrinque tribus lateralibus ultimæque dorsali flavis. Pedes flavi, plantis nigris. Alæ hyalinæ, immaculatæ.

Obs. Alia sub eodem nomine a D. de Geer. Descripta fuit. Nomen triviale igitur mutandum; nam diversæ. V.

Maculata. 53. M. (la tachetée) abdomine nigro, segmentorum marginibus albis, alis fusco-hyalinis, maculis duabus nigris. *Rhagio* 8.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Caput globosum nigrum, antennis filiformibus basi flavescens. Thorax fuscus, obsolete flavo lineatus. Abdomen atrum, segmentorum marginibus flavis. Alæ fusco-hyalinæ, maculis duabus nigris, altera in medio, altera versus apicem. Pedes pallidi, plantis nigris.

Longicornis. 54. M. (la longicorne) testacea, maculis abdominis lateralibus nigris, antennis longissimis. *Rhagio* 9.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Singulare insectum ob antennas corpore triplo longiores, setaceas & forte proprii generis, mihi haud rite examinatum. Statura hujus generis. *Caput & thorax* pallida, testacea, immaculata. *Abdomen* cylindricum, pallidum, maculis lateralibus atris. *Alæ* albæ, nigro maculatæ. *Pedes* elongati, pallidi.

Atrata. 55. M. (le deuil) atra immaculata ;
alis hyalinis, macula marginali nigra.
Rhagio II.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.*

Desc. Media. *Pedes* nigri.

Ex Inf. paris. Entom.que paris.

Coccinea. 56. M. (la fatinée) stratiomys nigra ;
thorace sericeo rubro utrinque spinoso.
Fab. stratiomys 2. scutello bidentato,
thorace rufo, utrinque spinoso.
Enum. n. 891.

Schæff. monogr. 1753. t. I.

Schæff. abbendl. part. 2. p. 243.

Hab. in Europa. In Gallia frequens. V.

Desc. Tota nigra. *Thorax* sericeo ruber,
lateraliter spinosus, præter scutelli
spinas. Facile dignoscenda.

Albipes. 57. M. (l'albipede) stratiomys nigra, ti-
biis albis, alarum margine exteriori
nigro.

Fab. 13. *stratiomys* scutello inermi nigra,
abdominis margine tibiisque albidis.

Hab. in Europa. In Gallia.

Desc. Nigra. *Tibiæ* tarsisque albidis. Spinæ
non facile inter scutelli pilos distin-
guntur.

Obs. Si scutellum armatum est, cur inerme

pronuntiatum fuit a *D. Fabricio*. Si scutellum inerme, ergo nota a spinis scutelli sumta, non specifica. V.

Ex Enum.

Nova. 58. M. (la nouvelle) antennis filatis clavatis medio setigeris, scutello bidentato, nigra, fulvo pubescens.

Beytr. Zur. nat. p. 93. §. 63.

Hab. in Europa.

Obs. Et si latere antennarum porrectarum setum exserat, toto tamen habitu huic muscarum familiæ inferi postulat. Ergo verum est nullam esse regulam sine exceptione.

Anthrax. 59. M. (le charbon) antennis filatis subulatis, alis nigris, apice pallidioribus, halterum clava nigra.

Scop. carn. n. 971 ?

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Qui nunquam vidit muscam *morionem* Linn. hanc pro illa habeat necesse est; nulla enim alia nota differt, quam quod *alæ* minus quidem saturate, at latius nigræ sint, solis apicibus pallidioribus, non tamen, ut in priore specie, plane excoloribus, sed adhuc fatis fuscis; nec in hac specie clava *halterum* lactea, sed nigra; cætera eadem.

Ex nost. Mus.

Hirsuta. 60. M. (la velue) nigra, alis nigris diaphano sinuatis, subtus pilis aurato-fulvis vestita. t. 9. f. II.

Hab. in Europa. Prope Massiliam capta.

Desc. Statura & facies M. *morionis*,

nigerrima. *Thorax* pilis fulvis cinctus. *Abdomen* nigerrimum, cingulis duobus albis supra. *Pectus* subtus aurato-fulvum. *Pedes* aurato-fulvi, postici elongati. *Alæ* ultra medietatem atræ, sinubus duobus, puncto apiceque albis. Elegans & speciosa musca rarissima.

Tubercula- 61. M. (la tuberculée) antennis filatis
ra,

nigra, thorace maculis novem luteis, 7 & 8 tuberculata. t. 9. f. 12.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. in loco vulgo *St. Jean de Gardonengue* ad Gardi ripas.

Desc. *Caput* nigrum. Proboscis crocea. *Thorax* niger, novem maculis luteis irregularibus variegatus, quarum duæ posteriores in medio tuberculatæ. *Abdomen* nigrum, basi maculis duabus flaveolis; cætera segmenta postice flavo cingulata. *Pedes* flavi. *Femora* postica apice nigra.

Ciliata. 62. M. (la ciliée) antennis cylindricis
nigra, oculis omnino ciliatis. t. 9.
f. 13.

Hab. in Europa. Prope Nemausum lecta.

Desc. *Antennæ* cylindricæ. *Oculi* magni coaliti. *Thorax* niger uti *abdomen* cum lateribus papillosum fuscum. *Pedes* lutei, postici elongatissimi.

Crabroni- 63. M. (la crabroniforme) antennis cy-
lindricis nigra, femoribus anticis in-
crassatis, tibiis curvis.

Hab. in Europa. In montibus Cebennis.

Desc. Singulare insectum. *Caput* empis. *Thorax* gibbosus ut in tipulis, sed *antennæ* hujus divisionis. *Pedes* antici monstrofi. *Femora* valde incrassata.

Tibiæ breves, curvæ, duplici spina apice armatæ. Tarsi anteriores longissimi. *Abdomen* subtus depressum, squamis semicircularibus lateraliter armatum. *Alæ* albæ, abdomine multo longiores. Antennæ cylindricæ, absque seta.

Scolopaci- 64. M. (la beccassine) antennis filatis apice na.

fetigeris, corpore nigro.

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Structura & facies M. *scolopæis*, sed nigra. *Alæ*, quæ abdomine longiores, certo situ variis coloribus nitent. *Pedes* longi, fusci. *Abdomen* apice subulatum.

Bidentata. 65. M. (la bidentée) nigra, scutello bidentato, alis basi fulvis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope Nemausum.

Desc. Parva nigra. *Scutelli* dentes alarum basi concolores. *Abdomen* crassum ratione magnitudinis. *Pedes* elongati nigri.

** *Tomentosæ plumatæ.*

Bombylans. 66. M. (la grondeuse) antennis plumatis tomentosa nigra, abdomine hirsuto postice rufo. * t. 9. f. 15.

Fab. syrphus 1.

Harris inf. Ang. t. 10. f. 3.

Faun. Fridr. n. 710.

Pod. M. gr. conops pocopyges.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Facies A. *bombylii*. *Frons* pallida. *Oculi* nigri. *Antennæ* pluma nigra. *Thorax* hirsutus, flavus. *Abdomen* basi hirsutum, flavum, medio nudiusculum

atrum, apice hirsutum fulvum, subtus atrum. *Alæ* exusto colore variegatæ. *Pedes* nigri. *Faun.* 1792.

Myiæ. 67. *M.* (le pseudo-bourdon) antennis plumatis tomentosa nigra, thorace abdominis apice alarumque basi fulvis.*

Sulz. inf. t. 20. *f.* 131.

Schæff. elem. t. 131.

Fab. syrphus 2.

De Geer tom. 6. *p.* 133. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 2. antennis plumatis, tomentosa nigra, thorace abdominis apice rufis, alarum basi fulva.

Faun. Fridr. n. 711.

Enum. n. 900.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 957.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. floribus. V.

Desc. Inter muscas maximas locum tenet. *Abdomen* ovatum, nigrum, pone pilis fulvis hirsutum. *Thorax* similiter fulvis pilis vestitus. *Caput* & *pedes* nigri. *Alæ* hyalinæ versus basin, præsertim versus earum marginem anteriorem, macula magna ferruginea notatæ. *Faun.* 1793.

Plumata. 68. *M.* (le plumet) pilosa, thorace griseo, abdominis apice albo, alis macula ferruginea.

De Geer tom. 6. *p.* 134. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 4.-9. antennis plumatis elongatis, tomentosa nigra, fronte flava, thorace villis viridi-flavis, abdominis apice villosa rufo s. griseo.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. E maximis muscis hæc est. *Corpus* totum nigrum; sed *frons* pilis flavis. *Thorax* pilis griseo-flavis, *Abdomen*

versus basin nudum, nigrum, versus apicem autem s. posteriora pilis albis vestitum. *Tibiæ* versus genicula, quibus femoribus junguntur, exalbidæ. *Alæ* fuscis, in medio macula transversali exalbidæ, venis ferruginea notatæ.

Faun. 1793. β .

Obs. Pro fœmina præcedentis descripta, sed diversa & larva & antennis, &c. V.

Lappona. 69. M. (la Lappone) antennis plumatis subtomentosa nigra, scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis interruptis. *

Fab. syrphus 4.

De Geer t. 6. p. 141. n. 6. t. 8. f. 14. antennis plumatis nigris, tomentosa nigra, abdomine cingulis tribus flavis, apice rufo.

Hab. in Suecia. *D. C. Solander.* In Gallia Aust. V.

Desc. Media. *Frons* albida. *Antennæ* breves. *Thorax* pubescens, fuscus, ante alas flavescens. *Scutellum* ferrugineum. *Abdomen* atrum, tomentosum, fasciis tribus albis interruptis. *Pedes* ferruginei, plantis apice nigris. *Femora* antica non nihil fusca. *Alæ* extus subferrugineæ. *Faun.* 1794.

Ex spec. D. Fab.

Musitans. 70. M. (la bruyante) antennis plumatis tomentosa, thorace fulvo, abdomine virescente. *Syrphus* 3.

Hab. in nemoribus Kilioniensibus. *D. de Schæstedt.*

Desc. Magnitudo M. *bombylantis*. *Os* atrum, fronte flava. *Antennæ* ferrugineæ, seta plumata. *Abdomen* ovæ

tum , pubescens , virescens , fusco obsoleto fasciatum. *Alæ* magnæ albidæ , parum rufescentes & in medio macula magna costali fusca. *Pedes* nigri , *femoribus* posticis elongatis incurvis. *Fab. Mantiss. edit.* 1. p. 306.

Apiaria. 71. M. (la pseudo - abeille) antennis plumatis , tomentosa , thorace antice flavo , abdominis apice albo , alis apice ferrugineis. *Syrphus* 5.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.*

Desc. Statura & summa affinitas M. *mystaceæ*. *Antennæ* plumatæ. *Frons* nigra. *Thorax* antice hirtus , flavus , postice niger. *Abdomen* nigrum , apice hirtum , album. *Alæ* obscuræ , basi ferrugineæ.

Ex inf. parif. Geoff. Entom.que parif.

Pelluceus. 72. M. (la talqueuse) abdomine antice albo , postice nigro , alis albis nigra macula.

An pellucens. Faun. 1793.

Hab. in Europa.

Desc. Major. *Caput* antice luteum. *Thorax* niger tomentosus. *Alæ* albæ , aliquoties basi flavescences , in medio macula magna nigra. *Abdomen* anterius album , albedine sæpe integra , sæpe linea nigra divisa , posterius nigrum. *Pedes* nigri.

Nigra. 73. M. (la noire) tota nigra , pilis fulvis , alis albis macula nigra.

Hab. in Europa.

Obs. An præcedentis *varietas*. Magis tomentosa , *abdomenque* nigrum.

Flavescens.

Flavescens. 74. M. (la jaunâtre) thorace nigro apice fulvo , abdomine flavescente.

Hab. in Europa.

Desc. præcedenti paullo minor. Oculi brunnei. Thorax supra niger. Alæ albæ , immaculatæ. Abdomen cinereo-lutescens.

Maculata. 75. M. (la tachetée) nigra , pilosa , abdominis pilis fulvis , alis albis macula nigra. *Entom. parif.*

Hab. in Europa. In floribus umbellatis & aquaticis.

Ex nost. Mus.

Lunula. 76. M. (la lunaire) antennis plumatis , tomentosa , abdomine nudo , maculis duabus ferrugineis lunatis. *t. 9. f. 16.*

Hab. in Europa. Mus. D. Blain.

Desc. M. mystacea paullo minor. Thorax tomentosus. Alæ diaphanæ , macula ferruginea in medio. Abdomen nudum , nigrum , nitidum , maculis duabus ferrugineis lunatis in basi , subtus nigrum , macula rectangulari fulva. Femora nigra. Tibiæ pallidæ , macula nigra longitudinali. Tarsi flavicantes , apicibus nigris.

*** *Tomentosa setaria.*

Pendula. 77. M. (la pendante) antennis setariis tomentosa , thorace lineis quatuor , abdomine fasciis tribus interruptis flavis. *

Frisch. inf. 4. t. 13.

Reaum. inf. 4. t. 31. f. 9.-11.

Fab. syrphus 10.

De Geer tom. 6. p. 101. n. 3. antennis

Insect. Tomus III.

Ee

setariis tomentosa nigra, capite flavo fascia nigra, thorace lineis quatuor longitudinalibus abomineque fasciis tribus interruptis flavis.

Enum. n. 901.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 958.

Geoff. inf. tom. 2. p. 513. n. 39.

Faun. Fridr. n. 712.

Schaff. icon. t. 129. f. 3, 4.

Hab. in aquis stagnantibus. Larva tubo filiformi respiratorio suspendenda.

Desc. Oculi fusci. Thorax a tergo 4 strigis flavis & tribus nigris latioribus alternantibus. Abdominis segmenta fusca, singula fascia flava magna interrupta (posterioribus minoribus); subtus est totum primum & maximum segmentum maxima ex parte flavum. Femora postica crassa. Faun. 1795.

Florea. 78. M. (la Flore) antennis setariis tomentosa, thorace fasciis duabus inæqualibus nigris, abdomine quatuor luteis subabruptis. *

Alb. inf. t. 17. f. 1.

Scop. carn. 959. conops florens.

Fab. syrphus 11. tomentosus, antennis setariis, thorace nigro fasciato, abdomine flavo, segmentorum marginibus lineaque dorsali atris.

De Geer tom. 6. p. 100. n. 2. t. 6. f. 2. antennis setariis tomentosa nigra, capite thoraceque pilis viridi-flavis, abdomine fasciis quatuor luteis, prima majore interrupta.

Faun. Fridr. n. 713.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. floribus. V.

Desc. Facies fere bombylii. Thorax flavis pilis vestitus, fasciis duabus latis nigris,

posteriore crassiore. *Oculi* fusci. *Antennæ* obovatæ. *Tibiæ* albæ & luteæ. *Abdomen* ovatum, in segmento primo par macularum majorum, quod fere coit a tergo; in segmento secundo par macularum angustiorum quod coit a tergo; margo hujus segmenti in medio flavus. Segmentum tertium versus basin transversaliter flavum, ut & margo, hinc exurgit a tergo abdominis primo macularum majorum lutearum par, dein tres fasciæ transversæ angustiores, omnes pilis luteis compositæ. *Faun.* 1796.

Nemorum. 79. M. (des bois) antennis setariis tomentosa, abdomine cingulisque tribus albis, segmento primo lateribus luteo. *

Reaum. inf. 3. t. 31. f. 8.

Merian. Eur. t. 2.

Alb. inf. t. 3. f. M. L.

Fab. syrphus 13.

De Geer tom. 6. p. 140. t. 8. f. 12, 13.

antennis plumatis tomentosa, abdomine nigro, maculis binis lateralibus magnis singulisque tribus flavo-testaceis.

Geoff. parif. 2. p. 511. n. 31.

Enum. n. 903.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 907.

Faun. Fridr. n. 714.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. hortis. V.

Desc. Musca domestica major est. *Thorax* villis luteis adpersus. *Abdomen* nigrum, utrinque juxta basin s. in primo & secundo segmento luteum, dein tribus lineis transversis angustissimis albicantibus notatum, quæ oriuntur a segmentorum omnium abdominis margine albicante. *Tibiæ* superius albidæ. *Femora* nigra. *Frons* pallida. *Oculi* fusci.

Punctum marginale nigrum minimum
in medio alæ. Scutellum colore thoracis.
Faun. 1797.

Obs. Ad divisionem præcedentem pertinet; nam in uno sexu antennæ sunt plumatæ. An eadem species in *T. D.* *Merian.* & *Albin* a *Linn.* indicata? V.

Arbustorum. 80. M. (des arbrustes) antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco, segmento primo secundoque latere ferrugineis. *

Fab. syrphus 15.

Faun. Fridr. n. 715.

Enum. n. 902.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 958.

Hab. in Europa, simillima insequenti.

Desc. Similis M. nemorum, at thoracis maculæ non obsoletæ; in hac duo abdominis segmenta latere flava, in illo unicum; segmentorum margines in hac flavi, in illa albi. *Frons*, in hac, non supra antennis flava, ut in illa. *Faun.* 1798.

Tenax. 81. M. (le pourceau) antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco unicolore, tibiis posticis compresso-gibbis. *

Swamm. bibl. t. 38. f. 9.

Reaum. inf. 4. t. 20. f. 7.

Blank. inf. t. 10. f. F.

Gæd. inf. 1. t. 2.

List. Gæd. t. 126.

Raj. inf. 272.

Alb. inf. t. 63. f. e, f, g.

Geoff. paris. 2. p. 520. n. 52.

Fab. syrphus 19.

De Geer tom. 6. p. 98. n. 1. antennis setariis tomentosa fusca, capite linea

nigra nitida, thorace griseo abdomine
antice maculis fuscis.

Faun. Fridr. n. 716.

Hab. in fimetis, eloacis, aquis putres-
centibus, vix prelo destruenda larva.

Desc. Est e maximis muscis. Nigra est,
sed *frons & thorax* pilis griseis vestiti.
Abdomen nigrum, minus pubescens.
Alæ membranaceæ, venarum anastomosi
juxta medium marginis anterioris fer-
ruginea. *Oculi* nigri, linea duplici
perpendiculari fusca. *Pedum* postero-
rum par femore & proximo articulo
f. tibia nigrum est, hæc tibia etiam
pone gibba observatur. *Facies* apis
domesticæ. Faun. 1799.

Intricaria. 82. M. (l'embrouillée) antennis fetariis
tomentosa lutescens, abdominis apice
albido, genubus albis. *

Fab. syrphus 22.

De Geer tom. 6. p. 138. n. 3. t. 8.
f. 10, 11. antennis plumatis lenticu-
laribus tomentosa nigra, capite tho-
raceque villis rufis, abdominis apice
villosa griseo.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis M. *æstraceæ. Corpus* fuscum.
Thorax & scutellum vellere ferrugineo
vestitum. *Abdomen* villosum, nigrum,
postice album. *Pedes* nigri. *Tibiæ* basi
albidæ. *Alæ* fascia obsoleta ferruginea.
Faun. 1800.

Obs. Hanc & sequentem inter muscas
tomentosas antennis plumatis non sine
jure ordinavit *D. de Geer. Mas* pilis
rufis omnino vestitus, ano parum
griseo. V.

Æstracea. 83. M. (l'œstre) antennis fetariis tomen-

tosâ nigra, scutello albido, abdominis apice lutescente. *

Fab. syrphus 23. niger antennis setariis, scutello albido, abdomine apice lutescente.

Faun. Fridr. n. 717.

De Geer tom. 6. p. 139. *n.* 4. antennis plumatis tomentosa nigra, scutello albido, capite thoraceque postice villis albis, abdominis apice villosa rufo, tarsis flavis.

Schæff. icon. t. 10. *f.* 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Facies bombylii; magnitudo muscæ domesticæ, sed angustior. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, apice albido. *Abdomen* in medio nigrum, basi albis pilis apice vero fulvis vestitum. *Pedes* nigri. *Alæ* membranaceæ, venis ferrugineis tenuissimis & macula obsolete ferruginea in medio alæ eaque satis magna. *Faun.* 180.

Obs. 1. Velleris colore alarumque macula a præcedenti præcipue differt. *Frons* in nostris albida *pedesque* ut in priori. *V.*

Obs. 2. *Labium* emarginatum, flavum. *Plantæ* piceæ.

Fallax. 84. *M.* (la trompeuse) antennis setariis fusca, fronte larva, abdominis apice tomentoso fulvo, squama halterum lactea.

Fab. syrphus 26.

De Geer tom. 6. p. 127. *n.* 17. antennis setariis tomentosa nigra, fronte flava, abdominis apice tomentoso fulvo, squama halterum lactea.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Antecedenti minor. *Corpus* fuscum, parum pubescens. *Facies* flavo-albida.

Antennæ ferrugineæ. Scutellum thoraci concolorum. Abdominis ultimum segmentum fulvum. Halteres albi. Femora nigra. Tibiæ anteriores flavescentes, posticæ sola basi. Plantæ flavæ, apicibus nigris. Alæ vix maculatæ. Faun. 1802.

Lucorum. 85. M. (la sauvage) antennis setariis sub-
tomentosa, thorace subgriseo, abdomine nigro, segmento primo toto
flavo. *

Fab. syrphus 25.

Hab. in Europa.

Desc. Statura præcedentis. Facies albida. Corpus vellere griseo s. subferrugineo vestitum. Abdominis pars dimidia s. postica atra. Pedes nigri. Tibiæ antisæ exteriori latere flavæ. Alæ macula fusca tranversa lata. Faun. 1803.

Sylvarum. 86. M. (des forêts) antennis setariis to-
mentosa nigra, abdominis ultimo seg-
mento tomentoso flavo. *

Fab. syrphus 27.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. pinetis. V.

Desc. Media, oblonga. Caput nigrum, fronte argentea. Thorax vix manifeste tomentosus, flavescente fuscove renitens pro diverso situ. Scutellum concolorum. Abdomen oblongum, nigrum, segmento 2 lateribus flavo-aureo, tertio toto flavissimo & fere aureo, quarto s. anus minimus niger. Femora nigra. Tibiæ maximam partem flavæ. Plantæ flavæ, apicibus nigris. Faun. 1804.

Obs. Variat magnitudine coloreque femorum, forsan ratione sexus. V.

Bicincta. 87. M. (la Cordeliere) antennis setariis.
Ee iv

elongatis nigra, thorace lateribus punctis abdomineque cingulis duobus flavis. *

Fab. syrphus 30.

De Geer tom. 6. p. 126. n. 16. antennis setariis tomentosa nigra, abdomine cingulis duobus flavis, alis macula nigricante.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Magnitudo muscæ domesticæ vel paullo major. Corpus totum atrum glabrum. Abdomen superne fasciis 2 transversis flavis remotissimis, prima fere interrupta, subtus vero unica transversa flava quæ alternat cum dorsalibus. Frons lineis duabus flavis. Ad basin thoracis utrinque macula parva lutea. Pedes versus apices flavi. Alæ fuscæ, margine crassiore fuscescentes. Halteres flavi. *Faun.* 1805.

Obs. 1. Alæ margine exteriori fusco.

Obs. 2. Variat. Inter duas fascias aliquoties lineæ flavæ abdomen superne cingunt. V.

Arquata. 88. M. (l'arquée) antennis setariis elongatis nigra, thorace lateribus maculis abdomineque cingulis quatuor arcuatis flavis. *

Fab. syrphus 31.

De Geer tom. 6. p. 175. n. 15. antennis setariis elongatis tomentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdominis cingulis quatuor interruptis, arcuatis, flavis.

Faun. Fridr. n. 754.

Obs. Musca picta. t. 7. f. 14. hanc speciem non designat. V.

Scutellum flavum macula nigra. Abdomen glabrum. Thorax nudiusculus,

subtomentosus. Antennæ capite longiores.

Desc. Media. Caput fronte lutescente. Antennæ nigræ, longitudine capitis. Thorax pubescens, nigricans, lateribus luteo maculatis. Scutellum luteum, medio nigrum. Abdomen ovatum, nigrum, arcubus quatuor luteis medio interruptis, cruribus posteriora spectantibus; *subtus* glabrum, etiam fasciis quatuor luteo-ferrugineis. Pedes toti ferruginei. *Faun.* 1806.

Mutabilis. 89. M. (la variable) antennis fetariis elongatis tomentosa, abdomine nigro griseoque mutabili, scutello ferrugineo, thorace immaculato. *

Fab. syrphus 33.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Media, pubescens. Thorax fuscus, vellere subtestaceo. Scutellum subferrugineum. Abdomen ovatum, nigricans, vario situ testaceo vellere renitens. Pedes testacei, femoribus nigris. Alæ venis ferrugineis reticulatæ. *Faun.* 1807.

Devia. 90. M. (l'égarée) antennis fetariis elongatis subtomentosa, thorace cæruleo, abdomine violaceo. *

Fab. syrphus 34.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo. M. domesticæ. Antennæ nigræ, clavatæ, acutæ cum seta a latere. Frons cærulea, nitens. Oculi fusci. Thorax cærulescens nitidus, pilis griseis obtektus. Abdomen atropurpureum, nitens, pilis griseis brevissimis tectum. Alæ hyalinæ, venis nigris. Tibiæ omnes testaceæ. *Faun.* 1808.

Obs. *Os* argenteum. *Alæ* immaculatæ.
Pedes nigri, *femoribus* posticis basi
 digitisque omnibus flavis.

Ichneumo- 91. M. (l'ichneumon) antennis setariis.
 nea. elongatis cylindricis, thorace pedibus-
 que longiusculis ferrugineis, abdomine
 cinereo. * t. 9. f. 17.

Fab. syrphus 39.

Faun. Fridr. n. 718.

Enum. n. 911.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 961.

Hab. in Europa. Simillima ichneumon.
In Gallia Aust. V.

Desc. Figura ichneumonis, oblonga,
 angusta. *Caput* nigrum. *Antennæ* pal-
 lidæ, longitudine capitis. *Thorax* fer-
 rugineus, antice niger. *Scutellum* ni-
 grum; sub scutello utrinque mucro
 pallidus. *Pedes* testacei. *Alæ* pallidæ.
Faun. 1809.

Obs. De synonymia *D. Schrank* dubito
 aut valde variat hæc musca. Nostra,
 prope Massiliam lecta, descript. *Linn.*
 conformis.

Desc. Nigra nuda. *Frons* argentea.
Antennæ elongatæ, cylindricæ, latere
 setigeræ. *Thorax* cinereus, lineis duabus
 approximatis longitudinalibus punctis-
 que totidem atris nitentibus. *Abdomen*
 longum, tenue, nigrum. *Pedes* ferru-
 ginei. *Alæ* hyalinæ.

Obs. Statura elongata. *Abdomen* nigrum.
Alæ albæ.

Diophtalma. 92. M. (la diophtalme) antennis setariis
 nuda, thorace maculis, abdomine cin-
 gulis sex flavis, femoribus posticis
 dentatis. *

Fab. syrphus 45.

Hab. in Europa.

Nigra. Oculi glaucescentes, punctis sparsis & fascia perpendiculari fuscis. Puncta 5 flava ante alas; ante scutellum lineolæ flavæ 2, ad angulum rectum conniventes. Scutelli margo sanguineus. Abdominis segmenta. 3 & 5 interrupta.

Desc. Media. Frons flava. Oculi purpurascens margine & fascia perpendiculari nigra. Thorax niger cui puncta tria s. quatuor flava. Scutellum nigrum, apice ferrugineo. Abdomen nigrum, segmentis sex margine flavis, penultimo interrupto. Pedes ferruginei. Femora postica subtus dente notata. Faun. 1810.

Obs. Oculi fusci fusco punctati. Os flavum, linea nigra. Pedes ferruginei, femoribus posticis acute dentatis.

Vespiformis. 93. M. (la vespiforme) antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomine cingulis sex flavis; pedibus anticis nigris. *

Fab. syrphus 46.

De Géer tom. 6. p. 122. n. 13. t. 7. f. 13. antennis setariis tomentosa nigra, pedibus antennisque flavis, alis fulvo variegatis, abdomine cingulis luteis alternatim latis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Abdominis fasciæ posticæ per paria dorso uniuntur. Pedes ferruginei, femoribus muticis. Scutellum nigrum.

Desc. Similis M. diptalmæ. Antennæ flavæ. Thorax maculis novem albicantibus. Scutellum glabrum, atrocærulescens. Abdominis segmenta tria fasciæ duplici flava cinguntur, quæ fasciæ in singulo segmento & margine

medio uniuntur & ad latera. *Halteres* albi. *Pedes* ferruginei, sed antici maximam partem nigri. *Frons* flava. *Antennæ* ferrugineæ. *Faun.* 1811.

Obs. *Thorax* lineolis duabus dorsalibus glaucis. *Abdominis* fasciæ per paria coeunt.

Festiva. 94. *M.* (l'agréable) antennis setariis nuda, thorace lineis lateralibus, abdomine cingulis quatuor flavis interruptis. *

Scop. carn. 964. conops festivus.

Fab. syrphus 47.

Enum. n. 906.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 962.

Poda gr. t. 114.

De Geer tom. 6. p. 118. *n.* 9. antennis setariis tomentosa nigra, thorace lineis binis lateralibus scutelloque luteis, abdomine cingulis quatuor luteis interruptis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Pedes flavi.

Desc. Corpus M. domestica majus, atrum. *Frons* lineis duabus perpendicularibus flavis. *Antennæ* nigrae, capite longiores, subclavatae cum arista laterali. *Thoracis* latera linea longitudinali flava, interrupta, cui subjacet macula V flavum referens cum duobus punctis. *Scutellum* delta flava inscriptum. *Abdomen* arcubus quatuor flavis interruptis, quinto integro terminali. *Subtus* fascia flava & posterius puncta duo flava. *Pedes* ferruginei. *Tibiæ* flavæ. *Alæ* venis ferrugineis. *Faun.* 1812.

Erratica. 95. *M.* (l'errante) antennis setariis nudiuscula, thorace immaculato, scutello

ferrugineo , abdomine cingulis tribus albidis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Minor. Nigra. *Frons* flavescens;

Thorax immaculatus. *Scutellum* luteum.

Abdomen nigrum , cingulis tribus lutescentibus, quorum inferior remotus , tenuis vixque conspicuus. An eadem *Syst.* species ?

Glaucia. 96. M. (la verdâtre) antennis setariis subtomentosa , thorace immaculato , scutello glauco , abdomine cingulis tribus albidis interruptis. *

β. Musca erratica. *Syst. nat.* 10. p. 593. n. 34.

Scop. carn. 966. conops glaucius.

Fab. syrphus 53.

Hab. in Europa.

Corpus nigrum ; fascia prima abdominis baseos latior est & fere pellucida.

Desc. Caput flavum. *Oculi* purpurascens.

Antennæ nigræ. *Thorax* griseo-fuscescens. *Scutellum* flavum. *Abdomen* nigrum , segmentis tribus basi cinereo glaucis , hinc fasciæ tres glaucæ interruptæ. *Pedes* ferruginei. *Femora* nigra apicibus ferruginea. *Faun.* 1813.

Obs. Os albidum , antennis verticeque nigris. *Thorax* immaculatus. *Scutellum* apice glaucum. *Pedes* nigri , anticis quatuor geniculis ferrugineis.

Noctiluca. 97. M. (la phosphorique) antennis setariis subtomentosa atra , abdominis primo segmento maculis duabus pellucidis. *

Fab. syrphus 54.

Faun. Fridr. n. 713.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo media. *Caput* nigrum ;

Fronte subpilosa. *Oculi* brunnei. *Antennæ* nigræ. *Thorax* niger, antice inspectus hirsutus, postice glaber adparet. *Abdomen* glabrum, segmento primo maculis duabus hyalinis, ovatis, diaphanis, apice magis distantibus, supra & subtus pellucetibus. *Faun.* 1814.

Obs. In nostris femora postica unidentata. An varietas?

Gibbosa. 98. *M.* (la bossue) antennis setariis subtomentosa nigra, abdomine subgloboso cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis. *

Fab. syrphus 55.

Hab. in Suecia.

Desc. Minor. *Caput* nigrum. *Oculi* purpurascentes. *Thorax* niger, villis canescentibus. *Scutellum* concolorum. *Squamæ* halterum albæ, gibbosæ, magnæ. *Abdomen* subglobosum, atrum, marginibus segmentorum late niveis. *Femora* nigra apicibus subferruginea. *Tibiæ* subtestaceæ. *Faun.* 1815.

Caput parvum. *Thorax* gibbus, fuscus. *Alæ* magnæ, albæ. *Tibiæ* ferrugineæ.

Ribesii. 99. *M.* (du groseiller) antennis setariis nigra nudiuscula, thorace immaculato, abdomine cingulis quatuor flavis, primo interrupto. *

Gad. inf. 1. t. 41.

List. Gad. t. 133.

Fab. syrphus 57.

Enum. n. 905.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 512.

Faun. Fridr. n. 720.

De Geer tom. 6. p. 103. n. 4. antennis setariis tomentosa, thorace æneo pilis

flavescentibus, abdomine nigro, fasciis quatuor transversis flavis, prima interrupta.

Geoff. inf. tom. 2. p. 511. n. 37.

Reaum. inf. tom. 4. t. 31. f. 8, 9, 10, 11.

Merian. Eur. 1. t. 2?

Hab. inter aphides ribeos.

Desc. Hæc sequenti, facie, magnitudine; figura simillima; differt solum abdomine a tergo duabus lunulis in primo segmento & dein duobus cingulis transversis flavescentibus, in medio dorso fere angustioribus. *Scutellum* etiam flavescent. *Os, pedes, abdomen* subtus, flavescentia in margine exteriori; *alæ* linea fusca obsoleta. *Faun. 1816.*

Pyrastris. 100. M. (du rosier) antennis setariis nigra nudiuscula, thorace immaculato, abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis. *

Scop. carn. 931.

Frisch. inf. 11. t. 22. f. 1.

Reaum. inf. 3. t. 31. f. 9.

Alb. inf. t. 66.

Gæd. inf. 1. t. 47. larva.

List. Gæd. t. 134.

Blank. inf. t. 10. f. P.

Sulz. inf. t. 20. f. 132.

Geoff. paris. 2. p. 517. n. 46.

Fab. syrphus 58.

De Geer tom. 6. p. 108. n. 5, antennis setariis tomentosa, thorace æneo, abdomine nigro, tribus paribus lunularum albicantium.

Enum. n. 907.

Faun. Fridr. n. 721.

Poda gr. p. 115.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 963.

Hab. inter aphides pyri, rosæ.

Larva viridis, limaciformis, linea alba dorsali a capite ad anum.

Puppa larva contracta in figuram antice obtusam, plantæ ano affixa.

Desc. *Frons* albido-glauca. *Oculi* fusci. *Thorax* fusco-æneus, lateribus & pectore villosis griseis. *Scutellum* lividum. *Abdomen* atrum, lunulis trium parium albis recurvatis; pone lunulas has lineæ duæ albæ. *Subtus* abdomen albicans. *Halteres* albi. *Antennæ* nigricantes. *Femora* nigra. *Tibiæ* flavescens. *Faun.* 1817.

Transfuga. 101. M. (la transfuge) antennis setariis nigra, abdomine cylindrico tomentoso, lunulis bis tribus albidis recurvis. *

Hab. in Suecia rarior; olim lecta, nec dein a me in Suecia reperta.

Desc. *Corpus* incanum. *Abdomen* pubescens, lunulis minoribus sinu thoracem respicientibus; harum lunularum posticum par cohæret cum albedine, qua *abdomen* subtus tingitur. *Faun.* 1818.

Mentastri. 102. M. (de la menthe) antennis setariis nigra nuda, thorace maculato, abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis. *

Geoff. paris. 2. p. 514. n. 41.

Fab. syrphus 59.

Faun. Fridr. n. 722.

Enum. n. 909.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 964.

De Geer tom. 6 p. 119 n. 10. antennis setariis tomentosa nigra, corpore elongato depresso, thorace luteo maculato,

Aphidivoræ Muscæ sunt, quarum larvæ foliis impositæ aphidibus visitans, vix e loco moventur, & solo rostro, tanquam totum corpus prosciscide constaret, aphides inquirunt, legunt, consumunt.
abdomine

abdomine cingulis quatuor, scutello pedibusque flavis.

Hab. inter aphides, at musca in menthæ floribus mellifuga.

Obs. Species in *Ent. parif.* nominata *M. transfuga*, omnino diversa.

Larva aphidivora, viridis, subtomentosa.

Obs. Musca in plantarum floribus. V.

Desc. Parva est & musca *domestica* dimidio minor, angusta & vespæ forma. *Pedes* flavi. *Frons* flava. *Thorax* nigricans, lateribus linea lutea & apice flavus. In *abdominis* tergo tres lineæ flavæ, arcuatæ, arcuum pedibus versus posteriora flexis: primus arcus flavus in medio interruptus est; secundus vero integer; tertius semi-interruptus; quartus vero interruptus est; quintum segmentum abdominis flavum est, punctis tribus nigris. *Abdomen* subtus flavum. *Faun.* 1819.

Obs. Marem descripsit *Linn.* in fœmina cinguli integri, quarto excepto. V.

Scripta. 103. *M.* (l'imprimée) antennis setariis nudiuscula, thorace lineis, scutello abdomineque lineari fasciis flavis. *

Reaum. inf. 4. t. 10. f. 2, 3.

Raf. inf. 2. *musc.* t. 6.

Fab. syrphus 62.

Faun. Fridr. n. 723.

Schæff. icon. t. 113. f. 1.

Hab. inter aphides, at musca in floribus; In Gallia Aust. V.

Desc. reliquis longior & angustior est, tota glabra. *Pedes* flavi. *Alæ* albæ, nitidæ. *Abdomen* tenue, flavum, segmentis primis duobus apice & basi fuscis; reliquis versus marginem exteriorem & posteriorem punctis tribus

acutis fuscis, vel ut characteribus notatis. A sequentibus duabus vix nisi abdominis colore differt. *Faun.* 1820.

Mellina. 104. *M.* (la mielleuse) antennis setariis nuda, thorace subæneo fuscescente immaculato, abdomine maculis 8 lutescentibus. *

Scop. carn. 934.

Fab. syrphus 61.

De Geer tom. 6. p. 117. n. 8. antennis setariis tomentosa, thorace æneo, abdomine nigro, maculis octo tetragonis flavo-testaceis.

Enum. n. 910. antennis setariis nuda, thorace subæneo fuscescente immaculato, abdomine paribus aliquot macularum lutescentium.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 964.

Geoff. inf. tom. 2. p. 515. n. 43. thorace nigro-viridi, abdomine oblongo paribus tribus trigonorum lutescentium.

D. Geoff. & D. Fab. error typ. in citatione.

— thorace nigro-viridi, abdomine oblongo paribus tribus trigonorum lutescentium. p. 516. n. 44. *Faun.* edit. 1. 1092. teste *D. de Geer.*

— nigro viridis, abdomine paribus duobus tetragonorum lutescentium. p. 517. n. 45. teste *D. Schrank.*

Obs. Omnes *M. mellinæ* varietates videntur, indicatæque sunt in *Faun.* licet *D. Geoff. Linn.* non citaverit. V.

Faun. Fridr. n. 724.

Hab. inter aphides, quibus visitat.

Variat abdominis dorso 4, 3, & 2 paribus macularum ferruginearum iisque l. tetragonis, l. trigonis, l. rotundis.

Desc. Oculi fusco-ferruginei. Thorax

æneo - nigricans , nitidiusculus. *Alæ* aqueæ , nitentes. *Apex* thoracis non flavus , sed thoraci concolor. *Pedes* primores 4 flavi , postici 2 nigri , geniculis luteis. *Abdomen* oblongum , lineare , nigrum ; macularum flavescientium par in primo segmento minus ; in secundo segmento par macularum flavescientium majus exacte tetragonarum ; in tertio etiam simile , sed minus secundo ; in reliquis nulla macula. An sexu solum modo a sequenti diversa ? *Abdomen* subtus eburneum sive albicans.

β. Musca abdomine oblongo , paribus tribus trigonorum lutescentium.

Desc. Inter minores est & oblonga. *Frons* flava. *Oculi* fusco - ferruginei. *Thorax* æneo - nigricans , nitidiusculus , apice flavo. *Abdomen* nigro - cærulescens , lineare ; in primo segmento par punctorum lutescentium ; in segmentis 2 , 3 , 4 , singulis scilicet horum , par macularum lutescentium , rotundarum , quarum posticum par magis triangulare , angulo posteriora spectante ; ultima duo segmenta flava puncto nigro in medio. *Abdomen* subtus flavum. Variat in dorso abdominis 4 , 3 s. 2 paribus macularum ferruginearum , variante figura. *Thorax* a lateribus flava irregulari macula. *Pedes* flavi. *Faun.* 1821.

Obs. M. orbiculata , mellina , tetragona , quadrat. *Ent. parif.*

Pipiens. 105. M. (la crieuse) antennis setariis glabra nigra , abdomine utrinque albo maculato , femoribus posticis clavatis dentatis. *

Geoff. parif. 2. p. 519. n. 49.

Scop. carn. 969. conops pipiens.

Fab. syrphus 65.

Enum. n. 915.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 964.

Faun. Fridr. n. 725.

De Geer tom. 6. p. 120. n. II. t. 7.

f. 8, 9. antennis setariis tomentosa nigra, corpore elongato cylindrico, abdomine maculis sex albidis, femoribus posticis clavatis dentatis.

Hab. in Europa, volitat frequens ad flores menthæ aliosque.

Desc. Corpus totum nigrum, angustum, longum, glabrum. Alæ albæ. Segmenta tria abdominis versus basin utrinque alba sunt. Femora postica subtus denticulata. Tibiæ posticæ curvatae, anulo pallido. Femora postica saltatoria, reliquis longiora, sed & multo crassiora validioraque, alba utrinque macula (non tamen semper.) Abdominis ultimum segmentum subtus nigrum est, reliqua subtus pallida. Frons & thoracis latera albida. Faun. 1822.

Obs. Variat maculis modo lutescentibus, modo albidis, modo niveis. V.

*Segnis. 106. M. (l'indolente) antennis setariis glabra, thorace subæneo, abdomine ferrugineo, apice nigro, femoribus posticis cavatis. **

Fab. syrphus 36.

Enum. n. 914.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 965.

De Geer tom. 6. p. 121. n. 12. t. 7.

f. 10.-12. antennis setariis tomentosa, corpore elongato depresso, thorace æneo, abdomine rufo extremitatibus

nigro , femoribus posticis clavatis , spinosis.

Geoff. inf. tom. 2. p. 526. n. 62.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. haud frequens. V.

Desc. Magnitudo muscæ domesticæ , sed magis oblonga figura. Oculi fusci. Thorax viridi-æneus. Abdomen oblongum , in aliis pallido-albescens , in aliis ferrugineum , postice autem semper nigrum unico alterove segmento , ita tamen ut luteus color majorem locum semper occupet. Femora nigra. Tibiæ annulis albis. Alæ aqueæ. Faun. 1823.

Variat 1°. thorace pedibusque nigris & tibiis albo annulatis.

Variat 1°. abdomine antice ferrugineo , nigro maculato.

*Femorata. 107. M. (la difforme) antennis setariis glabra atra oblonga , femoribus posticis clavatis , pedibusque anticis rubris. **

Fab. syrphus 37. antennis setariis tomentosus , thorace subæneo , femoribus posticis clavatis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus oblongum , atrum , nudiusculum. Ferruginea sunt antennarum capitula , pedes quatuor anteriores , femora postica , exceptis apicibus , halteres. Femora postica magna sunt. Faun. 1824.

Grossipes. 108. M. (la monstrueuse) antennis setariis glabra nigra , oculis pallidis , pedibus piceis , posticis grandioribus.

Hab. in Europa.

Corpus nigrum , vix pediculo majus. Alæ hyalinæ , incumbentes. Femora posticæ longitudine crassitie insignia.

Saltatrix. 109. M. (la fauteuse) antennis nuda flava , abdomine supra thoraceque lineis tribus fuscis. *

Hab. in Europæ pratis , supra terram , saltans ut cicada. Thorax linea longitudinali latiuscula nigra , macula oblonga nigra extimo utrinque lineola nigra. Scutellum flavum. Halteres albi.

Desc. Magnitudo pediculi. Caput flavum. Oculi nigri. Vertex macula triangulari nigra testus. Thorax a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris , quarum intermedia cum capite cohæret , laterales vero a capite distinctæ. Scutellum flavum. Abdomen supra fuscum , lineis duabus flavicantibus. Femora postica crassa. Faun. 2319.

Ex oper. D. de Geer.

Pinastri. 110. M. (du pin) antennis fetariis tomentosa , thorace æneo , abdomine nigro , quatuor paribus macularum transversarum flavarum. tom. 6. p. 113. t. 7. f. 6.

Hab. inter pini aphides.

Desc. Frons lutea. Oculi magni brunnei. Scutellum æneum. Abdomen nigrum , maculis octo luteis curvis ; subtus lutescens , maculis tribus nigris. Pedes lutei. Femora nigra aut versus apicem nigra.

Balteata. 111. M. (l'alternée) antennis fetariis tomentosa , thorace æneo , abdomine nigro , alternatim fasciis lineisque transversis flavo-testaceis , prima interrupta. tom. 6. p. 116. n. 7.

Enum. n. 908. *alternata* , thorace nigro-viridi , scutello flavo , abdomine nigro ,

fasciis transversis luteis, alternis majoribus, primo interrupto.

Geoff. inf. tom. 2. p. 514. n. 40.

An muscæ *cannabinæ* cl. *Scopoli* varietas.

Hab. in Europa. Aphidivora.

Desc. Caput antice albidum. *Oculi* magni brunnei. *Thorax* subæneus. *Abdomen* nigrum, fasciis lineisque luteis latis minoribusque alternantibus; *subtus* luteum. *Pedes* tenues luteique. *Alæ* diaphanæ.

Fasciolata. 112. M. (la fasciolée) antennis setariis elongatis tomentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor interruptis duobusque integris flavis.

Hab. in Europa. Musca in floribus.

Desc. Caput nigrum, antice luteum. *Thorax* niger, maculis luteis lateralibus. *Abdomen* nigrum, fasciis quatuor luteis, curvis, in medio interruptis duabusque aliis non interruptis secunda tertiaque segmenta postice terminantibus. *Subtus* nigrum, tribus lineis maculisque tribus luteis alteris. *Pedes* flavescents, *femoribus* apice nigris.

Obs. Variat. Pedes in nostris omnino testacei. *Thorax* duabus lineis albicantibus longitudinaliter parallelis, in medio notatis. V.

Apiformis. 113. M. (l'apiforme) antennis setariis elongatis tomentosa, capite thoraceque æneis, villis rufis, abdomine nigro villis aureis, pedibus dilatatis flavo-rufis. *tom. 6. p. 128. n. 18. t. 7. f. 18, 19.*

Geoff. tom. 2. p. 508. n. 3.

Ef ix

Reaum. inf. tom. 4. t. 34. f. 9, 10.

Hab. in Europa. In Gallia.

Obs. Certe synonymia legitima. Musca enim *Reaum.* etiam antennarum longitudine non differt. V.

Desc. Caput æneo-viride, villis rufis in fronte. *Antennæ* nigræ. *Thorax* capite fere concolor; villis rufis similiter vestitus. *Abdomen* nigrum, villis aurato-luteis obtectum. *Alæ* decussatæ abdomine breviores. Adeo similis apî hirsutissimæ, ut non sine metu capiatur. *Pedes* villosissimi.

Obs. Plurimæ dantur muscæ *apiformes* ad hanc divisionem pertinentes, inde nomen triviale non characteristicum. V.

Ex spec. D. Fab.

Fruteto- 114. M. (des taillis) antennis fetariis to-
mentosa, thorace lineis duabus flavis, abdomine ferrugineo, linea dorsali interrupta nigra. *Syrph.* 17.

Hab. in Angliæ arboretis.

Desc. Paullo minor M. *pendula*. *Antennæ* ferrugineæ, seta fusca. *Thorax* niger, ferrugineo-tomentosus, lineis 2 dorsalibus flavescens. *Abdomen* ovatum, primo segmento ferrugineo, arcu baseos apicisque linea dorsali connexis, nigris; secundo nigro, lateribus punctisque tribus dorsalibus ferrugineis; tertio ferrugineo, puncto dorsali nigro. *Pedes* ferruginei, *femoribus* basi nigris.

Afiliformis. 115. M. (l'afiliforme) antennis fetariis, thorace tomentoso flavescens, abdomine atro, segmento primo secundoque albicantibus. *Syrph.* 24.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Antennæ clavatæ ferruginæ, seta nigra. Labium flavum, punctis tribus nigris. Thorax tomentosus, flavescent. Abdomen nigrum, segmento primo toto, secundo basi albidis. Pedes nigri, tibiis flavescentibus. Lemora postica elongata, incurva. Mantiss. p. 306.

Sphægea. 116. M. (la sphégiforme) antennis setariis elongata nigra, pedibus rufis. Syrph. 40.

Hab. in Anglia. Mus. D. Banks. in Gallia Aust. V.

Desc. M. ichneumonea paullo major. Antennæ capite longiores, acuminatæ, nigrae. Caput, thorax & abdomen oblongum, nigra, immaculata. Alæ obscuræ. Pedes omnes rufi, palmis nigris.

Obs. Nostri specimina M. ichneumonea paulo minora. V.

Elongata. 117. M. (l'alongée) antennis setariis nuda, thorace æneo, abdomine clavato nigro, fasciis duabus flavis. Syrph. 42.

Hab. in Daniæ floribus.

Desc. Longa, angusta. Thorax æneus, immaculatus. Alæ albæ, puncto parvo marginali fusco. Pedes tenues, flavi.

Podagrica. 118. M. (la podagre) antennis setariis nuda, thorace æneo, abdomine bifasciato femoribusque posticis clavatis. Syrph. 43.

Hab. in Daniæ floribus.

Desc. Præcedente duplo minor. Thorax æneus, immaculatus. Abdomen clavatum, fasciis duabus flavis. Alæ albæ, fusco maculatæ. Pedes flavi, femoribus posticis clavatis atris.

Ruficornis. 119. M. (la ruficorne) antennis setariis tomentosa, thorace lineato, abdomine æneo, alis maculatis. *Syrph.* 48. t. 9. f. 18.

Hab. in Daniæ floribus.

Desc. *Antennæ* rufæ. *Thorax* fuscus, cinereo-lineatus. *Scutellum* glaucum. *Abdomen* æneum. *Alæ* maculis duabus fuscis. *Pedes* testacei.

Flavicornis. 120. M. (la flavicorne) antennis setariis tomentosa obscure ænea, antennis tibiisque flavescens. *Syrph.* 49.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. Affinis M. ruficorni. *Alæ* immaculatæ.

Lugubris. 121. M. (la lugubre) antennis setariis nigra immaculata, alis albis macula fusca. *Syrph.* 50. t. 9. f. 19.

Hab. in Daniæ floribus. In Bressia. V.

Desc. Tota nigra, alis solis albis, macula magna fusca.

Obs. In nostris femora postica incrassata sunt. V.

Metallina. 122. M. (la métallique) antennis setariis ænea nitens, antennis nigris. *Syrph.* 52.

Hab. in Germaniæ floribus.

Desc. Totum corpus æneum, nitidum, immaculatum. *Antennæ* breves, setariæ, nigre. *Abdomen* dorso plano. *Alæ* basi ferrugineæ. *Mantiss.* p. 307.

Globosa. 123. M. (la ronde) antennis setariis subtomentosa, thorace antice ferrugineo, subgloboso, pallido, apice nigro. *Syrph.* 56.

Schæff. icon. t. 220. f. 1.

Hab. in Daniæ floribus.

Desc. Statura. *M. gibbosæ*, at triplo minor.
Os album. *Frons* ferruginea, linea
 longitudinali nigra. *Thorax* antice
 ferrugineus, postice ater. *Abdomen*
 subpellucidum, pallidum, ultimo seg-
 mento nigro. *Alæ* albidæ. *Pedes* nigri.

Thymastri. 124. *M.* (du thym) antennis setariis to-
 mentosa, thorace subæneo, abdomine
 atro, fasciis tribus albidis, secunda
 interrupta. *Syrph.* 60.

Hab. in Germaniæ floribus. *D. de Hattorf.*
 In Bressia. V.

Desc. Statura & summa affinitas *M. men-
 thastri*. *Frons* flava, antennis nigris.
Thorax tomentosus, subæneus, scu-
 tello flavo. *Abdomen* atrum, fasciis
 tribus glaucis, secunda late interrupta.
Alæ immaculatæ. *Pedes* flavi, femo-
 ribus basi nigris.

Albimana. 125. *M.* (la propre) antennis setariis
 tomentosa, thorace æneo, abdomine
 elongato atro, punctis quatuor albis.
Syrph. 63.

Hab. in Angliæ hortis. *Mus. D. Banks.*

Desc. Statura & magnitudo omnino *M.
 scriptæ*. *Os* æneum, linea media ele-
 vata. *Thorax* cum scutello tomentosus,
 æneus. *Abdomen* elongatum, holo-
 sericeum atrum, punctis 4 albis. *Pedes*
 fusci, tibiis anticis albis.

Orbicula. 126. *M.* (la sphérique) antennis setariis
 atra nuda, abdomine apice albo.
Syrph. 65. *M.*

Hab. Kiliæ.

Desc. Parva. *Caput* parvum, globosum,
 atrum. *Thorax* nudus, ater, nitidus.
Equamæ halterum magne buccatæ,

albæ. *Abdomen* globosum, atrum, apice pallidum. *Alæ* albæ, immaculatæ. *Pedes* pallidi.

Rosarum. 127. M. (des rosiers) antennis setariis nuda, thorace æneo-nigro, abdomine atro, duabus flavis. *Syrph.* 71. M.

Hab. Hafniæ. In floribus. *D. Lund.*

Desc. Statura. M. *mellinæ*, at omnino alia & distincta. *Caput* atrum, nitidum. *Thorax* æneo-ater, nitidus, immaculatus. *Abdomen* planum, atrum, macularum flavarum pari; interdum posticæ maculæ adhuc duæ aliæ minores. *Pedes* nigri, tibiis quatuor anticis flavis. *Alæ* albæ, macula magna obsoleta fusca ad marginem.

Nectarea. 128. M. (des nectaires) antennis setariis tomentosa, abdomine flavo, segmentorum marginibus nigris, fascia flava. *Syrph.* 74. M.

Hab. in Daniæ floribus. *D. Lund.*

Desc. Statura omnino M. *scriptæ*, at paullo major. *Caput* cinereum, antennis flavescens. *Thorax* subtomentosus, æneus, lineis quatuor albidis. *Scutellum* flavescens. *Alæ* albæ. *Abdominis* segmenta basi flava, apice nigra, fascia flava. Primum segmentum & linea media nigra. *Pedes* flavi.

Ex Enum.

Atropos. 129. M. (Atropos) antennis setariis subtomentosa, thorace albedo, maculis tribus nigris, abdomine nigro, fasciis interruptis margineque segmentorum flavis.

Beytr. Zur. Nat. p. 94. §. 64.

Hab. in floribus.

Murina. 130. M. (la souris) antennis setariis murina tomentosa grisea, thorace lineis tribus nigris, alis fusco maculatis.
t. 9. f. 20.

Beytr. Zur. nat. p. 95. §. 65.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Alæ diaphanæ fusco pulchre maculatæ. Thorax cinereus, nigro lineatus s. niger cinereo lineatus. Pedes testacei. V.

Crassipes. 131. M. (la crassipede) antennis setariis tomentosa nigra, abdominis basi ferruginea, femoribus posticis incrassatis.
t. 9. f. 21.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra tomentosa. Antennarum extremus articulus patelliformis. Frons flavescens. Abdominis primum segmentum ferrugineum, qui color & secundi segmenti latera ad basin afficit. Apex segmentorum omnium ferrugineus, sed fascia tenuissima. Femora lateribus ferruginea; cætera fusca; femora postica crassa. Alæ hyalinæ, lineola (ex venis) transversa fusca; unam alteri ita imponit, ac si unica esset.

Obs. Affinis M. clavipedi D. Fab. tibiæ anteriores & intermediæ maculis abdominis concolores. Femora omnia nigra; postica incurvata spina valida armata. Abdomen magis coniciforme.

Fusca. 132. M. (la brune) antennis setariis tomentosa nigra, tibiarum basi antennisque fulvo-fuscis.

Scop. carn. n. 961.

Hab. in Europa.

Desc. Tota nigra, nitens, leviter tomen-

tosâ , immaculata , nonnihil æneo nitens. *Antennæ* apice patellatæ rubræ. *Tibiæ* basi rufæ.

Bifasciata. 133. M. (la bifasciée) antennis setariis lævis nigra , abdomine cingulis duobus pedibusque anticis quatuor flavis.

Beytr. Zur. nat. p. 95. §. 66.

Hab. in Europa.

Larvata. 134. M. (la masquée) antennis setariis testaceo-argentea , ore larvato , niveo , inflato.

Hab. in Europa. Eberspergæ Austriæ Superioris.

Desc. Caput inflatum niveum ; reliquum corpus totum testaceum tomentosum , tomento nigro alioque sed breviori argenteo intermixto , unde *abdomen* argenteis maculis striisque , sed transeuntibus , nitet. *Pedes* annulis nigris cinguntur. *Alæ* fuscæ , maculis hyalinis variegantur.

Ex hist. Ins. paris. Entom.que paris.

Cruentata. 135. M. (l'ensanglantée) antennis setariis nuda atra , abdominis fascia transversa rubra. t. 9. f. 22.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva , nigra. Frons lutea , linea longitudinali nigra. *Thorax* niger. *Scutelli* pars infima flavescens. *Abdomen* nigrum ; tertium segmentum totum ; secundi magna pars rubra , subtus crocea. *Pedes* flavi ; *femora* nigra vel basi nigra. V.

Obs. Variat abdomine supra & infra croceo , apice nigro.

Plombea. 136. M. (la plombée) antennis setariis nuda , tota plumbea.

Hab. in Europa.

Desc. Oculi magni. Color tristis f. plumbeo-æneus. Pedes nigro luteoque variegati.

Alæ certo situ pulchre coloratæ. V.

Ex nost. Musf.

Semiluæti- 137. M. (le demi-deuil) antennis setariis nuda nigra, albo variegata. t. 9. f. 23.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Magna. Os larvatum album. Occiput album. Thorax niger, maculis sex rotundis albis, duabus aliis longitudinalibus obliquis, parte infima acutis, duabus aliis transversalibus, postice albido marginatum. Scutellum lividum. Abdomen atrum, macularum albarum tribus paribus, omnibus interruptis in medio, subtus cingulis tribus albidis; segmentum primum nigrum immaculatum; quartum macula albida f. albido-flava notatum, præter duas maculas albas. Alæ basi lutescentes, apice luteo fuscæ. Pedes flavi; femora posteriora dimidiato fusca.

Virides- 138. M. (la verdâtre) antennis setariis tomentosa, viridi-ænea. t. 9. f. 24.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Antennæ filatæ nigræ, seta laterali rufa. Corpus crassum, fere quadrangulare. Thorax & abdomen fusco-ænea, pilis densis viridibus, lucidis testæ. Alæ venis lutescentibus. Femora viridi-ænea, tibiæ & tarsi rufi.

Clauda. 139. M. (la boiteuse) antennis setariis tomentosa, abdomine sericeo-viridi,

femoribus posticis crassis, incurvis ;
spina armatis.

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Media, bombinatricis apis facie.
Species singularis, valde tomentosa.
Abdomen aurato-viride. *Femora* postica crassa, curva, hirsuta, spina valida in parte inferiori armata. *Tibiae* incurvatae. Hac structura irregulariter incedit. *Femora* omnia hirsuta. *Alae* abdomine breviores ut in musca *apiformi* *D. de Geer.* a qua differt femorum posticorum forma. Differt adhuc musca. *n.* 30. *D. Geoff.* & musca *femorata.* *Syst.*

Obs. Valde affinis *M. clavipedi* *D. Fab.* & *crassipedi* *Enum.* diversa tamen aut insignis varietas. Prima minor ; *femora* postica minus crassa, minus hirsuta. A secunda diversa abdomine immaculato, sed viridi-sericeo.

Speculife- 140. *M.* (porte - miroir) antennis setariis nuda, fronte nigra lucida, pedibus nigris. *t.* 9. *f.* 25.

Hab. in Europa rarissima.

Desc. Media. *Oculi* magni rubelli, postice coaliti. *Frons* nigra, lucida, nitida, inde nomen. *Abdomen* & *pedes* nigri. *Alae* magnae, basi ferrugineae.

Cærulef- 141. *M.* (la bleuâtre) nigro-cærulescens, alis fuscescentibus. *t.* 9. *f.* 26.

Hab. in Europa. In Bressia rara.

Desc. Major, non maxima. *Tota* unicolor, scilicet nigro-cærulescens. *Alae* fuscescentes. *Abdomen* laterali vellere albido spisso vestitum. *Pedes* fere nigri.

Elegans. 142. *M.* (l'élégante) ænea tomentosa, antennis,

antennis, alis pedibusque flavescentibus.

t. 9. f. 27.

Hab. in Europa. In Gallia Australiori.

Desc. Magna. *Antennæ* rufo flavescentes.

Oculi magni brunnei. *Thorax* triste æneus, lente tomentosus. *Alæ* dimidiato flavescentes, apice fuscæ. *Abdomen* nitido - æneum, incisurarum marginibus ciliatis; semiannuli nigri in singulo segmento, obliqui in medio interrupti. *Pedes* flavescentes. *Femora* dimidiato nigra, nigredine versus basin.

Ex Faun. Fridr.

Punctata. 143. M. (la pointillée) antennis setariis tomentosa, oculis viridibus punctatis, thorace quinque lineato abdomineque nigro obruso.

Hab. in Europæ campis.

*** *Pilosa plumata.*

Inanis. 144. M. (la vide) antennis plumatis pilosa flavescent, abdomine pellucido cingulis duobus nigris. *

Geoff. parif. 2. p. 543. t. 18. f. 4. nemo-telus I.

Pod. gr. conops trifasciatus.

Fab. M. I.

Hab. in Europa. In Gallia, in monte vulgo Pila. *Mus. D. Blain.* V.

Simillima sequenti, sed thorax maris villoso-flavus. Abdomen pellucidum, flavum, cinctum fasciis duabus nigris & ano nigro. Rostrum utrinque corneum glabrum. Alæ absque fascia.

Desc. Magna. Rostrum utrinque corneum, glabrum. Thorax subvillosus, nigricans. Scutellum testaceum. Abdomen

flavum pellucidum, nigricans, basi apiceque nigrum; segmenta tria priora margine nigra, primo bifido. *Pedes* fufcescentes, *tibiis* pallidioribus. *Faun.* 1825.

Obs. Definitio *Linn.* ad descriptionem forsan non quadrat: in musca *inani* *Syst. Alæ* absque fascia, anusque niger, quæ notæ nec muscæ *apiariæ* *D. de Geer.* nec imagini *D. Schæff. t. 36. f. 7, 8.* conveniunt; inde synonymiam *D. Fab.* subtraxi & ad muscam *apiariam* retuli. Vera musca *inanis* rarior apud nos; descriptionique *Syst.* conformis.

Pellucens. 145. *M.* (la transparente) antennis plumatis: pilosa nigra, abdominis segmento primo albo pellucido. * *t. 9. f. 28.*

Raj. inf. 271. *n. 1.*

Sulz. inf. t. 20. f. 133.

Geoff. paris. 2. p. 540. t. 18. f. 3. vo-
lucella 1.

Fab. M. 2.

Enum. n. 920.

Scop. carn. conops dryophilus.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 966.

De Geer tom. 6. p. 53. t. 3. f. 1. an-
tennis plumatis pilosa nigra, fronte flava, abdominis secundo segmento albo pellucido, alis macula venisque fuscis.

Hab. in Europa.

Desc. Certe hæc, si non maxima muscarum nostratum sit, inter maximas tamen omnino est. *Fronte* gaudet alba, flava, cornea. *Alæ* albæ, præsertim versus basin: in medio alarum macula magna nigra: intra hanc maculam & apices alarum venæ fuscæ. *Abdomen* dimidiatum, versus basin supra & subtus, album, pellucidum, versus apicem

nigrum. *Pedes* nigri. Minus pilosa est quam præcedens. *Oculi* fusci. *Antennæ* flavæ, seta pilosa nigra. *Faun.* 1826.

Obs. 1. Variat magnitudine thoraceque nigro vel pilis rufis lateraliter vestito. An varietas sexus?

Obs. 2. *Scutellum* flavescens. *Alæ* macula fusca.

Meridia- 146. M. (la méridienne) antennis plumatis
na. pilosa nigra , fronte aurata , alis basi luteis. *

Scop. carn. 867.

Fab. M. 3.

De Geer tom. 6. p. 55. n. 2. antennis plumatis , pilosa nigra , alis basi flavo-testaceis.

Reaum. inf. 4. t. 26. f. 10.

Harris. inf. Angl. t. 9. f. 9.

Schæff. icon. t. 108. f. 7.

Geoff. tom. 2. p. 495. n. 5.

Enum. n. 922.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 966.

Faun. Fridr. n. 726.

Hab. in Europa.

Desc. Tota nigra , sed ante oculos macula utrinque deaurata. *Pili* nigri s. potius setæ sparsæ per totum corpus. *Pedes* nigri. *Abdomen* ovatum. *Alæ* hyalinæ , versus basin flavæ sive potius ferrugineæ. *Faun.* 1827.

Obs. Nec *D. Geoff.* nec *D. Reaum.* citavit *Linn.* sed in synonymia *M. grossam* *Reaum. tom.* 4. t. 26. f. 10. indicavit , licet certum sit muscam meridianam *ibid.* delineatam esse. V.

Cæsar. 147. M. (César) antennis plumatis pilosa viridi-nitens , pedibus nigris. *

Gg ij

Scop. carn. 871.

Mouff. inf. t. 49.

Raj. inf. 272.

Merian. Eur. 1. t. 49.

Geoff. paris. 2. p. 522. *n.* 53.

Reaum. inf. 4. t. 8. f. 1. & t. 19. f. 8.

Fab. M. 10.

Enum. n. 923.

Poda gr. p. 115.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 966.

Faun. Fridr. n. 727.

Hab. in cadaveribus.

Desc. Muscadomestica duplo major. Totum corpus thoraci & abdomini concolor, scilicet e viridi-sericeum, sive viridi-æneum, valde nitens & politum. *Pedes* atrii. *Oculi* rufo-fusci, linea duplici transversim insculpta thoraci. *Abdomen* quatuor articulis, ovatum. *Faun.* 1828.

Cadaveri-148. *M.* (la dorée) antennis plumatis pilosa na. æneo-nitens, thorace cæruleo, abdomine viridi. *

Gæd. inf. 1. t. 54.

List. Gæd. f. 123.

Geoff. paris. 2. p. 524. *n.* 57.

Fab. M. 12.

Enum n. 925.

Faun. Fridr. n. 928.

De Geer tom. 6. p. 62. n. 7. antennis plumatis pilosa, thorace viridi, cæruleo nitente, abdomine cæruleo-violaceo, pedibus nigro.

Hab. in cadaveribus. In Gallia Aust. V.

Desc. Facies præcedentis, sed minor, muscæ domesticæ æqualis. Differt & colore thoracis cæruleo a præcedenti. *Faun.* 1829.

Mortuorum.149. *M.* (la chrysocéphale) antennis

plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine viridi. *

Fab. M. 15.

De Geer tom. 6. p. 60. n. 5. antennis plumatis pilosa, capite aureo-flavo, thorace nigro-violaceo, abdomine viridi-cæruleo nitente.

Faun. Fridr. n. 729.

Hab. in cadaveribus.

Desc. Facies omnino sequentis, a qua solum differt quod paullo major sit, quod *abdomen* e cæruleo-viridi niteat cupri instar quodque frons inter oculos, una cum antennis & ore, albo-aurata sit s. membranæ, quod in sequenti non obtinet. *Faun.* 1830.

Obs. Licet *D. Fab.* muscam *chrysocephalam D. de Geer* pro musca vomitoria habuerit, ex descriptione præcedenti constat synonymiam *D. de Geer* optimam esse; nam *frons aurata* nota characteristica est quæ separat hanc speciem a sequenti. V.

Obs. *Thorax* sublineatus. *Pedes* nigri.

Vomitoria. 150. M. (la nauséabonde) antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine cæruleo nitente. *

Scop. carn. 868. musca carnaria.

Gæd. inf. 1. t. 53.

List. Gæd. f. 122.

Raj. inf. 27.

Reaum. inf. 4. t. 19. f. 8.

— t. 24. f. 13, 15.

Geoff. inf. 2. p. 524. n. 59.

Lyonet. leff. t. 1. f. 23, 27.

Fab. M. 17.

Enum. n. 926.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 967.

Faun. Fridr. n. 730.

De Geer tom. 6. p. 57. n. 4. antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine cæruleo nitente, fasciis nigris.

Hab. in cadaveribus etiam Americæ. Kalm. tres muscæ consumunt cadaver equi, æque cito ac leo.

Desc. Musca domestica duplo major. Capite & thorace nigro, solo abdomine cæruleo nitido. Faun. 1831.

Obs. Affinis M. cadaverinæ, at frons fulva, & thorax niger vix lineatus.

Carnaria. 151. *M. (la carnivore) antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitidulo tessellato, oculis rubris.**

Scop. carn. 869. (subvariegata).

Aldr. inf. 348. t. 2. f. 16.

Jonst. inf. t. 8. O. 2. f. 16.

Raj. inf. 270.

Frisch. inf. 7. t. 14.

Reaum. inf. 4. t. 29. f. 4.-6.

Rœs. inf. 2. musc. t. 9. f. 10.

Geoff. paris. 2. p. 527. n. 65.

Fab. M. 4.

Enum. n. 927.

Pod. gr. p. 115.

Faun. Fridr. n. 731.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 967.

De Geer tom. 6. p. 63. n. 8. t. 3. f. 5. antennis plumatis pilosa cinerea, oculis rubris, thorace lineis tribus nigris, abdomine maculis nigris cinereisque tessellato; major.

Hab. in cadaveribus Europæ, etiam Americæ. Kalm. ano fulvo a domestica differt. Geoff.

Desc. Eadem cum M. domestica, demta magnitudine, qua illa huic cedit; hæc enim duplo major & alio modo volitans. Faun. 1832.

Domestica. 152. M. (la domestique) antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis 5 obsoletis, abdomine nitidulo tessellato, oculis fuscis. *

Scop. carn. 872.

Aldr. inf. t. 2. f. 23.

Joblot. micr. I. pp. t. 5.

Raj. inf. 270.

Fab. M. 7. antennis plumatis, thorace lineato, abdomine tessellato, subtus basi pallido..

Faun. Fridr. n. 732.

De Geer tom. 6. p. 71. n. 10. t. 5, 6. f. 5, 6. antennis plumatis pilosa, thorace cinereo-nigro lineis obscuris, abdomine nigro-fusco maculis nigris, subtus pallide flavo-fusco, alarum basi fulva.

Enum. n. 928.

Poda gr. p. 115.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 967.

Hab. in fimo equino. Puppæ parallelæ; cubantes. Vulva hujus pro pene perperam vulgo habetur.

Desc. Nigra est. *Oculi* rubent, sub his linea alba. *Abdomen* nigro & incano tessellatum. *Thorax* tribus canis lineis. Differt a præcedente quod dimidio minor; quod non, uti prior, sub volatu bombos edat; quod non ita putrida quærat; quodque aliter generetur. Sola magnitudo in facie externa distinctam reddit, quamvis accuratius intuenti varia signa se sistunt. *Faun.* 1833.

Maculata. 153. M. (la tachetée) antennis plumatis pilosa nigra, thorace nigro-lineato, abdomine atro maculato, ano bipunctato.

Scop. carn. 870.

Fab. M. 20. *vulpina* antennis plumatis, thorace lineato, abdomine subferrugineo, nigro maculato.

De Geer tom. 6. p. 84. n. 13. t. 3. f. 19, - 22, antennis plumatis pilosa nigro-cinerea, maculis nigris, thorace lineis quatuor nigris.

Hab. in floribus Europæ, Sueciæ. In Gallia Aust. V.

Similis M. domesticæ, sed pallidior, magisque glauca. Vertex lineis 2 nigris, approximatis. Thorax lineis nigris, interruptis. Abdomen maculis difformibus, in singulis segmentis; ad extremum anum maculæ 2 ovales; omnes atræ.

Albifrons. 154. *M.* (la frontale) antennis plumatis pilosa nigra, fronte alba. *

Reaum. inf. 4. t. 26. f. 5.

Scop. carn. 877?

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo & facies omnino muscæ domesticæ, at color magis niger. Abdominis latera parum ferruginea. Frons alba, pilis quibusdam nigris. Magis etiam glabra est, quam musca domestica. *Faun.* 1834.

Furta, 155. *M.* (la voleuse) antennis plumatis pilosa nigra, alis deflexis fuscis margine laterali albis.

Hab. Upsaliæ, sub foliis herbarum. *C. P. Thunberg.*

Corpus atrum, pilis adpersum, magnitudine pediculi. Alæ nigræ, semper deflexæ, imprimis posteriora versus. Pedes albi. Singularis admodum antennis testaceis, subrotundis, sed una

*cum proboscide retractis intra cranium,
nec cranio insident antennæ.*

Sepulchra. 156. M. (la sépulchrale) antennis plumatis
lis. pilosa nigra, abdomine atro nitidulo,
supra glaberrimo. *

Hab. in Europa.

Desc. Statura muscæ domesticæ, sed tota
atra. Corpus nigrum. Oculi purpuras-
centes, punctis nigris sparsis. Antennæ
apice subferrugineæ; alter sexus seta
non pilosa. Abdomen supra nigredine
nitens. Genua subferruginea. Faun.
1834.

Ex Entom. Carn. D. Scop.

Obs. Omnes muscas, quarum antennæ sunt
plumatæ, sive tomentosas sive setarias,
huic divisioni addidi. V.

Variegata. 157. M. (la variée) antennis plumatis
cinerascens, thorace lineis tribus atris,
abdomine nigro tessellato.

Hab. in Europa. In horto, Idriæ capta.

Obs. Diversa a M. *variegata*. D. de
Geer. V.

Desc. Antennæ nigræ. Linea nigra ab
antennis ad occiput usque decurrens.
Scutellum linea longitudinali nigra.
Abdomen nitens, linea dorsali media
maculisque nigris, apice setosum;
subtus nigris punctis adspersum. Halte-
rum squama alba. Alæ immaculatæ.

Cæsarina. 158. M. (la Césarienne) antennis plu-
matis pilosa, viridi-nitens pedibus
nigris.

Fab. M. n. 10. β.

Hab. in sterquiliniis. In Gallia Aust. V.

Desc. Per omnia simillima muscæ *Cæsari*, nisi quod constanter minor, minus setosa, ac magis in cæruleum colorem inclinans, *defin.* & *desc.* ex *Enum.* sumtæ.

Coloßus. 159. M. (la colossale) antennis plumatis, fronte aurata, oculis fulvis, thorace cinereo, lineis tribus dorsalibus nigris, parallelis, abdomine thoraci subconcolore, nigro tessellato.

Hab. in Europa.

Desc. Maxima inter nostras. *Os* fetis, duabus cruciformiter incumbentibus terminatum. *Halterum* squama alba. *Abdomen* incurvum, apice magis setosum. *Pedes* nigri.

Martia. 160. M. (la printaniere) antennis plumatis, fronte argentea, thorace lineolis quatuor cinereis, abdomine albido, nitido, nigro tessellato.

Hab. in Europa. Circa domos reperitur Martio M.

Desc. Major M. *domestica*. *Thorax* nitidus, setosus & pilosus, puncto nigro tuberculoque nigro ad latera prope caput. *Scutellum* cinerascens. *Halterum* squama alba. *Pedes* nigri.

Obs. Nimium affinis magnæ muscæ *domesticæ*. *D. de Geer.* *Syst. M. domesticam* descripsit *D. Scop.* qui vicissim citatur in *Syst. edit.* 12; inde aut musca *Martia domestica* mera est varietas, aut *D. de Geer.* synonymia reformanda. V.

Tugurio- 161. M. (des chaumieres) antennis plumatis pilosa cinerea, palpis, scutello pedibusque ferrugineis. *Enum.*

Enum. n. 929.

Hab. in Europa. Circa æquinoctium verum, prope rusticorum tuguria frequens. In Bressia. V.

Desc. Tota cinerea. Abdomen pallidius, tessellato nitens. Antennæ rufæ uti & palpi; antennæ cranio non insident, sed subtus illud prostrant basique labii superioris incumbunt. Oculi brunnei. Thorax cinereus, non nihil lineatus. Halterum squama alba. Scutellum rufum, apice punctis binis atris, ad lentem in conspectum subeuntibus. Pedes rufi. Femora antica tota & media ad basin nigra. Enum.

Obs. Positione antennarum singularis, M. furcæ affinis videtur. Neutram vidi. V.

Nigrita. 162. M. (la negresse) antennis plumatis nigerrima nitens, alis costa nigris, halterum squama alba.

Hab. in Europa.

Desc. Oculi fusci. Abdomen segmentis ciliatis. Alæ ad costam feminigræ. Halteres nigri, clava basi pallidiore puncto notata.

Corni. 163. M. (du cornouiller) antennis plumatis nigra, alis basi scutello pedibusque ferrugineis.

Hab. in Europa. Inter aphides corni.

Desc. Thorax lineis cinereis. Halterum squama ferruginea. Abdomen obcordatum.

Angelicæ. 164. M. (de l'angélique) antennis plumatis cinerea, ocello quadrato occipitali, alis basi ferrugineis.

Hab. in Europa. Frequens in floribus angelicæ sylvestris.

Desc. Statura *M. domesticæ*. *Oculi* brunnei.
Pedes ferruginei.

Rufiven- 165. *M.* (la xanthogastrique) fusca , abdom-
 tris. mine pedibusque ferrugineis.

Hab. in Europa. In Carniolia calidiore.

Desc. Magnitudo prioris. *Halterum* squama
 ferruginea. *Abdomen* nitens , sub-
 pellucidum.

Tripuncta-166. *M.* (la triponctuéé) alæ sedentis erec-
 ta. tæ , punctis fuscis tribus.

Hab. in Europa. Circa Idriam.

Desc. *Corpus* agile , alarum longitudine.
Caput ferrugineum. *Oculi* virescentes.
Thorax antice gibbus. *Halteres* albi ,
 nudi. *Abdomen* oblongum , nitidum ,
 ano piloso & fuscum stercus facile
 fundente. *Alæ* patulæ & erectæ.

Rufa. 167. *M.* (la rousse) tota rufa & nitens ,
 oculis brunneis , nucha puncto nigro.
Pedibus corpore pallidioribus.

De Geer tom. 6. p. 96. n. 19. t. 5. f. 17.
 antennis plumatis pilosa flavo-rufa ,
 oculis viridi-flavis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura *M. scybalariæ*. *Occiput*
 binis paribus pilorum nigrorum. Tu-
 bercula tria pellucida , pallidiora , puncto
 nigro occipitali circumstantia. *Antennæ*
 deflexæ , plumula nigricante , quæ
 nudis oculis seta videtur. *Palpi* rostro
 obscuriores. *Thorax* dorso punctulato ,
 raris pilis adsperso. *Scutellum* pilis
 duobus terminatum. *Halteres* nudi ,
 colore pedum. *Femora* & *tibiæ* pallide
 flavescunt. *Alæ* puncto & maculis
 destitutæ.

Amenta- 168. M. (des chatons) abdomine æneo-
ria, fusco , basi truncato , thorace fusco ,
 setoso.

Hab. in Europa. Copiosa occurrit in
 amentis salicis Martio M.

Desc. Statura M. *Cæsar*is eademque cras-
 sitie. *Antennæ* deflexæ. *Oculi* castanei.
Thorax pilis rufescentibus setisque ni-
 gris. *Halterum* squama pallide ferru-
 ginea. *Abdomen* fuscum , æneum , ni-
 tens , villosulum , ovo transversum per
 medium secto simile. *Pedes* nigri.

Unguicor- 169. M. (l'armée) capite supra , antennis
nis. porrectis pedibusque rufis , alis costa
 fusca & postice fusco reticulatis.

Hab. in Europa. In Carniolix cultis non
 rara.

Desc. *Antennæ* caput terminant , porrectæ
 cornuum ad instar , articulo primo com-
 presso rufo pilisque nigris pubescente ,
 secundo nigricante acuminato minore.
 Paria duo punctorum nigrorum inter
 nucham & antennis , puncto alio majore
 ad nucham thoraci contiguo. *Thorax*
 fuscus , linea fulva dorsali & alia pariter
 fulva in singulo latere. *Alæ* hyalinæ ,
 costa fusca & obsolete fusco reticulatæ
 infra medium. *Halteres* subnudi , capi-
 tuli latere fusco. *Abdomen* cylindra-
 ceum , nitens , fuscescens , linea lon-
 gitudinali obscuriore. *Pedes* rufi , *fe-*
moribus crassiusculis , pilosis.

Fumigata, 170. M. (l'enfumée) nigricans , Oculis
 fasciis binis transversis rubris , ore
 albo , alis costa nigra , alibi fusco
 reticulatis alboque maculatis. t. 9. f. 29.

Hab. in Europæ pratis. In Bressia. V.

Desc. *Caput* antennis terminatum porrectis ,

fusco-ferrugineis, pluma alba. Maculæ duæ nigerrimæ, oculis interne adjacentes. Nucha albida, puncto medio lucido nigro. *Os* subargenteum. *Rostri* apex *palpi*que ferruginei. *Thorax* fusco-cinereascens, punctis nigris. *Alæ* ad apicem punctis albis, rotundis, distinctis variegatæ; alibi fusco reticulatæ, margine crassiore nigro. *Halteres* nudi. *Abdomen* oblongum, lucidum, nigricans. *Pedes* nigri.

Coryleti. 171. *M.* (des coudriers) ferruginea, oculis fasciis duabus fulvis, alis punctis strigisque fuscis variegatis.

Hab. in Europa, inter corylos.

Desc. *Antennæ* porrectæ caput terminantes, apice nigræ, plumula nigricante basi pallide ferruginea. *Os* argenteum. *Caput* supra lucidum; rufum. *Thorax* pallide ferrugineus, lineolis dorsalibus binis saturatioribus. *Abdomen* thoraci concolor, cylindraceum, segmentis margine obscurioribus. *Pedes* ferruginei.

Longipes. 172. *M.* (la difforme) fusca nitens, fronte fulva, ore argenteo, pedibus ferrugineis, femoribus posticis abdomine duplo longioribus.

Hab. in Europæ sylvis, Majo *M.*

Desc. *Lin.* ($3\frac{1}{2}$) longa, dimidiam crassa. *Antennæ* rufæ. *Halteres* pallidi. *Alæ* immaculatæ, costa venisque ferrugineis. Genua fascia nigra.

Fungorum. 173. *M.* (des champignons) supra fuscescens, subtus pedibusque pallidioribus.

De Geer tom. 6. p. 89. n. 89. t. 5. f. 5, 6. antennis oblongis plumatis pilosa,

corpore ovato brevi, thorace griseo-cinereo, abdomine pedibusque flavo-rufis?

Hab. in boleto cervino.

Larva albida non saltatrix, capite fusco, abdominis apice bifido, segmentis decem, quorum margines pilis nigris brevibus ciliati.

Desc. Musca parvula. *Oculi* castanei. *Rostrum* halteribus concolor. *Occipitis* tuberculus fuscus. *Abdomen* oblongum, nitidum fuscum, segmentis margine ferrugineis. *Halteres* nudi. *Alæ* hyalinæ corpore longiores, margine crassiore venisque fuscis.

Punctulata, 174. M. (la pointillée) oculis ferrugineis, fasciis duabus fulvis, alis nigris, punctis rotundis albis variegatis.

De Geer tom. 6 p. 96. n. 20. t. 6. f. 1. antennis plumatis pilosa griseo-fulva, thorace punctis fuscis, oculis obscuris, alis fusco maculatis?

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Frons* alba. *Antennæ* porrectæ ferrugineæ, caput terminantes. *Thorax* pallide ferrugineus, punctulis fuscis sparsis minoribus majoribusque in quatuor series longitudinaliter dispositis. *Abdomen* cinereum, oblongum, maculis nigris. *Pedes* pallidi, fascia obscuriore prope genua.

Coleoptra- 175. M. (la coléoptrée) nigra, alis arcuatis fuscescentibus, corpore nigro, ore, thorace subtrus pedibusque albidis.

Hab. in Europa.

Desc. Iners, superne nitens. *Abdomen* ellipticum. *Alæ* costa obscuriores, rigidulæ, arcuatæ, coleopteri ad instar, Genua postica nigra.

Ex op. D. de Geer.

Apivora. 176. M. (l'apivore) antennis plumatis pilosa, capite flavo, thorace nigro, abdomine fasciis flavis nigrisque, alis flavescentibus fusco maculatis.

Reaum. inf. tom. 4. t. 33. f. 15.

Schaff. icon. t. 36. f. 7, 8.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Antennæ luteæ. Oculi rubello-fusci. Thorax niger, linea laterali utrinque fusca. Scutellum fuscum. Abdomen fasciis alternatim nigris luteisque; subtus luteum fasciis duabus nigris. Anus nigro maculatus. Alæ lutescentes, fusco maculatæ. Pedes rufi aut brunnei nigro variegati.

Obs. Licet D. Fab. hanc muscam ad M. inanem Linn. retulerit, species tamen videtur propria, uti designavit. D. de Geer. V.

Vivipara 177. M. (la petite vivipare) antennis plumatis pilosa, oculis rubris, thorace lineis tribus nigris, abdomine maculis nigris cinereisque tessellato; minor.

Hab. in cadaveribus. In Gallia Aust. V.

Desc. M. carnaria dimidio minor; at magnitudo non est sexus varietas. Insuper haud dissimilis. Cæterum a M. carnaria nec structura nec coloribus differt.

Obs. Optime animadvertit. D. Fab. nomina trivialia a magnitudine non sumenda esse. Præter has duas muscas viviparas tertiam descripsit D. Geoff. quæ vivipara est, quartaque a D. Reaum. cognita. tom. 4. t. 29. f. 9. f. 10, 11. V.

Autumnalis. 178. M. (l'automnale) antennis plumatis pilosa.

pilosa nigra, abdomine flavo-testaceo, fascia longitudinali dorsali nigra.

Fab. M. 21. antennis plumatis nigra, abdomine testaceo, linea dorsali nigra.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Musca domestica minor. Thorax niger, certo situ æneo-nitens. Antennæ nigræ. Alæ diaphanæ, basi fuscescentes. Abdomen fulvo-luteum, linea dorsali nigra denticulata.

Tentaculata. 179. M. (la tâteuse) antennis plumatis pilosa nigra, abdomine maculis nigris cinereisque, rostro tentaculis magnis flavescentibus, ovatis, depressis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Nigra. Palpi lutei, ultra caput porrecti. Caput antice albidum. Alæ nigricantes. Abdomen nigrum, maculis nigris cinereisque distinctis.

Testacea. 180. M. (la fauve) antennis plumatis pilosa tota flavo-testacea, pilis nigris, oculis brunneis.

Fab. M. 22. antennis plumatis cinerea, scutello, abdomine pedibusque testaceis.

Hab. in Europa. In Germania *D. Fab.* In Gallia Aust. V.

Ex spec. D. Fab.

Canina. 181. M. (la canine) antennis plumatis setariis cinerea, thorace punctis, abdomine strigis nigris. M. 24.

Hab. in Anglia. *Mus. D. Banks.* In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Thorax valde pilosus, cinereus, punctis quatuor distinctis dor-

salibus nigris. *Abdomen* pilosum, obconicum, cinereum, segmentorum marginibus nigris. *Pedes* testacei.

Plébeia. 182. M. (la Plébéienne) antennis plumatis nigra, pedibus rufis. M. 25.

Hab. in Germania, Kiliæ.

Desc. Magnitudo sequentis. *Caput* nigrum, certo situ griseo nitidum. *Thorax* pilosus, niger, lineola media baseos cinerea. *Scutellum* testaceum. *Abdomen* pilosum, atrum. *Pedes* rufi, plantis nigris.

Rustica. 183. M. (la rustique) antennis plumatis grisea, femoribus rufis. M. 26.

Hab. Hafniæ.

Desc. magna, tota grisea, pilosa, femoribus solis rufis.

Elata. 184. M. (l'hydrocéphale) antennis plumatis fetaria pallide testacea, alis punctis duobus costaque fuscis. M. 27.

Hab. Kiliæ.

Desc. Affinis M. *cucullariæ*. *Os* vesiculosum, album. *Antennæ* rufæ, seta plumata nigra. *Thorax* pilosus, pallide testaceus sive griseus. *Abdomen* & *pedes* dilutiora, testacea. *Alæ* albidæ, punctis duobus, posteriore majore transverso, fuscis, costa alarum nigra.

Pallida. 185. M. (la pâle) antennis plumatis pallide testacea, ano plantisque nigris. M. 25. *Mantiff.*

Hab. Hafniæ. D. Lund.

Desc. Statura & magnitudo M. *testaceæ*, pilis nigris hirta. *Thorax* & *abdomen* pallide testacea. Ultimum abdominis segmentum fuscum. *Pedes* pallidi, apice nigri.

Lupulina. 186. M. (du houblon) antennis plumatis
setaria nigricans, abdomine pedibus-
que posticis testaceis. M. 32. *Mantiss.*

Hab. in Selandia. D. de Scheffedt.

Desc. Parva. *Antennæ* testaceæ, seta
nigra plumata. *Thorax* niger, cinereo
nitidulus. *Abdomen* testaceum imma-
culatum. *Pedes anteriores* nigri, *postici*
testacei. *Alæ* pallide testaceæ.

Funebris. 187. M. (la funébre) antennis plumatis fusco-
ferruginea, abdomine nigro, segmento-
rum marginibus pallidis. M. 33. *Mantiss.*

Hab. Hafniæ. D. Lund.

Desc. Minuta. *Caput* obscurum, *orbita*
oculorum parum argenteo nitente.
Thorax obscure rufus, immaculatus.
Abdomen nigrum, segmentorum mar-
ginibus albidis. *Alæ* magnæ, hyalinæ,
immaculatæ. *Pedes* testacei.

Ex Enum.

Trifascia- 188. M. (la trifasciée) antennis plumatis
ra. pilosa, thorace nigro, lineis duabus
lateralibus apiceque flavis, abdomine
flavo, cingulis tribus nigris.

Scop. n. 953. conops trifasciatus.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. sylvis. V.

Obs. Vera musca Linn. & non conops.
Uti in *Enum.* optime indicatur. *Abdo-*
men basi nigrum præter cingulos tres
nigros. V.

Zonaria. 189. M. (la cerclée) antennis plumatis
subpilosa, abdomine flavo, cingulis
nigris supra binis, subtus tribus. t. 9.
f. 30.

Scop. n. 954. conops bifasciatus.

Poda M. gr. p. 118.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 504. n. 23.
varietas.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. Licet definitio *Syst.* huic muscæ
conveniat; attamen diversa species nec
pro *M. inane* nec pro *M. pellicente*
haberi potest. V.

Melanura. 190. M. (la mélanure) antennis plumatis
pilosa cinerea, ano nigro, pedibus
ferrugineis.

Hab. in Europa.

Tau. 191. M. (le tau) antennis plumatis pilosa
nigra, abdomine pallide ferrugineo,
basi lineaque media nigris.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra, pilosa, nobilis. *Abdominis*
primum segmentum supra atrum, subtus
& reliqua segmenta utrinque pallide
ferruginea. A nigredine baseos per
medium *abdomen* usque ad anum de-
currit linea atra, quæ cum ipsa basi
formam *Tau* latini effingit.

***** *Pilosæ setariæ.*

Fera. 192. M. (la farouche) antennis setariis
pilosa nigra, abdominis lateribus tes-
taceis diaphanis. *

Harris. inf. Angl. t. 9. f. 2.

Fab. M. 28.

Enum. n. 934.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 964.

Faun. Fridr. n. 734.

Geoff. tom. 2. p. 509. n. 33.

Hab. in Europa.

Desc. Simillima *M. carnariæ*, sed latera
rufo-testacea, diaphana. *Thorax* non
lineatus. *Faun. 1836.*

Obs. In *Syst. D. Geoff.* non citatus fuit. Certe tamen *D. Fab.* muscam n. 33. *inf. paris.* pro musca fera *Linn.* optime jure habuit, licet in hac abdomen nigrum, in illa testaceum sit. V.

Grossa. 193. M: (la grosse) antennis-setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis. *

Reaum. inf. 4. t. 26. f. 10.

Fab. M. 4.

De Géer tom. 6. p. 21. n. 1, 2. antennis setariis pilosa nigra, capite flavo, oculis fuscis, alis basi ferrugineis.

Schæff. icon. t. 108. f. 6.

Harrif. inf. Angl. t. 9. f. 1.

Hab. in stercore bovino. In Gallia Aust. V.

Similis M. meridiana, sed major omnibus nostris muscis.

Desc. Corpus maximum omnium muscarum nostratum, undique hirtum s. pilosum. *Caput* flavissimum. *Oculi* nigri. *Antennæ* ferrugineæ, apicibus nigris. *Alæ anticae* ferrugineæ. *Ungulæ* pedum flavæ. *Faun.* 1837.

Obs. 1. *DD. Linn. & de Geer.* quorum descriptiones similes *inf. paris.* minime citaverunt, sed dissimiles in synonymia *D. Reaum.*

Obs. 2. In specie *D. Fab.* pro musca *meridiana & grossa. Reaum. tom.* 4. t. 26. f. 10. indicatur. *Grossa* est musca atra, basi alarum ferruginea. *Geoff. tom.* 2. p. 495. n. 54.

Obs. 3. Ex *Enum.* patet muscæ *grossæ Linn.* descriptionem muscæ *D. Geoff.* non convenire. Reipsa differunt, nec ad n. 5. *inf. paris.* referendæ; nam in hac antennæ plumatæ sunt. Solus igitur *D. de Geer.* veram muscam *grossam Syst.* descripsit. Nostra 8 lineas longa est. V.

Rotundata. 194. M. (l'arrondie) antennis setariis pilosa, thorace sublineato, abdomine subrotundo flavo, maculis longitudinalibus fuscis confertis. *

Scop. carn. n. 883.

Fab. M. 33.

De Geer tom. 6. p. 28. n. 8. antennis setariis subglabra, capite magno albidio, thorace nigro lateribus albidio, abdomine subrotundo, rufo, maculis quatuor nigris.

Faun. Fridr. n. 735.

Harris. inf. Angl. t. 9. f. 5, 6.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 509. n. 32.

Hab. in Europa,

Desc. Magnitudo *M. domesticæ*. Caput ore albo, vertice inter oculos argenteo. *Thorax* cinereus, lineis nigricantibus. *Abdomen* rotundatum, flavum, punctis dorsalibus quinque rotundatis, longitudinaliter digestis, fuscis, in altero sexu remotis, in altero contiguis. *Pedes* nigri. *Faun.* 1838.

Obs. 1. Variat: nam in plurimis puncta abdominis quatuor duoque lateralibus, versus anum. V.

Obs. 2. Abdominis incisuræ oculis vix distinguuntur. *Geoff.*

Obs. 3. Puncta dorsalia in altero sexu connata.

Tremula. 195. M. (du tremble) antennis setariis pilosa atra nitens, alarum basi, squama halteribusque ferrugineis.

Scop. carn. 885.

Fab. M. 32.

Hab. in Europa, Suecia. In Bressia. V.

Magnitudo M. domesticæ, magis oblonga.

Abdomen secundum lineam longitudi-

*nalem & lateribus setis longis hirta ,
versus anum pluribus.*

Obs. Minor *M. fera* magisque oblonga ,
abdomine nitido.

Larvarum, 196. *M.* (des larves) antennis setariis
pilosa nigricans , scutelli apice sub-
testaceo , abdomine pallidius tessellato. *

Scop. carn. 888.

Amiral. t. 6.

De Geer tom. I. p. 196. *t. II. f.* 23.

— *tom. 6. p.* 24. *t. 6.-8.* *musca major*
larvarum antennis setariis pilosa nigra ,
thorace lineis longitudinalibus atris ,
abdomine maculis cinereis.

Enum. n. 937.

Faun. Fridr. n. 736.

Hab. in larvis lepidopterorum ; mihi visa
in radicibus Brassicæ oleracæ , unde
radix strumosa & inde capita laxa.

Similis M. domesticæ , sed major , ca-
nescens. Thorax nigro-lineatus , sed
scutelli apex pallens.

Desc. Tota nigra. Labium argenteum.
Scutellum fordide ferrugineum , *linea*
longitudinali saturatiore. Abdomen ci-
nereo tessellatum , segmento primo &
secundo in latere fusco - testaceis.
Cætera , ut apud Linnæum.

Obs. An omnes *muscæ larvarum* unius
speciei varietates ?

Radicum. 197. *M.* (des racines) antennis setariis
pilosa , abdomine cinereo , linea dor-
sali cingulisque quatuor nigris *

Fab. M. 35. abdomine cinereo nigro
fasciato.

Faun. Fridr. n. 737.

Hab. in radicibus raphani. Forskal. Fre-
quenter cum M. caniculari choreas

agit, mixta illius turbæ; an itaque tantum sexu diversa? quamvis colore aliena.

Desc. Simillima *M. domesticæ*, sed dimidio minor. *Abdomen* nigrum, fasciis quatuor cinereis, interruptis. *Faun.* 1849. *Syst.*

Canicularis. 198. *M.* (la caniculaire) antennis setariis pilosa nigricans, abdominis segmento secundo tertioque lateribus diaphano.

Fab. M. 38.

Enum. n. 938.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 970.

Hab. in Europa, sub canicula, meridie & vespere, ventis pacatis choreas agens sub arborum coma.

Simillima M. domesticæ, sed dimidio minor. *Frons* argentea nigro ciliata.

Desc. Nigra, pilosa. *Frons* & *os* argentea. *Oculi* brunnei. *Abdomen* oblongum, basi supra nigrum, tum testaceum in medio longitudinaliter nigro-divisum; segmentum tertium cum reliquis nigrum.

Varietas. Omnia ut in musca *larvarum*, sed in thorace ex cinereo-cæruleo lineæ duæ nigræ. *Segmenta abdominis* prima tria lateribus testacea, dorso toto & subtus linea longitudinali, nigris. *Color* testaceus certa lucis incidentia eleganter variat.

Æstivatio- 199. *M.* (de l'été) antennis setariis pilosa nigra, alis punctis albis transversis. *

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo pulicis, nigra, at thorax maculis cinereis & segmenta abdominis margine canescentia. *Alæ* maculis f.

potius punctis transversis albis adspersæ.
Faun. 1843.

10-200. M. (des cimétieres) antennis setariis
 pilosa nigra, abdomine supra glabro.*
Fab. M. 39.

Faun. Fridr. n. 738.

Hab. in Europa. in Gallia Aust. V.

Desc. Similis M. *sepulchrali*, sed paullo
 minor. *Tibiæ anticæ* subtestaceæ. *Hal-*
teres albi. *Faun.* 1842. *Syst.*

Pluvialis. 201. M. (la pluviale) antennis setariis
 pilosa cinerea, thorace maculis quin-
 que nigris, abdomine maculis triden-
 tatis obsoletis.*

Scop. carn. 891.

Fab. M. 40.

De Geer tom. 6. p. 27. n. 6. antennis
 setariis pilosa cinerea, thorace maculis
 rotundatis abdomineque maculis novem
 nigris.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 529. n. 68.

Enum. n. 939.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 971.

Hab. in Europa.

Desc. Facies muscæ domesticæ omnino,
 sed dimidio minor. *Oculi* rufi. *Thorax*
 cinereus, maculis duabus parvis ad
 basin, tribus longioribus majoribus in
 medio & supra apicem thoracis macula
 nigra bipartita. *Abdomen* ovatum,
 canum, 4 segmentis, quorum primum
 immaculatum; secundum ad basin fascia
 retrorsum tridentata; tertium similis
 secundo; quartum etiam simile secundo
 ac tertio, sed denticulus maculæ in-
 termedius vix conspicuus. *Faun.* 1844.

Subsultans. 202. M. (la sautillante) antennis setariis

pilosa tota atra, alis hyalinis, femoribus posticis saltatoriis.

Fab. M. 41.

Enum. n. 940.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 971.

Hab. in Suecia, volitat saliendo cadendoque femoribus quasi dependentibus; quiescens territa salit ut pulex. In Gallia Aust. V.

Magnitudo pulicis absque ulla albedine.

Roralis. 203. *M.* (la matinale) antennis setariis pilosa aterrima. *

Scop. carn. 890.

Fab. M. 44. aterrima, alis apice subalbicantibus.

Enum. n. 941.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 523. *n.* 74.

Faun. Friar. n. 739.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. Tota atra, nitida, licet subpilosa. Halteres nigri. Oculi brunnei. Faun. 1846.

Obs. Alæ etiam nigræ sunt, sed aliquoties apice albicantes. V.

Parva tota atra. Antennæ brevissimæ, incumbentes, ut vix appareant. Abdomen cylindricum, pilosum. Alæ nigræ, apicibus minus obscuris. Halteres nigri.

Serrata. 204. *M.* (des latrines) antennis setariis pilosa fusca, alarum costa pilis brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis. *

Fab. M. 47.

De Geer tom. 6. p. 31. *t. I. f.* 15.-18. antennis setariis pilosa cinerea, abdomine elongato, conico, rufo, pedibus griso-flavis, alis abdomine longioribus.

Enum. n. 942.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 972.

Hab. in Europæ latrinis. In Gallia Aust.
frequens. V.

Desc. Minor. Thorax cinereus. Caput ,
abdomen & pedes subtestacea. Alarum
margo exterior ciliatus est. *Faun.* 1847.

Cellaris. 205. M. (des celliers) antennis setariis pilosa nigra , alis nervosis , oculis ferrugineis. *

Scop. carn. 905. musca œnopota.

E. N. C. 12. *obs.* 58.

Raj. inf. 261.

Reaum. inf. 5. t. 8. f. 7, 11, 12.

Geoff. paris. 2. p. 536. n. 85.

Fab. M. 48.

Hab. in cellis vinariis aliisque.

Desc. Musca parva nigra , pilis quibus-
dam vagis adspersa. *Abdominis seg-*
menta sex , nigricante basi , pallidiora.
Oculi ferruginei. Alæ albæ , tribus
longitudinalibus nervis , margine cras-
siore solidiore. *Faun.* 1848.

Meteorica. 206. M. (la météorique) antennis setariis pilosa nigra , abdomine subcinereo , alis basi subflavis , oculis brunneis. *

It. Wgoth. 37.

Fab. M. 49.

De Geer tom. 6. p. 85. n. 14. t. 15. f. 1?

Enum. n. 943.

Hab. in Europa nebulæ instar , ingruente
imprimis pluvia , ora equorum obvoli-
tantis. Amœn. acad. 3. p. 358. *Sub*
æstivatione citissime obvolitans. In Gallia
Aust. V.

Similis M. domesticæ , sed ½ minor.
Abdomen omnino ovatum , nec de-
pressum. Antennæ seta vix pubescente.

Alæ basi subflavæ. *Antennæ* ad lentem plumatæ. V.

Putris. 207. M. (du fromage) antennis setariis, subpilosa atra, alarum costa nigra, oculis ferrugineis. *

Scop. carn. 904.

α. Faun. suec. I. n. 1110.

β. Faun. suec. I. n. 1109.

Gæd. inf. I. t. 73.

List. Gæd. t. 132.

Merian. Eur. t. 43. f. 83.

Frisch. inf. I. t. 7.

Fab. M. 51.

Hab. in fimetis, *β.* in caseo, larva facili-
liente. In Gallia Aust. V.

Obs. Hæ tres species adeo affines, ut
difficulter distinguantur.

Desc. Musca parva est, magnitudine
culicis. Tota glabra, nitida. Oculi sub-
ferruginei. *Alæ* albidæ, margine cras-
siori nigra linea. Os nigrum. Pedes
toti atri. Halteres soli albi. *Faun.*
1850.

Frit. 208. M. (du frit) antennis setariis pilosa
nigra, halteribus plantis posticis abdo-
mineque virescenti-pallidis. *

Linn. auct. Stockh. 1750. p. 128.

Fab. M. 50.

Hab. in glumis hordei, decimum quodque
granum hordeaceum apud nos destruens,
dispendio annuo ultra 100,000 duca-
torum aureorum. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo pulicis. Corpus figura
M. domesticæ, agilissimum quasi salta-
torium, nigrum. Oculi fusci. Plantæ
posticæ pallidæ. Halteres pallidi. Ab-
domen fuscum, subtus magis pallide
virens. *Faun.* 1851.

Cupraria. 209. M. (la cuivreuse) antennis fetariis glauco-ænea, thorace viridi, abdomine cupreo oblongo, halteribus nudis. *

Scop. carn. 911.

Reaum. inf. 4. t. 22. f. 7, 8.

Geoff. paris. 2. p. 525. n. 61.

Fab. M. 52.

De Geer tom. 6. p. 200. t. 12. f. 4, 5.
nemotelus cuprarius, antennis clavatis, apice fetigeris, abdomine oblongo, depresso, violaceo - cupreo, thorace viridi-aurato, alis macula fusca.

Enum. n. 944.

Poda gr. p. 115.

Schæff. icon. t. 209. f. 32 ?

Faun. Fridr. n. 740.

Hab. in Europa.

Desc. Longitudo D. domesticæ, sed angustior. Corpus totum nitet serici instar, glabrum. Caput viridi-nitens. Thorax rubro - æneus. Abdomen cupri sive æris colore. Alæ albæ, macula fusca absque ferruginis colore. *Faun.* 1853.

Polita. 210. M. (la lisse) antennis fetariis glabra ænea, capite viridi, thorace abdomineque cæruleis, halteribus nudis. *

Fab. M. 53. antennis fetariis nitida, thorace cæruleo, abdomine æneo, halteribus nudis.

De Geer tom. 6. p. 202. nemotelus antennis clavatis apice fetigeris, capite nudo, abdomine ovato, brevi, viridi-aurato-nitido, femoribus nigris, tibiis testaceis alisque hyalinis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. M. cæsaris habitu, sed culice non major, tota æneo-nitidissima. Pedum extrema pallida s. albida. *Faun.* 1854.

Obs. Halteres & pedes flavi.

Viduata. 211. M. (la veuve) antennis fetariis glabra nuda æneo-nigra, abdomine æneo, dorso atro, squamis halterum ciliatis. *

Fab. M. 54.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo fere *M. domesticæ*. *Oculi* & *antennæ* ferrugineæ. *Thorax* glaber, nigro-æneus. *Abdomen* glabrum, auratum, supra atrum, opacum. *Faun.* 1852.

Pubera. 212. M. (la nubile) antennis fetariis pilosa nigra, abdominis ultimo segmento incurvato, pube utrinque reflexa. *

Fab. M. 55.

Hab. in Europa.

Desc. *M. polita* minor, angustior, tota atra, nitida, exceptis halteribus eorumque squama. *Abdomen* fere clavatum, ad anum utrinque seta subulata reflexa. *Faun.* 1855.

Caput pilosum, atrum, ore albicante. *Thorax* ater, subtesselatus. *Abdomen* elongatum, tenue, cylindricum, apice incrassatum, nigrum, ultimo segmento incurvato.

Petronel- 213. M. (la courtisane) antennis fetariis pilosa glabra livida, fronte rubra, cauda incurvata, pedibus elongatis testaceis. *

t. 10. f. 1.

It. Wgoth. 55.

Fab. M. 57. antennis fetariis livida, fronte rubra, pedibus elongatis testaceis, geniculis nigris.

Faun. Fridr. n. 741.

Enum. n. 946.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 974.

Hab. ad aquas; cursitans musca supra aquas quietas. *In Gallia Aust. V.*

Desc. Fere nigra. *Oculi* nigri. *Frons* supra antennis ferruginea, cæterum alba. *Alæ* sine puncto. *Abdomen* versus apicem subtus album, uti & partes sexuales quæ in hac specie prostant. *Pedes* pallidissime testacei, sed genua, exceptis anticis, nigra. *Enum.*

Ungulata. 214. *M.* (la crochue) antennis setariis pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, pedibus elongatis lividis. *

Faun. suec. 1053.

Fab. M. 62.

Faun. Fridr. n. 742.

De Geer tom. 6. p. 194. n. 15. t. II. f. 14.-22. - t. 12. f. 1.-3. nemotelus æneus antennis clavatis apice setigeris, corpore brevi conico, viridi-æneo, oculis aureis, pallide flavis.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 523. n. 56.

Enum. n. 947.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 974.

Hab. in Europa.

Desc. *M. domestica* paullo minor, magis oblonga, nigricans. *Thorax* niger, setis adspersus, latere aureus, basi ad *pedes* canus. *Abdomen* oblongum, alis tamen brevius, latere auro nitens. *Pedes* longi, nigri; *antici* palmati. *Alæ* incumbentes; in singulis nervi circiter 4 nigri & puncta duo atra versus marginem tenuiorem, quorum posticum minus est, sed magis atrum, alterum vero cum alterius *alæ* pari coiens latius. *Halteres* lividi. *Faun.* 1858.

Nobilitata. 215. *M.* (la noble) antennis setariis pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, alis macula nigra apice alba.

Fab. M. 63.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 523. n. 55.

*Hab. in Europa. In Gallia Aust. curlitans
supra aquas quietas. V.*

*Simillima M. unguata, sed distinctissima
alis macula magna nigra apiceque albo.*

Arrogans. 216. *M. (l'arrogante) antennis setariis
nigra, alis fuscis, fasciis tribus albis. **

Fab. M. 66.

Enum. n. 948.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 974.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

*Desc. Minuta. Corpus oblongum. Thorax
lævissimus, globoso-ovatus. Alæ fuscae,
fasciæ basi, apice medio albæ. Femora
pallida. Pedes albi. Curlitat superba
quasi, atollit caput & fere salit. Os
non exacte muscæ, sed obtusum,
ideoque nec facile asilus. Faun. 1857.*

Obs. Femora aliquoties nigra. V.

Corrigio- 217. *M. (l'étroite) antennis setariis nigra;
lata. pedibus elongatis luteis, femoribus
nigro annulo.*

Fab. M. 59.

Enum. n. 949.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 975.

*Hab. in Europa Australiore. In Gallia;
circa Nemausum. V.*

*Statura M. petronellæ, sed dimidio minor.
Pedes elongati tipulæ, sed femora lutea
cingulo nigro. Corpus angustum.*

*Obs. Corpus totum nigrum. Pedes elon-
gati lutei, femoribus annulo nigro.*

Cibaria. 218. *M. (la friande) antennis setariis læ-
vis, flemmatibus elevatis, abdomine
cinereo adunco, pedibus elongatis. **

*Hab. in culinis & in cibariis antiquis.
In Gallia Aust. V.*

Desc:

Desc. Facies omnino *M. petronellæ*, sed non culice major. *Caput* sincipite flavo, occipite cinereo, vertice purpurascente-fusco, notato punctis tribus elevatis. *Thorax* cinereus, aliquot fetis. *Abdomen* supra fuscum, segmento 6 flavescente, 7. s. ultimo longiore adunco cymbiformi; omnia subtrus excavata. *Pedes* longi, pallidi. *Halteres* albi. *Alæ* hyalinæ, nervosæ, absque maculis. *Faun.* 1859.

Cucularia. 219. *M.* (la compagne) antennis setariis pilosa, thorace plumbeo, oculis abdomineque ferrugineis, pedibus pallidis. *Fab. M.* 71. antennis setariis pilosa, thorace griseo, abdomine ferrugineo, alis punctis tribus.

Enum. n. 945.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 975.

Hab. in Suecia, adveniēns cum cuculo.

Statura M. scybalarix, sed dimidio minor; oblonga. Thorax cinereo-plumbeus; pilosus. Abdomen læve, oblongum, apice attenuatum, ferrugineum. Antennæ ferrugineæ, obscuriores. Alæ hyalinæ, anastomosi transversa versus marginem tenuiorem, in medio brevior, ad abdominis finem latior; ad basin alæ obscuriore macula fuscescens, cæterum alæ abdomine duplo longiores, ut in scybalaria.

Variat antennis plumatis & linea dorsali abdominis nigro punctata.

Scybalaria. 220. *M.* (des immondices) antennis setariis pilosa rufo-ferruginea hirta, alis puncto obscuriore. *

Scop. carn. 896.

Fab. M. 72.

Enum. n. 950.

Faun. Fridr. n. 743.

Hab. in stercore.

Desc. Similis. *M. stercorariæ*, sed duplo major & saturatius colorata. *Tota* rufo-ferruginea. *Oculi* nigri; *pili* aliquot nigri ad *os*. *Alæ* pallide ferrugineæ una anastomosi, corpore longiores. *Faun.* 1860.

Stercoraria. 221. *M.* (la merdivore) antennis setariis pilosa grisea hirta, alis puncto obscuro. *

Reaum. inf. 4. t. 27. f. 1.-3.

Geoff. paris. 2. p. 530. n. 69.

Fab. M. 73.

De Geer tom. 6. p. 88. n. 17. antennis plumatis pilosa hirsutissima griseo-flava, fronte rufa, alis puncto fusco.

Faun. Fridr. n. 744.

Hab. in stercore. In his regionibus frequens. V.

Desc. *Oculi* rufi. *Frons* flavescens. *Antennæ* nigræ. *Thorax* cinereus. *Abdomen* hirtum, flavescente-lividum. *Pedes* hirti. *Alæ* basi & margine crassiore flavescens cum puncto in medio obscuriore. *Mas* magis hirsutus est magisque luteus. *Fœmina* magis glabra magisque cinerea. *Faun.* 1861.

Fimetaria. 222. *M.* (du fumier) antennis subplumatis pilosa livens glabrata, alis puncto obscuriore. *

Scop. carn. 897. musca rufa.

Fab. M. 75.

Enum. n. 951.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 976.

Faun. Fridr. n. 745.

Hab. in Europæ fimetis. Prope Lugdunum non rara. V.

Desc. Corpus medium, oblongiusculum, ferrugineum, glabritie renitens. Pili rariores in thorace. Abdomen vix pubescens adparet. Oculi fusci. Punctum in ala ex unica anastomosi vix observandum. *Faun.* 1862.

Parietina. 223. M. (la marbrée) antennis fetariis, alis fuscis albo punctatis maculatisque, fronte testacea. *

Fab. M. 79.

Faun. Fridr. n. 746.

Enum. n. 952.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 501. n. 17.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 976.

Poda gr. p. 116.

Hab. in Europa.

Desc. Statura sequentis. Corpus cinereum. Frons testacea. Alæ deflexæ more phalænæ, fuscae, punctis numerosis albis confertissime adpersæ. Pedes testacei. *Faun.* 1863.

Umbra- 224. M. (la délicate) antennis fetariis, alis fuscis albo maculatis, fronte nivea. *

rum.

Fab. M. 80. antennis fetariis cinerea, abdomine nigro fasciato, alis fuscis albo maculatis.

Enum. n. 953?

Hab. in Europa. Prope Lugdunum in floribus. V.

Desc. Parva. Corpus cinereum. Frons nivea. Alæ fuscae, punctis numerosissimis albis confertim adpersæ. Pedes cinerei, nigro punctati. *Faun.* 1865.

Cinerea, nigrescens. Oculi pedesque atrii, uti & abdominis apex subtus. Reliquum abdomen subtus tomento fulvo

denso tectum. *Alæ* fuliginosæ, punctis innumeris albis sparsæ, quæ ad marginem interiorem minora evadunt, margine tamen exteriori & apice majuscula sunt. Fasciæ duæ obscuriores in utraque ala, obscuritate ex solo macularum defectu ortum ducente. *Oculorum* circumferentia, nec frons, argentea. *Rostrum* crassum. *Enum.*

Grossifica-225. M. (des pépinieres) antennis setariis, alis nigris apice albis. *

Geoff. paris. 2. p. 493. n. 1.

Fab. M. 83.

Enum. n. 954.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 976.

Hab. in Europa rarius.

Desc. Rarissima hæc musca parva est. Tota nigra, alis nigricantibus, summo apice alba macula. *Faun.* 1865.

Terrestris. 226. M. (la terrestre) antennis setariis pilosa fusca. thorace extra lineas puncto atro, abdomine subtus striato.

Hab. in Suecia. Pabulatur in ipsa terra.

Statura M. domesticæ, magis fusca.

Thorax, extra lineas utrinque, puncto nigro juxta caput. Abdomen subtus lateribus longitudinaliter striatum.

Saltuum. 227. M. (des bois) antennis setariis, alis albis costa punctoque terminali fuscis, corpore flavo, occipite nigricante. *

Hab. in Europa.

Desc. Parva. Corpus testaceum totum.

Oculi fusci. Punctum nigrum in vertice.

Alæ hyalinæ, margine crassiore nigro, ad apicem terminato in maculam nigram. *Faun.* 1866.

Vibrans. 228. M. (la vibrante) antennis fetariis pilosa, alis hyalinis apice nigro, capite rubro. *

Scop. carn. 939.

Geoff. paris. 2. p. 494. n. 4.

Fab. M. 81.

Faun. Fridr. n. 747.

Enum. n. 955.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 976.

De Geer tom. 6. p. 32. t. I. f. 19, 20. antennis fetariis pilosa, cæruleo-nigra nitida, capite rubro, alarum apice puncto fusco.

Hab. in Europa, ubique vibrans alas.

Desc. Tota nigra est, exceptis alis albis, summo apice macula rotunda nigra notatis. *Corpus* nigrum est, non admodum longum, sed obtusum. *Caput* rubrum est. Dum sedet continuo alas elevat, extendit ac vibrat. Magnitudine admodum variat, dantur enim quædam alis triplo aut quadruplo majoribus.

Faun. 1867.

Cynipsea. 229. M. (la cynipsoïde) antennis fetariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato. *

Scop. carn. 947.

Fab. M. 82. antennis fetariis, alis apice puncto laterali nigro, abdomine cylindrico.

Faun. Fridr. n. 748.

Enum. n. 956.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 977.

De Geer tom. 6. p. 33. antennis fetariis pilosa nigro-ænea nitidissima, capite nigro, alis versus apicem puncto nigro.

Hab. in Europa. In Bressia. V.

Desc. Vix pediculi magnitudine. Tota nigra. *Alæ* versus apicem ad marginem

majorem puncto nigro notatæ. *Femora antica* subtus denticulata. *Abdomen* oblongum, articulo primo pyriformi. *Pedes* longi. *Faun.* 1868.

Obs. Facile primo obtutu cum priore confunditur, sed omnino diversa & odorem flagrantem spargit.

Combinata. 230. M. (la combinée) antennis fetariis, pilosa cinerea, abdomine nigro, alis margine tenuiore puncto nigro.

Fab. M. 84.

Hab. in Suecia.

Magnitudo, dupla pediculi. *Thorax* cinereus. *Abdomen* nigrum. *Alæ* complicatæ fasciis duabus, priore obsoletiore, posteriore magis atra, quæ oritur a puncto majusculo nigro, ad marginem tenuiorem utriusque alæ, versus posteriora.

Obs. *Alæ* albæ, puncto in margine tenuiore & apice.

Flava. 231. M. (la jaune) antennis fetariis flava, nuda, oculis viridissimis. *

Geoff. parif. 2. p. 537. n. 86.

Fab. M. 92. antennis fetariis flava, antennis apice puncto nigro.

De Geer tom. 6. p. 34. n. 13. antennis fetariis pilosa tota flava, oculis viridibus aureis.

Faun. Fridr. n. 749.

Enum. n. 957.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 978.

Hab. in Europa. Vix pediculo major. In Gallia Aust. rarior. V.

Desc. Hæc parva est, magnitudine feminis oryzae. Tota flava. *Abdomen* ovatum. *Alæ* parum flavescentes. *Oculi* soli virides. *Faun.* 1869.

Obs. Viror oculorum morte mutatur in nigrum colorem. *Enum.*

Quadri- 232. M. (la quadriponctué) antennis fetariis flava nuda, abdomine punctis nigris quatuor.

Fab. M. 93.

Hab. in Suecia rarius.

Magnitudo M. flavæ. Abdomen ad latera postice punctis utrinque duobus nigris remotis.

Æstivans. 233. M. (l'inquiète) antennis fetariis, alis unguiculatis albis puncto centrali nigricante. *

Fab. M. 94.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo fere pulicis. Caput & thorax cærulea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei sive testacei. Alæ albæ, puncto obsolete nigro in singulæ alæ disco, fere in medio, vel paullo propius ad marginem interiorem; exterior margo denticulo sive ungue instruitur. Halteres albi. Alas non vibrat. Oculi fusco - pallidi. Antennæ testaceæ, seta nigra. *Faun.* 1870.

Serratulæ. 234. M. (de la farrete) antennis fetariis, alis albis, thorace virescente, abdomine cinereo lineis quatuor punctorum nigrorum. *

Fab. M. 96.

Hab. in Europæ carduis.

Desc. Culice duplo major. Oculi virides. Thorax viridis, supra colore fusco postice bilobo. Abdomen cinereum, lineis quatuor punctorum. Alæ albidæ. Fæminæ cauda mucrone conico. *Faun.* 1871.

Arnica. 235. M. (de l'arnique) antennis setariis, alis unguiculatis griseis nigro-maculatis. *

Scop. carn. n. 941.

Aldr. inf. 346. t. 1. f. 5.

Faun. Fridr. n. 750.

Enum. n. 959.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 979.

De Geer tom. 6. p. 51. antennis setariis pilosa flavo-testacea, oculis viridibus, alis albis fusco maculatis venisque flavis.

Hab. in discis florum radiatorum, imprimis arnicæ montanæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Musca domestica vulgari minor. Corpus subgriseum s. testaceum. Alæ griseæ, terminatæ macula marginali nigra & aliquot maculis majoribus nigris sparsis & plurimis minoribus obsoletis; denticules in alæ margine crassiore. Faun. 1872.

Hyoscyami. 236. M. (de la jusquiame) antennis setariis, alis unguiculis albis fusco-maculatis. *

Fab. M. 87. umbellatarum antennis setariis cinerea, ano pedibusque ferrugineis, alis maculatis.

Enum. n. 960.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 979.

De Geer tom. 6. p. 46. t. 2. f. 15.-18. antennis setariis pilosa viridi-grisea, oculis viridibus, antennis pedibusque flavo-testaceis, alis albis, fusco maculatis.

Hab. in hyoscyamis, cardui & ferratulæ arvensis capitulis.

Desc. Alæ albæ: singulæ maculis 2 nigris: anteriore tranversa parva, posteriore orbiculata majore, radiatis anostomo-

fibus. *Thorax & abdomen cana. Oculi virides. Pedes pallidi. Cauda aculeo rigido, subulato, obtuso in fœmina. In alarum margine crassiore inque ejus medio denticulus setæ instar prominens. Faun. 1873. Syst.*

Obs. Oculi a morte nigri, in viva virides. Alæ nudo oculo inspectæ videntur albæ, nigro - punctatæ maculisque duabus saturatioribus ad marginem exteriorem insignes; lynceo inspectæ fuscæ sunt, basi punctisque orbicularibus sparsi, albis. Enum.

Sonchi. 237. M. (du laitron) antennæ fetariis, alis hyalinis macula marginali nigra, oculis viridibus.

Hab. in sonchi arvensis receptaculis.

Major pediculo. Oculi virides. Thorax fuscus immaculatus. Scutellum pallidius. Abdomen ovatum, nigrum, incisurarum marginibus albidis. Anus mucrone obtuso. Venter virens. Alæ hyalinæ, nervis duabusque anastomosibus fuscis; margo exterior nigricans; ad medium marginis exterioris macula oblongiuscula nigra. Pedes testacei. Proboscis, dum exferitur, longiuscula, filiformis, pallida.

*Germinati- 238. M. (la printanière) antennæ fetariis, tionis. alis albis margine maculisque nigris. **

Scop. carn. 940.

Fab. M. 97.

Enum. n. 961.

Hab. in foliis arborum primo vere. In Gallia Aust. V.

Desc. Hæc musca domestica dimidio minor, facie ad M. vibrantem accedit, sed alarum margines extrorsum & apice

nigricantes : discus albus , punctis aliquot vagis nigricantibus. *Faun.* 1874.
Obs. Thorax cinereus. Abdomen stylatum nigrum.

Urticæ. 239. M. (de l'ortie) antennis setariis , alis albis puncto terminali fasciisque tribus fuscis distinctis. *

Fab. M. 98. corpus nigrum , fronte ferruginea.

Faun. Fridr. n. 751.

Enum. n. 969.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 979.

Hab. in urtica. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus nigrum , magnitudine vix *M. domestica*. Caput ferrugineum. Alæ albæ , fasciis tribus nigris fere transversis & apicibus fuscis. *Genua* subferruginea. *Faun.* 1875.

Obs. Corpus atrum , fronte rufa.

Cerasi. 240. M. (des bigarreaux) antennis setariis , alis albis , fasciis fuscis inæqualibus , posticis exterius connexis.

Blank. inf. t. 16. f. L.

Red. vivent. 264.

Reaum. inf. 2. t. 38. f. 22 , 23.

Fab. M. 99.

De Geer tom. 6. p. 50. n. 19. antennis setariis pilosa rufa , pedibus flavo-testaceis , oculis viridibus , scutello luteo , alis albis , fasciis inæqualibus flexuosis fuscis.

Hab. in cerasorum nucleis. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo *M. heraclei*. Descriptio *Rhedi* bona. Corpus nigrum. Alæ hyalinæ , maculis duabus nigris , anteriore extrorsum , posteriore introrsum bifida. *Faun.* 1878.

Corpus nigrum , fronte testacea.

Heraclei. 241. M. (de la berce) antennis fetariis ,
 alis albis , fasciis fuscis repandis , oculis
 viridibus. *

Hab. in foliis heraclei. Subcutanea.

Desc. Affinis M. *cardui*. *Frons* flava.
Oculi virides. *Thorax* lividus , linea
 utrinque laterali flava. *Scutellum* fla-
 vum. *Abdomen* ovatum , lividum , apice
 fusco. *Alæ* albæ , fasciis duabus fuscis
 longitudinalibus , flexuoso. - repandis.
Pedes pallidi. *Faun.* 1877.

Cardui. 242. M. (du chardon.) antennis fetariis ,
 alis albis , linea geminata fusca S. litteræ
 figura , oculis viridibus. *

Reaum. inf. 3. t. 45. f. 12.-14.

Blank. inf. t. 16. f. Q.

Gæd. inf. 1. t. 50.

List. Gæd. t. 129.

Fab. M. 100. antennis fetariis nigra , alis
 albis , fascia flexuosa fusca.

De Geer tom. 6. p. 49. n. 18. antennis
 fetariis pilosa nigra , capite antennisque
 rufis , alis albis , fascia flexuosa fusca.

Faun. Fridr. n. 752.

Geoff. paris. tom. 2. p. 496. n. 2.

Hab. in cardui crispæ , ferratulæ arvensis
gallis.

Desc. Magnitudo fere M. *domesticæ*. *Oculi*
 virides. *Corpus* fulvum. *Alæ* linea du-
 plici serpentino - flexuosa (quarum
 crassior exterior est) fusca , in formam
 litteræ S ducta , ac si *pedes* pellucere-
 nt. *Tota* subtus obsolete flava , ani apice
 albo. *Faun.* 1876.

Solstitialis. 243. M. (de la bardane) antennis fetariis ,
 alis albis unguiculatis , fasciis quatuor
 fuscis , scutello flavo. *

Geoff. paris. 2. p. 499. n. 14.

Fab. M. 103.

De Geer tom. 6. p. 42. t. 6.—14. antennis setariis pilosa viridi — flava, oculis aureis, alis fasciis quaternis transversalibus pallide fuscis.

Hab. in carduis aliisque.

Desc. Est e muscis parvis. *Thorax* cinereus, apice a tergo flavus. *Pedes* testacei. *Alæ* albæ, versus basin margine exteriori flavescentes. *Alas* has transversim pingit fascia quadruplex, quarum prima omnino recta sive transversa, 2, 3, 4 parum arcuatæ, harum ultima alas ipsas terminat. Alas gerit uti *M. domestica*. *Oculi* virides. *Abdomen* nigrum, fæminæ mucrone subulato acuto terminatur. Denticulus in margine crassiore alæ. *Faun.* 1879.

Parva. Caput brunneum. *Thorax* cinereus, linea laterali scutelloque flavis. *Abdomen* nigrum immaculatum. *Alæ* albæ, fasciis quatuor margine coherentibus, fuscis. *Pedes* flavi, *femoribus* nigris. *Fab.*

Florescen-244. *M.* (de la floraison) antennis setariis, alis pallidis venis nigricantibus, strigis duabus undatis apiceque fuscis. *

Hab. in Europa.

Desc. *Musca domestica* major est, oblonga, similis rapacibus. *Abdomen* flavum: ordo duplex punctorum atrorum a tergo abdominis: in singulo segmento punctorum atrorum par. *Alæ* pallidæ, venis nigricantibus, longitudinalibus; apices alarum cinerei; linea duplex undulatonigricans in medio alarum, transversa. *Faun.* 1880.

Frondef-245. M. (de la foliaifon) antennis fetar-
centiæ. riis, alis nigris, fasciis duabus puncti-
tisque duobus albis, corpore nigro.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Alæ nigræ, eleganter albo fasciatæ punctatæque. Abdomen fœminæ nigrum acutum. Pedes pallidi. V.

Nigricans. 246. M. (la noirâtre) alis antice albo nigroque variis.

Hab. in Europa.

Desc. Facies tipulæ. Corpus nigricans. Abdomen tenue. Pedes longi. Antennæ subulatæ. Alæ membranacei coloris, nervis 7 vel 8 nigricantibus: maculæ juxta marginem anteriorem, præsertim in medio, albo nigroque variegatæ. Oculi nigri. Nullus denticulus in margine alæ. Faun. 2310.

Pallida. 247. M. (la pâle) alis albis, fasciis quatuor fuscis, dorso abdominis punctis quinque parium.

It. Oel. 118.

Hab. in Europa.

Desc. Musca domestica longe minor. Oculi virides. Abdomen a tergo ordinibus punctorum atrorum quatuor; in singulo ordine puncta quinque. Alæ albæ, fasciis quatuor fuscis, versus marginem inferiorem angustioribus cauda acuminata. Faun. 2311.

Hirsuta. 248. M. (la velue) hirsuta, thorace fulvo, alis macula fusca.

Hab. in Europa.

Desc! Est inter magnas. Oculi fusci. Frons flava. Antennæ fulvæ. Thorax valde pilosus, fulvus. Abdomen nigrum, pilis flavis vestitum. Pedes nigri.

Abdomen subtus nigrum, marginibus incisurarum albidis; latera abdominis margine luteo prominent, extra inferioris superficiei latitudinem. *Faun.* 2312.

Cinerea. 249. M. (la cendrée) pilosa cinerea, alis ferrugineis.

Ad. Ups. 1736. p. 32. n. 34.

Hab. in Europæ nemoribus.

Desc. E maximis generis sui, facie quodammodo tabani. *Alæ* pallido-ferrugineæ cum macula in medio, præsertim versus marginem exteriorem, saturatius ferrugineæ s. fusco-ferrugineæ. *Corpus* villis cinereis & parum magis in abdomine griseis tectum. *Tibiæ* superne albidæ, inferne nigræ. *Faun.* 2313.

Suecica. 250. M. (la Suédoise) nigra, segmentis abdominalibus, excepto primo; flavis medio nigris.

Hab. in Ostro-Gothia.

Desc. Magnitudo M. domesticæ. Segmenta abdominalia numero 6 flava, linea transversa nigra, at primum totum nigrum. In thorace utrinque duæ maculæ flavæ. *Faun.* 2314.

Potentillæ. 251. M. (de la potentille) nigra, abdomine flavo, fasciis duabus nigris.

Hab. in potentillæ floribus aliisque rariis.

Desc. Musca domestica dimidio minor. *Oculi* fusci. *Thorax* ater nitidus. *Abdomen* ovatum, niveum, segmento primo in medio versus basin nigro, secundo toto albo, tertio & quarto margine postico nigris, ani albo apice nigro. *Tota* subtus atra, sed *tibiæ*

pallidæ & segmentum primum abdominis.
Subtus album. *Faun.* 2315.

Fusca. 252. M. (la brune) marginibus incisur-
 rarum abdominis cinereis, alis ferru-
 gineis.

Ad. Upf. 1736. p. 32. n. 38.

Geoff. parif. tom. 2. p. 510. n. 34.

Hab. in floribus, præsertim in hortis
 obvia.

Desc. Musca domestica longe major,
 fusco-cinerea, at segmenta abdominis
 incana, hinc annuli tres abdominis
 quasi incani. Tibiæ versus apices ni-
 græ, alias albæ. Alæ ferrugineæ,
 apicibus hyalinis. Vix hirsuta est.
Faun. 2316.

Grisea. 253. M. (la grise) abdominis tergo punctis
 quatuor nigris.

Hab. in Scania. D. Leche.

Desc. Magnitudo muscæ domesticæ, facies
 asili vel muscæ stercorariæ. Caput ni-
 gricans. Alæ membranaceæ, margine
 anteriore pallidiore. Thorax canus. Ab-
 domen tenue, lividum, versus anum
 fuscum. Puncta quatuor longitudinaliter
 disposita a tergo abdominis, nigra,
 in singulo segmento singula livida, tibiis
 pedibusque fuscis. *Faun.* 1317.

Bicolor. 254. M. (la bicolor) thorace viridi-
 nitente, abdomine cæruleo nitente.

Ad. Upf. 1736. p. 33. n. 55.

Syst. Nat. edit. X. n. 1100.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 524 n. 58.

Ent. parif. tom. 2. part. 2. p. 490. n. 62.
putris, sed hoc nomen triviale anceps,
 nam musca *putris* Linn. longe diversa. V.

Hab. in cadaveribus.

Desc. *M. unguolata* minor. *Pedes* longiores. *Alæ* magis obscuræ. *Caput* & *thorax* viridi-ænea. *Abdomen* cæruleum, nitidum, angustius. *Faun.* 2318.

Saltatrix. 255. *M.* (la fauteuse) antennis setariis nuda, abdomine supra-fusco, thorax tribus striis nigris.

Enum. n. 966 ?

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 508. n. 31 ?

Hab. in campis inter gramina, saliens more cicadæ. *F. logie.* In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo pediculi. *Caput* flavum. *Oculi* nigri. *Vertex* macula triangulari nigra rectus. *Thorax* a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris, quarum intermedia cum apice cohæret, laterales vero a capite distinctæ. *Scutellum* flavum. *Abdomen* supra fuscum lineis duabus flavicantibus. *Femora* posice crassa. *Faun.* 2319.

Ex Entom. Carn. D. Scop.

Decepto- 256. *M.* (la trompeuse) abdomine ferrugineo, pellucido, setoso, linea dorsali nigra.

Enum. n. 932.

Pod. gr. p. 216.

Hab. in Europæ pratis. In Bressia. V.

Desc. Et ista dubia est, ob rostrum ut in *musca rotundata*. *Antennæ* rufescentes, apice obtuso nigro. *Frons* alba retro oculos *Caput* lana canescente pubescens. *Thorax* fuscus, lineis pallidioribus. *Scutellum* ferrugineum. *Abdominis* segmenta, præsertim postica, setulis nigris crebrioribus ciliata. *Alæ* basis & costa fere tota ferruginea. *Halterum* squama alba. *Femora* nigra. *Tibiæ*

Tibiae rufescentes, nigris pilis adspersæ.
 Conf. *M. feram*. Linn. *Faun. suec.* 2.
 n. 1836.

Obs. Affinis *M. feræ* Linn. sed rostro,
 abdomine elongato alisque diversa. Ad
 muscas antennis plumatis pertinet. V.

Falcata. 257. *M.* (la courbée) alis hyalinis, costa
 fasciisque binis arcuatis, ferrugineis.

Hab. in Europa.

Desc. Statura *M. domesticæ*. *Oculi* virides.
Frons fulva. *Thorax* pallide ferrugi-
 neus, punctorum nigrorum ordinibus
 longitudinalibus 4, punctis tribus in
 singulo ordine lucidis. *Scutellum* punctis
 pilisque nigris 4. *Abdomen* basi biden-
 tatum, segmento quolibet punctis 4
 nigris. Linea ferruginea juxta alæ
 costam decurrens, abrupta est inter
 fascias, quarum margo fuscus; ad
 basin alæ rudera tertiæ fasciæ con-
 spiciuntur pariter ferruginea. *Pedes*
 ferruginei.

Temula. 258. *M.* (du cerfeuil penché) nigerrima
 tota & nitens, alis basi halterumque
 squamula luteo-ferrugineis.

Hab. in floribus chærophilli temuli.

Desc. Pili in fronte pro varia lucis inci-
 dentia argenteo nitore fulgent. *Halteres*
 pallide rufi. *Abdomen* setosum.

Cæruleoph. 259. *M.* (les yeux bleus) oculis cæruleis,
 fronte pedibusque flavis.

Hab. in Europa.

Desc. Parva. *Thorax* villosulus glauces-
 cens. *Abdomen* basi bidentatum, fus-
 cescens, apice flavo. *Alæ* hyalinæ,
 puncto fusco.

Obs. Sub nomine *M. laryarum*, *M. Larvæ*

Insect. Tomus III.

Kk

pavoniæ, Io, ph. *quercus*, *lanestris*.
An muscæ? V.

Alni. 260. M. (de l'aulne) nigricans , oculis
ferrugineis , halterum squama lactea.

Hab. in Europa.

Desc. M. *carnariæ* statura *Palporum* clavæ
ferrugineæ. *Scutelli* albidi apex ferru-
gineus. *Abdomen* segmentis argenteis,
margine nigris, setosis. *Pedes* nigri.

Arnicæ- 261. M. (de l'arnique scorpioïde) tota
scorpioides. nigra & pilosa , alis hyalinis , nervis
fulcis , pilosis.

Hab. in Europa.

Desc. M. *domestica* paullo minor , niger-
rima & fere tomentosa. *Alæ* immaculatæ.

Vernicina. 262. M. (la vernissée) nigerrima , politura
nitens , tibiis rufis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* porrectæ , obtusæ seta
propria breviores. *Corpus* villosulum.
Abdomen acuminatum.

Præceps. 263. M. (l'agile) thorace cinereo , lineis 2
dorsalibus nigris , abdomine subcylindrico
fulvo , linea dorsali nigra , femoribus
fulvis.

Hab. in Europa. Circa fenestras non rara.

Desc. Continuo & celeriter curstat ,
longis pedibus insistens expansis alis ,
brevis tempore quiescens & tunc anticos
pedes sæpe fricans & adterens ; præ-
terea huic frons , certa lucis incidentia
subargenteo colore fulgens. *Antennæ*
basî pilosæ & fulvæ , articulo ultimo de-
flexo , obtuso , nigro. *Palpi* fulvi. *Thorax*
cinereo-albicans lineis nigris , vel e
contra. *Alæ* hyalinæ , immaculatæ , basî

ferrugineæ. *Halterum* squama albida margine ferrugineo. *Abdomen* porrectum, nitens, fulvum, subpellucens, segmentis quatuor laxè pilosis, prope marginem setis verticillatis, dorso macula nigra in lineam longitudinalem cum fociis confluenta. *Femora* fulva. *Pedes* alibi nigri.

Obs. Variat abdomine nigro, lateribus fulvis.

Plumipes. 264. M. (la hideuse) ænea, oculis viridibus, femoribus ferrugineis, palmis mediis plumosis.

Hab. in Europa. In Bressiæ paludosis. V.
Desc. *Antennæ* porrectæ, ferrugineæ, apice nigræ, setula nigra. *Frons* seu linea inter oculos, aurea. *Oculi* viridis æris colore elegantissimo tincti. *Thorax* & *abdomen* coloris ænei aliquo virore immixti. *Halteres* ferruginei, subnudi. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Abdominis* segmenta margine fusca. Genitale terminatum lamellis binis, albidis, ciliatis, ciliis nigris. *Manus* nigræ, sed mediæ ad initium vere plumosæ. *Tibiæ posticæ* imprimis spinosæ.

Muraria. 265. M. (des murs) nigra, fronte pilosa, setulis antennarum capite longioribus.

Fab. M. 60. cursitans antennis setariis atra, pedibus elongatis pallidis, alis incumbens albis ?

Hab. in Europa, cursitans super muros, tures, &c.

Desc. Duas lineas longa. *Caput* parvum, fronte & occipite erectis pilis barbato. *Antennæ* obtusæ, distinctæ, breves. *Thorax* gibbus, non pilosus. *Halteres* pallide rufi, clava ovali. *Alæ* hyalinæ,

immaculatæ. *Crura* nigra. *Tibiæ* rufescentes. *Mas* agilior, gracilior, in apice abdominis duo corpora uncinata inflexa gerens.

Curforiâ. 266. M. (la coureuse) femoribus anticis crassioribus.

Hab. in Europa.

Desc. Parva, culice minor. Vix volare potest, sed celerrime cursitat. *Caput* parvum, rotundum. *Palpi* albidi, pilo terminati. *Rostri* vagina apice ferruginea. *Alæ* immaculatæ, nervis fuscis. *Thorax* niger. *Abdomen* basi testaceum, apice fuscum. *Pedes* antichi testacei, crassiores; posticorum femora apice nigra.

Iridata. 267. M. (l'iris) oculi fascia iridiformi f. cærulea rubraque, thorace virenti, nitidissimo, abdomine lucido, lanceolato, æneo-violaceo.

Hab. in Europæ pratis.

Desc. *Antennæ* nigrae, clavatae, villosae. *Oculi* nitentes, viridi-castanei. *Rostrum* labiis albidis. Tubercula tria parva ad nucham. *Thorax* subovatus, villosulus. *Abdomen* lineas tres longum, modice convexum, subtus nigricans. *Pedes* nigricantes. *Alæ* hyalinæ, linea fusca marginali.

Violacea. 268. M. (la violette) oculis viridibus, fascia violacea.

Hab. in Europa.

Desc. Habitus prioris, sed duplo fere minor. *Rostrum* halteribus concolor. *Caput* inter oculos viridi-nitens. *Thorax* viridis. *Halteres* albi. *Alæ* nigredine in medio inquinatæ eaque fere fasciatæ.

Abdomen violaceum totum. *Dimidia oculi* portio, supra fasciam, semicirculo violaceo cancellata. *Puncta tria* alba in fronte.

Bipuncta- 269. *M.* (la biponctué) lucida, thorace viridi, abdomine violaceo, punctis duobus albis in fronte.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* nigræ, vix villosæ. *Rostrum* ferrugineum. *Oculi* fusci. *Thorax* virens, lucidus, oblongus. *Alæ* basi ferrugineæ. *Halteres* pallide flavescents, nudi. *Abdomen* lanceolatum, basi ferrugineum. *Pedes* ferruginei.

Albifeta. 270. *M.* (la vieille) rufescens, ore argenteo, antennis seta alba, oculis ferrugineis, fasciis duabus fulvis.

Hab. in Europa.

Desc. Similis *M. unguicorni*. *Antennæ* basi ferrugineæ. Duo paria punctorum nigrorum inter antennas & nucham. *Caput* supra rufum, subtus tumidum, albo-argenteum. *Thorax* rufescens, lineis obscurioribus. *Alæ*, basi & costa ferrugineæ, postice anastomosi flexuosa, litteræ S simili, notatæ, quale signum etiam habet *M. cardui*; præter hanc lineam decurrunt longitudinaliter juxta venam mediam puncta tria vel quatuor fusca. *Rostrum* & *femora* sanguinea. *Halteres* albidii, nudi.

Spinipes. 271. *M.* (la spinipede) rufa, femoribus posticis crassioribus longioribus subtusque spinosis, punctis duobus nigris supra totidemque sub antennis.

Hab. in Europa.

Desc. *Oculi* fasciis duabus rufis. *Alæ*

puncto medio fusco. *Pedes postici* differentiam constituunt.

Buccata. 272. M. (la jouffue) nigricans, facie tumida albida, alis nigris, antennis rufis.

Hab. in Europa.

Desc. Caput supra planum rufum. *Oculi* remoti. *Antennæ* obtusæ clavatæ. *Thorax* fusco-rufescens. Ad basin *alæ* lineola alba lunata. *Abdomen* teres, cylindricum, villosum.

Virens. 273. M. (la verdâtre) aurato-virens, thorace lineis nigris, pedibus longis.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* nigræ, sub apice setam seipsis longiorem proferentes. Tuberculum nigrum in occipite, e quo pili duo. Dorsum *thoracis* lineis longitudinalibus fuscis quatuor, quibus pilorum ordo interjacet. *Alæ* hyalinæ, puncto medio subferrugineo. *Halteres* flavi. *Abdomen* teres, pone attenuatum, marginibus segmentorum nigris. *Pedes* longi, obscurius virides.

Ornithovora. 274. M. (l'ornithovore) nigra, fronte pilosa, rostro pedibusque ferrugineis, antennis seta propria triplo brevioribus.

Hab. in cadaveribus avium & piscium M. *cibariæ* proxima.

Desc. *Abdomen* basi bidentatum, glabrum. *Thorax* absque pilis. *Alæ* immaculatæ, hyalinæ. Cursus celer. *Puppa* ferruginea, antice duobus corniculis setaceis, postice margine denticulato, linea longitudinali fuscescente.

Strumosa. 275. M. (la scrophuleuse) corpore gracili, longo, capite ovato basi subtus obeso,

pedibus longis, femoribus rufis, fascia fusca.

Hab. in Europa. Super folia arborum frequens.

Desc. *Corpus* nigricans. *Rostrum* albidum. *Caput* brevi collo, tanquam petiolo, impositum, foveola in fronte. *Thorax* antice attenuatus. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Abdomen* imberbe. *Halteres* albi, nudi. *Mas* abdomine tenuiore, postice dilatato, pene recto setaceo. *Fæmina* longior, abdomine acuminato.

Lacustris. 276. *M.* (des étangs) thorace æneo, abdomine viridi-æneo.

De Geer tom. 6 p. 194. n. 15. t. II. f. 14.-22.-t. 12. f. 1.-3. antennis clavatis apice setigeris, corpore brevi conico depresso, viridi-æneo, oculis aureis, pedibus pallide flavis.

Hab. in Europæ lacubus, ambulans super aquas stagnantes tanquam cimex lacustris.

Desc. *Frons* subargentea. *Oculi* virides. *Pili* duo divaricati in occipite. *Antennæ* nigrae, clavatae, obtusæ. *Rostrum* palpis subvillosis, parvis. *Thorax* æneus, glaber. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ, costa antice ferruginea. *Scutellum* edentatum rotundatum, pilosum. *Abdomen* lineam longum, viridi-æneum, albido villo adpersum, subtus subfuscum, segmentis lateraliter punctatis. *Pedes* longi, lamellis unguium pallidis.

Hortula- 277. *M.* (des jardins) nigra nitens, halterum squama albida.

Hab. in Europæ hortis & cultis.

Desc. *Corpus* quinque lineas longum, unam cum dimidia crassum, villosulum,

atrum, nitens. *Abdomen* oblongum.
Alæ immaculatæ.

Maritima. 278. M. (la maritime) thorace æneo, abdomine rufo, basi apiceque nigro, femoribus posticis denticulatis.

Hab. circa Mare Adriaticum.

Desc. *Thorax* æneus. *Halteres* albidii. *Abdomen* basi subtus albidum, lateribus parallelis, segmentis 2, 3, rufo-fulvis, cæteris nigris. *Tibiæ* flavescentes. *Femora postica* crassiora, subtusque spinulis pluribus hirta.

Meticulo-279. M. (la méticuleuse) nigra nitens, tibiis rufis, fascia nigra, posticis curvis.

Enum n. 972.

Hab. in Europa.

Desc. *Alæ* immaculatæ. *Halterum* squema alba.

Obs. Suspensa in aere ante florem, priusquam ei infideat, facillime inde fugiens.

Merulina. 280. M. (la noire) tota nigra nitens, oculis rubellis, alis fuscescentibus.

Enum. n. 971.

Hab. in Europa.

Desc. Oblonga, duas lineas longitudine, dimidiam crassitie æquans, pilosa. *Abdomen* teres, subcylindricum, segmentorum marginibus setoso-ciliatis. *Pedes* nigri.

Cannabi- 281. M. (du chanvre) thorace æneo, abdomine pellucido flavo, fasciis nigris alterne angustioribus.

Hab. in cannabi, sub cujus foliis sunt puppæ glabræ, fusco-rubræ, antice crassiores, postice pallidiores, corniculo supra caudam parvo bifido suberecto.

Desc. *Oculi* castanei, margine albo. *Antennæ* rufescentes. *Thorax* lucidus, glaber. *Alæ* hyalinæ. *Scutellum* luteum. *Halteres* pallidi. *Abdomen* lanceolatum, compressum, tres lineas longum, fasciis nigris, binis ultimis solitariis, cæteris binatis. Linea nigra a basi ad apicem abdominis per medium superne decurrens. *Pedes* flavescentes.

Palustris. 282. M. (des marais) thorace æneo, abdomine flavo-rufo, fasciis tribus nigris.

Hab. in Europa.

Larva lin. 5 longa, depressa, ferruginea, corniculo caudali bifido, lineis transversis nigris variegata, degens sub lignis dejectis.

Desc. Lin. 4 longa. *Oculi* brunnei. *Antennæ* rufæ, seta nigra, apice fuscæ. *Frons* nitida, flavescent, supra antennas villosa. *Thorax* nitens, villosus. *Scutellum* flavicans. *Halteres* albid. *Abdomen* subtus rufum. *Alæ* immaculatæ. *Pedes* scutello concolores.

Libatrix. 283. M. (la prudente) thorace æneo-fusco, scutello flavo, abdomine nigro, fasciis quatuor, tribus anticis abruptis.

Hab. in Europa.

Obs. Flores adit, antequam sedeat.

Desc. M. *menthastris* affinis, sed diversa. *Thorax* immaculatus, æneo-fuscus. *Scutellum* villosius. *Abdomen* tribus paribus macularum cinguloque postico flavis. *Pedes* nigri, circa genua tantum flavescentes.

Vacua. 284. M. (l'affamée) abdomine flavo, fasciis quatuor nigris, segmento primo

pellucido albido, linea nigra longitudinali fasciæ primæ inserta.

Hab. in Europa.

Desc. Thorax dorso fuscus, alibi pallidior. *Antennæ*, *pedes*, *abdomen* subrus flavi coloris. *Alæ* immaculatæ, linea fusca marginali.

Lucida. 285. M. (la luisante) thorace æneo-fusco villoso, abdomine compresso, lucido æneo-fusco, alis fuscescentibus.

Hab. in Europa.

Desc. Differt a M. *meticulosa*. *Alæ* fuscescentes. *Pedes omnes nigri*. *Antennæ* rufescentes.

Chryfor- 286. M. (l'alchimiste) cinerea fetosa, alis rhæa, basi halteribusque luteo-ferrugineis.

Hab. in Europa.

Desc. Statura M. *domestica*. *Antennæ* nigræ. *Frons* & linea circum oculos albo-argentea. *Oculi* brunnei. *Alæ* absque puncto & lineis, costa nigra basi luteo-ferruginea. *Halterum* squama alba, margine ferrugineo, ciliato. *Abdomen* oblongum, acutum, stercus luteo-ferrugineum a morte fundens. *Pedes nigri* fetoso-pilosi.

Ænea. 287. M. (la bronzée) æneo fusca nitens, tibiis rufis, fascia fusca.

De Geer tom. 6. p. 201. n. 17. nemo-telus antennis clavatis apice setigeris, capite hirsutissimo, abdomine oblongo, depresso, viridi-aureo, pedibus nigris, geniculis flavis, alis flavo-fuscis?

Hab. in Europæ floribus.

Desc. Tota brevi, sericeo, aureo villo adspersa. *Halteres* capitulo ferrugineo. *Palpi* sub apice fascia nigra annulati,

tenuēs. *Abdomen* ovatum, obtusum.
Genua rufa. *Pedes* albi nigri.

Aphidioi-288. M. (l'aphidioïde) nigra tota, alis cupreo-hyalinis, abdomine tereti, acuminato.

Hab. in Europa.

Desc. Parvitas animalculi non permittit ut rostrum examinarem. Statura *aphidis*. Tota nigra. *Oculi* fusco-rufi, fascia transversa. *Halteres* albidī. *Tibiæ posticæ* pilosæ.

Luteola. 289. M. (la jaunâtre) flavescens, oculis viridibus, punctis tribus occipitalibus nigris.

Hab. in Europa.

Desc. *Antennæ* setula nigra. *Alæ* immaculatæ, albidæ. *Abdomen* ovatum.

Oppidana. 290. M. (l'espion) flava, oculis violaceis.

Hab. in Europa. Vagatur circa pagos, oppida & tuguria rusticorum.

Desc. *Antennarum* clava & tuberculus occipitalis nigra.

Umbelli- 291. M. (des ombellifères) flavo nigroque ferarum. varia, oculi fusco-virescentibus.

Hab. in Europæ floribus plantarum umbellatarum. In Gallia Aust. V.

Desc. Parvula, linea vix longior. *Antennæ* apice fuscæ. *Nucha* tuberculo nigro. *Thorax* maculis tribus dorsalibus fuscis. *Scutellum* totum flavum. Sub *alis* utrinque macula ovata, nigra. *Halteres* capitulo albo. *Abdomen* obcordatum, flavum, segmentis mediis superne fuscis. *Pedes* flavi.

Fellinans. 292. M. (la vive) nigra, pilosa, fronte ferruginea.

Hab. in Europa.

Obs. Celeriter cursitat, sæpius quiescens, hinc festinando defatigata.

Desc. Statura *M. fungorum*. *Antennæ*, clava rotundata, setula longa. *Alæ* immaculatæ hyalinæ, costa pilosa. *Halteres* erecti, pallide ferruginei. *Pedes* ad genua rufescentes.

Ex op. D. de Geer.

Capitata. 293. *M.* (la grosse tête) antennis setariis pilosa, capite magno pallide flavo nitido, thorace griseo, abdomine rufo, fascia dorsali nigra. *t.* 10. *f.* 2.

Hab. in Europa. In Africa. V.

Desc. *Caput* magnum. *Frons* albo vel luteo-sericeo nitens. *Thorax* griseus, lineatus. *Abdomen* pellucidum, cruce nigra inversa. *Alæ* magnæ maculatæ, basi ferrugineæ. *V.*

Larvarum 294. *M.* (la petite mouche des chenilles) antennis setariis pilosa nigra, thorace lineis longitudinalibus atris, abdomine maculis cinereis. Minor.

Merian. inf. Eur. t. 26. 33. 44.

Hab. in larvis.

Desc. Similis *M. larvarum Syst.* sed multo minor. An species? *V.*

Domestica 295. *M.* (la petite mouche domestique) antennis setariis pilosa nigra, abdomine maris fasciis transversis atris, halteribus flavo-rufis.

Leeuwenh. Lettre du 12 Novembre 1680. p. 50. *f.* 6.

Blank. inf. t. 10. *f.* 1.

Swamm. bibl. nat. t. 38. *n.* VI. *f.* 8.

Hab. in Europa.

Desc. Musca domestica Syst. diversa. Antennæ setariæ minime plumatæ. Maris abdomen strigis transversis. Oculi majores remotioresque. Fæminæ abdomen nitidum nigrum, immaculatum. Supellectilibus auratis funesta.

Rufo- 296. M. (la rouffie) antennis setariis pilosa nigra, abdominis lateribus macula magna ferruginea, alis fuscis postice hyalinis.

Fab. M. 37. *lateralis* antennis setariis nigra, abdominis lateribus basi sanguineis.

Hab. in Germania, Kiliæ. In Gallia Aust. V.

Desc. Lateribus abdominis sanguineis rufisve facile distinguitur. Incisuræ abdominis lateraliter pilis hirtis rigidisque. Pedes nigri.

Cylindri- 297. M. (la cylindrique) antennis setariis pilosa, cinereo-nigra, abdomine elongato cylindrico, medio rufo.

Fab. M. 36. *brassicaria* antennis setariis nigra, abdomine cylindrico, segmento secundo tertioque rufis.

Hab. in brassicæ radicibus. In Bressia. V.

Desc. Frons argentea. Linea nigra inter oculos. Thorax niger. Abdomen elongatum, cylindraceum, rufum, segmento primo macula magna nigra triangulari basi versus thoracem; secundo, puncto nigro primo fere contiguo.

Obs. Variat macula nigra. V.

Gibbosa. 298. M. (la bossue) antennis setariis pilosa nigro-cinerea, oculis rubris, thorace lineis quatuor abdomineque punctis nigris.

Hab. in Europa. Inter aphides. In Gallia
Aust. V.

Desc. Parva vix pulicem superans. Thorax
4 lineatus, lineis lateralibus. Abdomen
nigro punctatum, punctis inæqualibus.
Halteres nivei. Alæ diaphanæ, nigro
tinctæ. V.

Genicula- 299. *M. (la coudée)* antennis setariis pi-
lofa grisea, occipite abdomine pedi-
busque rufo-flavis, rostro retro geni-
culato.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudine M. domesticæ minoris.
Rostrum singulare tribus partibus com-
positum, quarum ultima angulum cum
secunda format. Caput sub antennis
album. Oculi fusco-castanei, albo cincti.
Thorax griseus. Abdomen rufo-luteum.
Femora & tibiæ ut abdomen. V.

Ex spec. D. Fab.

Tigrina. 300. *M. (la dénaturée)* antennis setariis
pilosa cinerea, femoribus apice tibiif-
que ferrugineis. *M. 42.*

Hab. in Anglia, victitans rapina con-
generum.

Desc. Magnitudo M. domesticæ. Pilosa,
tota cinerea. Thorax nigro punctatus.
Alæ albæ. Anus stylatus.

Chorea. 301. *M. (la danseuse)* antennis setariis,
alis totis albis. *M. 43.*

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In
Bressia. V.

Desc. Affinis M. rorali. Corpus totum
atrum, alis folis omnino albis.

Obs. Pulicem vix superat, sed major
adparet alis abdomine longioribus.

Medita- 302. M. (la quadripunctuée) antennis seta-
bunda. riis pilosa obscura, abdomine cinereo,

punctis quatuor fuscis. M. 46.

*Hab. in Italia. Dr. Allioni. Hafniæ.
D. Lund.*

*Desc. Media. Os albicat. Thorax pilosus ,
obscurus , immaculatus. Abdomen ova-
tum , cinereum , punctis quatuor dor-
salibus fuscis. Pedes nigri , tibiis ru-
fescensibus.*

Cristata. 303. M. (la huppée) antennis setariis
atra , tibiis pallidis , vertice prominulo.
M. 58.

Hab. in Anglia.

*Desc. Statura & magnitudo M. petronellæ.
Antennæ breves , truncatæ , apice
setigeræ. Vertex puncto magno , ele-
vato , nigro. Thorax ater , immacu-
latus. Alæ hyalinæ , macula marginali
nigra. Pedes nigri , tibiis pallidis.*

Cimicoi- 304. M. (la cimicoïde) antennis setariis
des. atra , alis incumbentibus albis , fasciis
duabus nigris. M. 61.

It Norwag.

Hab. in Norwagiæ arboribus detruncatis.

Notata. 305. M. (la siamoïse) antennis setariis pi-
losa , thorace fusco lineato , abdomine
æneo , alis fusco nebulosis , puncto
atro. M. 65.

Hab. in Angliæ floribus. Mus. D. Yeats.

*Desc. Caput nigrum. Thorax fuscus ,
lineis quatuor virescentibus. Abdomen
breve , obtusum , ovatum , æneum.
Pedes elongati nigri. Alæ fusco nebu-
losæ , fere lineatæ , basi ad costam
parum testaceæ & versus apicem puncto
distincto atro.*

Rostrata. 306. M. (le museau) antennis setariis ænea;
abdomine nigro fasciato , ore corneo
prominulo atro. M. 68.

Hab. Hafniæ.

Desc. Statura & summa affinitas M. *ungulata*. *Caput* triangulare , viridi-
æneum , ore porrecto , corneo , atro.
Thorax sublineatus. *Abdomen* in altero
sexu ungulatum. *Pedes* elongati ,
testacei.

4-Fascia- 307. M. (la quadrifasciée) antennis setariis
ta. pallida , abdomine fasciis quatuor atris ,
alis albis. M. 69.,

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.*

Desc. *Corpus* statura omnino M. *rostrata* ,
at paullo minus , pallidum , fasciis
quatuor abdominis atris. *Alæ* albæ ,
immaculatæ. *Pedes* elongati , pallidi.

Diaphana. 308. M. (la diaphane) antennis setariis ,
thorace æneo , abdomine cinereo ,
primo secundoque segmento lateribus
diaphanis. M. 70.

Hab. in Lipsiæ nemoribus.

Desc. Statura M. *ungulata*. *Caput* nigrum.
Thorax æneus nitens. *Abdomen* conic-
um , cinereum , lateribus baseos tes-
taceo-diaphanis. *Alæ* hyalinæ. *Pedes*
nigri , tibiis testaceis.

Marginata. 309. M. (la bordée) antennis setariis
obscuræ plumbeæ , alis reticulatis. M. 74.

Hab. in Saxonia.

Desc. Statura & magnitudo M. *fimetariæ*.
Os vesiculosum album. *Antennæ* fuscæ ,
seta elongata alba. *Thorax* & *abdomen*
plumbea. *Pedes* nigri. *Alæ* punctis
albis reticulatæ margineque crassiori
atro.

Rufifrons.

Rufifrons. 310. M. (la timide) antennis setariis cinerea, capite ferrugineo, punctis duobus nigris, alarum costa nigra. M. 76.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. Statura omnino M. marginatæ. Caput rufum, ore vesiculoso albo punctisque duobus verticis nigris. Antennæ rufæ, margine omni nigro setaque porrecta alba. Thorax & abdomen obfcure cinerea, sublineata. Alæ albidæ, punctis nigris vix reticulatæ, costa nigra. Pedes ferruginei.

Reticulata. 311. M. (la réticulée) antennis setariis pilosa cinerea, alis obsolete reticulatis, costa albo nigroque punctata. M. 77.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 498. n. II. an?

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia, circa Lugdunum. V.

Desc. Magnitudo M. fimetariæ. Caput cum antennis rufum, ore niveo. Thorax, abdomen, pedes, cinerea, immaculata. Alæ punctis nigris reticulatæ. Costa punctis albis nigrisque variegata.

Stylata. 312. M. (le filet) antennis setariis cinerea, abdomine atro, alis albis, punctis duobus arcuque fuscis. M. 85.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. Antennæ ferrugineæ. Frons flava; vertice cinereo. Thorax pilosus, cinereus, linea laterali, scutello halteribusque flavis. Abdomen oblongum, atrum, immaculatum, stylo ani abdomine longiore. Alæ albæ, punctis duobus approximatis, exteriori in medio marginis crassioris majori. Pedes ferruginei.

Arcuata. 313. *M.* (la tranchée) antennis setariis testacea , alis maculis duabus arcuque apicis nigris. *M.* 85.

Hab. Kilia.

Desc. Affinis *M. stylata*. *Caput* testaceum , fronte ferruginea. *Thorax* pilosus , pallide testaceus. *Abdomen* magis obscurum , stylo ani brevi , crasso , obrufo. *Alæ* magnæ obscuro maculatæ maculisque duabus magnis in medio nigris. Apex niger , puncto parvo albo.

Graminum. 314. *M.* (des graminées) antennis setariis cinerea , alis fuscis , maculis albis obsoletis. *M.* 88.

Hab. in pratis graminosis Lipsiæ.

Desc. Magnitudo *M. domesticæ*. *Corpus* cinereum , fronte rubra pedibusque nigris.

Dorsalis. 315. *M.* (la dorsale) antennis setariis , alis punctatis , thorace cinereo , abdomine rufo , linea dorsali nigra. *M.* 89.

Hab. in Bohemiæ pratis.

Desc. *Os* album. *Antennæ* rufæ. *Thorax* cinereus , linea laterali alba. *Alæ* albæ , punctis aliquot vagis nigris. *Abdomen* rufum , linea dorsali punctata nigra. *Pedes* rufi , plantis rufis.

Seminatio. 316. *M.* (la pointillée) antennis setariis ;
nis.

alis atris cinereo punctatis , abdomine basi subtus flavo. *M.* 96. t. 10. f. 3.

Hab. in pratis Lipsiensibus. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo *M. domesticæ*. Color totius corporis griseus vel fuscus , punctis minutissimis cinereis irroratus. *Pedes* atrii.

- Lineata.** 317. *M.* (l'ictérique) antennis setariis subtus flava , supra nigra , lineis thoracis scutelloque flavis. *M.* 91. t. 10. f. 4.
Hab. in Germaniæ floribus. *D. de Hattorf.*
 In Bressia , sed rarior. *V.*
Desc. Parva. *Caput* flavum vertice nigro.
Thorax flavus , dorso nigro lineis quatuor scutelloque flavis. *Abdomen* supra nigrum , subtus flavum. *Alæ* immaculatæ.
Obs. Licet inter minimas enumeranda sit , facile tamen distinguitur colore supra nigro infra flavicante lineisque thoracis flavis. *Scutellum* majus in hac specie. *V.*
- Syngene-** 318. *M.* (de la syngénésie) antennis setariis atra , alis albis , fasciis tribus abbreviatis maculaque apicis nigris.
M. 101.
Hab. in Germaniæ floribus. *D. de Hattorf.*
Desc. *Corpus* parvum , totum atrum. *Alæ* albæ , hyalinæ , fasciis tribus nigris , quæ tamen marginem tenuiorem haud attingunt , baseos vero ad costam inferne extenditur. *Alæ* terminatur macula atra.
- Tussilagi-** 319. *M.* (du tussilage) antennis setariis flava , alis albis , fasciis quatuor fuscis.
M. 102.
Hab. in Daniæ floribus.
Desc. *Corpus* flavum , stylo ferrugineo ; apice nigro.
- Onopordi-** 320. *M.* (du pédane) antennis setariis ; scutello flavo , alis variegatis. *M.* 104.
Hab. in Daniæ cæruis.
Desc. Parva , statura *M. solstitialis.*
Caput albicans. *Thorax* & *abdomen*

ferruginea. *Scutellum* elevatum, flavum. *Pedes* pallidi. *Alæ* fusco alboque variæ.

Hieracii. 321. M. (de l'éperviere) antennis setariis, alis fuscis albo variis, margine crassiori maculis tribus nigris pupilla alba. M. 105.

Hab. in Angliæ floribus compositis.

Desc. *Caput* griseum, punctis aliquot parvis, fuscis. *Thorax* griseus, punctis duobus humeralibus, quatuor in medio & duobus posticis fuscis. *Abdomen* cinereum, fasciis quatuor nigris, primoribus duabus interruptis. *Pedes* flavi.

Compressa. 322. M. (l'aplatie) antennis setariis pilosa nigra, thorace lineato, abdomine cylindrico rufo, linea dorsali nigra, femoribus rufis.

Hab. in Hispaniæ domibus. D. Vahl.

Desc. Affinis certe M. *brassicariæ*, antennæ distincta videtur. *Antennæ* nigrae. *Frons* utrinque linea argentea, nitida. *Thorax* niger, lineis tribus argenteis nitidulis. *Alæ* albidæ, basi parum flavescentes. *Abdomen* compresso-cylindricum, rufum, segmentorum marginibus argento nitidulis, linea dorsali nigra. *Pedes* nigri, femoribus rufis.

Labiata. 323. M. (la labiée) antennis setariis pilosa nigricans, labio argenteo, nitidissimo, alis albis immaculatis.

Hab. in arboretis Hafniensibus saltatrix.

Dr. Pflug.

Desc. Magnitudo & statura M. *roralis*. *Corpus* totum pilosum, nigricans,

subteffelatum. *Labium* villosum, argenteum, nitidissimum. *Alæ* albæ immaculatæ, squama halterum fornicata nivea. *Pedes* nigri.

- 4-Macula-324. M. (la quadrimaculée) antennis setariis pilosa atra, abdomine maculis quatuor apicis cinereis.

Hab. Kiliæ.

Desc. Paullo major M. *cellari*. *Caput* atrum, ore albo nitidulo. *Thorax* pilosus, ater, nitidus, immaculatus, *scutello* elevato. *Squamæ halterum* magnæ, albæ. *Abdomen* oblongum atrum, ultimis duobus segmentis utrinque macula cinerea. *Pedes* atri. *Alæ* albidæ, immaculatæ.

- Aurata. 325. M. (la dorée) antennis setariis nitida, thorace æneo, abdomine obtuso aureo.

Hab. Kiliæ. D. Daldorf.

Desc. Affinis M. *cuprariæ*, at latior magisque obtusa. *Caput* nigrum. *Thorax* viridi-æneus, nitidus. *Abdomen* obtusum, planum, aureum. *Alæ* obscuræ.

- Latro. 326. M. (la friponne) antennis setariis pilosa grisea, abdomine cinereo, segmentorum marginibus nigricantibus.

Hab. in Europa haud infrequens.

Desc. Magnitudo M. *scybalariæ*. *Caput* pallidum, *antennis* testaceis seta nuda. *Thorax* valde pilosus, obscure griseus, punctis aliquot indistinctis fuscis. *Abdomen* pilosum, cinereum, nitidulum, segmentorum marginibus atris, subtus magis obscurum. *Pedes* testacei, apice nigri. *Alæ* obscuræ.

Clavata. 327. M. (la massue) antennis setariis pilosa setacea , abdomine fusco , segmentis basi pallidi , stylo ani clavato.

Hab. Kilix.

Desc. Parva. *Caput* testaceum , ore pallidior. *Thorax* pilosus testaceus. *Abdomen* fuscum , segmentis basi pallidis. *Ani* stylus exsertus , apice capitatus testaceus. *Pedes* testacei. *Alæ* magnæ , asallidæ , immaculatæ.

Dioscoi- 328. M. (la dioscoïde) antennis setariis
dea. nigra , alis punctis lineolisque marginalibus albis , capite pedibusque testaceis.

Hab. in Hafniæ floribus. *D. de Schestedt.*

Desc. Magna in hac familia. *Caput* testaceum , oculis nigris. *Thorax* & *abdomen* nigra , immaculata. *Alæ* atræ , punctis baseos lineolisque marginalibus abbreviatis albis. *Pedes* testacei.

Erythroce- 329. M. (l'érythrocéphale) antennis setariis
phala. fusco-cinerea , capite rufo , puncto verticali atro.

Hab. in Sueciæ floribus. *D. de Paykull.*

Desc. Parva. *Caput* rufum , puncto magno in medio verticis , atro. *Thorax* obscure cinereus , immaculatus. *Abdomen* fusco-griseum , nitidum. *Alæ* albæ , puncto lineaque transversa nigris. *Pedes* nigri.

Dauci. 330. M. (de la carotte) antennis setariis , alis albis , fasciis quatuor distinctis nigris , scutello pedibusque testaceis.

Hab. in Sueciæ floribus. *D. de Paykull.*

Desc. Magnitudo M. *urticæ* , at minor. *Caput* nobis deest. *Thorax* cinereus , scutello pallide testaceo. *Abdomen* nigro stylo elongato. *Alæ* albæ , fasciis

quatuor, quarum prima obsoletior ; quarta apicis. *Pedes* testacei.

Lychnidis. 331. M. (du lychnis) antennis setariis atra, capite pedibusque flavis, alis nigris, limbo albo striato.

Hab. Kiliæ. *D. Daldorf.*

Desc. Media. *Caput* flavum, oculis nigris. *Thorax* & *abdomen* glabra, atra, immaculata. *Pedes* flavi. *Alæ* nigræ, limbo omni lineolis abbreviatis albis.

Minuta. 332. M. (la petite) antennis setariis flava, thoracis dorso abdomineque strigis nigris.

Hab. in Kiliæ floribus. *D. Daldorf.*

Desc. Minuta. *Corpus* totum flavum. *Thorax* supra niger. *Abdomen* strigis duabus punctisque duobus ultimi segmenti nigris.

Ex Inf. paris. Entom.que paris.

Stellata. 333. M. (l'astérisque) cinerea, alis albis apice macula rotunda radiata.

Hab. in Europa.

Desc. Parva cinerea. *Thoracis abdominisque* apex niger. *Alæ* albæ, macula nigra radiata.

Hedera- 334. M. (du lierre) nigra, abdominis basi maculis fulvis, alarum fascia transversa nigra basi fulva.

Hab. in hedera.

Desc. Magna inter medias, nigra. *Alæ* basi fulvæ, macula magna fusca in medio.

Sigmoi- 335. M. (le zig-zag) alis unguiculatis, albo fuscoque reticulatis, linea undulata sigmoidæa nigriore.

Hab. in Europa.

Desc. Fusca. Alæ fusco reticulatæ, maculis albis rotundis lineaque sigmoidæa quæ quinquies alam percurrit.

Helenii. 336. M. (de Pinule hélénieræ) alis unguiculatis, albo fuscoque reticulatis, macula duplici nigra.

Hab. circa capita helenii.

Desc. Affinis priori, sed alæ maculis duabus, quarum una elongata in medio alæ, altera rotundior marginem exteriorem tangit.

Trimaculata. 337. M. (la trimaculée) flava, alis fulvis, macula triplici punctisque plurimis fuscis.

Enum. n. 968.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. Tota flavescens. Alæ etiam flavicantes, maculis magnis tribus nigricantibus, quarum ad apicem una, in medio una, ad marginem interiorem altera, insuper innumeris punctis albis ad lentem conspicuis obsitæ.

4-Fasciata. 338. M. (la quadrifasciée) flavescens, alis albis, fasciis quatuor transversis fuscis, nonnullis connexis, thorace punctis nigris.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Parva flavicans. Thorax maculis nigris in fascias dispositis. Alæ albæ, fasciis quatuor fuscis.

5-Fasciata. 339. M. (la 5-fasciée) nigra, alis albis, fasciis quinque nigris, nonnullis connexis.

Hab. in Europa.

Desc. Præcedenti minor. Thorax non

maculatus. *Alæ* albæ, maculis quinque transversalibus nigris.

Afellifor- 340. M. (la cloporte) nigra, alis fuscis, fascia duplici alba.

Hab. in Europa. In sylvis.

Desc. Minima, nigra nitens. Alæ fusco-nigricantes, fasciis duabus albis. Pedes elongati. Primo intuitu afellus judicaretur.

Larvata. 341. M. (la masquée) cinerea, alis subfulvis, fasciis quatuor transversis nigris, tertia interrupta.

Hab. in Europa. In pratis.

Desc. Caput luteum. Alæ corpore longiores, fasciis quatuor nigricantibus inæqualibus, tertia longiore in medio interrupta.

Personata. 342. M. (la déguisée) cinerea, nigro punctata, alis albo fuscoque marmorata.

Hab. in Europa.

Desc. Grisea oscillo albo. Caput, thorax ad lentem nigro punctata. Alæ abdomine longiores, albæ, fasciis fuscis vix distinctis, inde irregulariter albo fuscoque marmoratæ adparent.

Tessellata. 343. M. (l'échiquier) alis fusco tessellato reticulatis.

Hab. in Europa.

Desc. Caput fulvescens. Thorax cinereo-nigricans. Abdomen maris fulvum, femina nigrescens. Alæ albæ, reticulo fusco fasciis intersecto.

Clavifor- 344. M. (la claviforme) thorace nigro, abdomine fulvo clavato, alis fusco nebulosis.

Hab. in Europa. In hortorum humo recenti.

Desc. *Caput* luteum, persona alba. *Thorax* niger, pilorum fasciis, certa lucis incidentia, albis. *Abdomen* apice clavatum. *Alæ* fuliginosæ, fasciis tribus transversis.

Longicor-345. *M.* (la longicorne) cinerea, thorace fasciis nigris, alarum margine externo maculis fuscis, medio puncto nigro.

Enum. n. 965.

Beytr. Zur. nat. p. 96. §. 67.

Hab. in Europa.

Desc. *Caput* rubellum. *Oculi* brunnei. *Antennarum* clava longa. *Thorax* lineis alternatim nigris cinereisque. *Alæ* longæ, fasciis quatuorve fuscis, infima majori, puncto nigro in medio.

Aquatica. 346. *M.* (l'aquatique) cinerea, thorace fasciis fuscis, alarum margine externo flavescente singulo punctis tribus nigris.

Hab. in Europæ aquis, inter lentem palustrem.

Desc. Præcedenti affinis. *Alæ* tribus punctis nigris, quorum unum in medio, unum in margine exteriori, tertium huic oppositum interiorem marginem prope.

Obs. Larva viridis.

Geogra-347. *M.* (la géographique) nigra, abdomine fascia longitudinali nigra, alis albo fuscoque variegatis.

phica.

Hab. in Europa.

Desc. *Abdomen* fuscum, linea longitudinali nigra, non ultra quartam incisuram producta. *Alæ* fusco alboque variegatæ.

Intersecta. 348. M. (l'entrecoupée) thorace nigro , flavo maculato , abdomine flavo , fasciis transversis nigris.

Hab. in Europæ sylvis.

Desc. Caput antice luteum , linea longitudinali nigra in medio. *Oculi* brunnei. *Thorax* niger , fasciis longitudinalibus pallidis. *Alæ* diaphanæ , margine exteriori fulvescentes. *Abdomen* citrinum , lineis nigris transversis cingulorum instar , in medio segmentorum fascia nigra latera abdominis non attingente , sed lineis nigris medio annexa.

Orbicula- 349. M. (l'orbiculée) thorace nigro , abdomine atro , paribus tribus macularum rotundarum lutescentium.

Hab. in Europa , inter aphides.

Desc. Caput nigrum. *Oculi* brunnei. *Abdomen* nigrum , incisuris quatuor , maculis sex luteis rotundis , quarum duæ parvæ in primo segmento , duæ majores in secundo , duæ in tertio , quarto nigro.

Lineata. 350. M. (la rayée) aurata , abdomine nigro , tribus paribus linearum albicantium.

Hab. in Europa.

Desc. Caput thoraxque viridi-aurata. *Alæ* fuscescentes. *Abdomen* rotundatum nigricans , strigis sex obliquis albidis.

Vorax. 351. M. (la vorace) thorace nigro-viridi , apice flavo , abdomine atro , quatuor paribus macularum oblongarum flavescantium.

Hab. in Europa , inter aphides.

Coalescens. 352. M. (la réunie) nigra , abdominis medio ferrugineo , antennis basi coalitis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra. *Alæ* margine exteriori fuscescentes , punctis duobus minimis in medio. *Abdomen* nigrum , segmento secundo lateraliter fulvo , tertio fulvo , quarto secundo simili , cætera nigra.

Obs. Nota ex antennis basi coalitis sumta , plurimis convenit , nomen igitur triale mutandum. V.

Adunata. 353. M. (l'y) nigra flavo variegata , alarum parte externa nigra , antennis basi coalitis. *Ent. parif.*

Hab. in Europa.

Obs. An M. *conopsoidea* ? V.

Sericea. 354. M. (la foyeuse) thorace abdomineque viridi-sericeo , pedibus pallidis , alis albis.

Hab. in Europa. In hortis.

Desc. *Tota* viridi-aurata , sericea. *Abdomen* incisuris quinque , ultima longissima. *Pedes* longi , pallidi.

Annulata. 355. M. (la mariée) nitens , thorace viridi , abdomine æneo , tarforum annulo albo.

Hab. in humo recenti. Vulgo les couches.

Desc. *Oculi* fusci. Inter antennas tuberculum carneum compressione visibile. *Thorax* fere aurato-viridis. *Abdomen* cupreo-fuscum. *Alæ* longæ albæ. *Pedes* nigricantes , tarforum articulo primo albo.

Smaragdi. 356. M. (la chlorocéphale) capite viridipumbeo nitente , pedibus flavis , alis nervosis. *Ent. parif.*

Hab. in Europa.

Spinifera. 357. M. (la porte-épine) nigra , alis fuscis , pedibus spinosis.

Hab. in Europa.

Desc. Tota nigra. *Abdomen* fere cylindricum. *Alæ* fuscæ. *Pedes* postici longi spinosi.

Obs. Effet spinipes *D. Scopoli*, sed nigra , illa rufa. Variat pedibus pallidis. V.

Characte- 358. M. (la caractéristique) thorace nigro ,
ristica. lineolis quatuor longitudinalibus albidis , abdomine fusco , medio caracteribus atris.

Hab. in Europa.

Desc. Lineæ auratæ ante oculos brunneos. *Thorax* niger , lineis albis quatuor. *Abdomen* lineis caracteribusque atris. Maculæ nigræ pupillatæ , inter quas macula nigricans. Subtus flavescens.

Fulvipes. 359. M. (la fulvipede) nigra , alis incumbentibus , pedibus ferrugineis.

Hab. in Europa.

Desc. Nigra , elongata. *Pedes* ferruginei.

Guttata. 360. M. (l'étoilée) alis incumbentibus , halteribus abdominisque macula albis.

Hab. in Europa.

Desc. Elongata , angusta , nigricans. *Oculi* magni brunnei. *Alæ* incumbentes. *Halteres* albi. *Abdomen* macula magna alba composita , in quarti , quinti sextique segmenti medio.

Globuli- 361. M. (l'estropiée) nigra , tarsis anticis
pes. clavatis , crassis. t. 10. f. 5.

Hab. in Europa.

Desc. Nigricans. *Alæ* fuscæ , margine exteriori incrassato. *Abdomen* elongatum ,

acuminatum tarsi anteriores fere globosi.

Obs. In nostris tarsi non globosi, licet incrassati. V.

Fallax. 362. M. (la trompeuse) atra, alis albis, marginis exterioris medietate superna nigra.

Hab. in Europa.

Desc. Brevis. Nigra. *Alæ* albæ, lineola nigra angulata pedi plicato similis. *Pedes*, imprimis *posteriores*, longi.

Fimeto- 363. M. (des fumiers) nigra, alis fuscis, oculis rubris.

Hab. in Europa.

Desc. Parva, nigra. *Oculi* rubri. *Alæ* fuscae.

Marginalis- 364. M. (la marginale) fusca, alis macula marginali fusca.

Hab. in Europa.

Desc. Fusca. *Thorax* fasciis duabus longitudinalibus nigris. *Alæ* obscuræ, macula marginali fusca in margine exteriori. *Abdomen* acutum, incisuris quatuor. *Pedes* *postici* elongati.

Longipes. 365. M. (la longipede) fusca, alis puncto marginali fusco, pedibus flavescens.

Faun. Fridr. n. 763.

Hab. in Europa.

Desc. Præcedenti affinis, sed minor. *Thorax* rotundatus brevis. *Abdomen* elongatum. *Alæ* puncto marginali lutescente. *Pedes* longissimi, lutei.

Tipulæa. 366. M. (la tipule) cinerea, pedibus flavescens.

Hab. in Europa.

Desc. Structura tipulæ. *Corpus* griseum, tenue, elongatum. *Alæ* diaphanæ. *Pedes* longi, lutei.

Ichneumo-367. M. (l'ichneumonoïde) nigra, pedibus flavis, antennis abdomineque tenuibus productis.

Hab. in Europa rarissima.

Desc. Tota nigra, pedibus exceptis. *Antennæ* longæ. *Abdomen* angustatum, longum, acuminatum. *Alæ* abdomine breviores, nervis fuscis. *Pedes* elongati flavi.

Obs. Primo intuitu ichneumon. In Gallia, prope Nemaufum, semel legi hoc singulare insectum. V.

Pulicaria. 368. M. (la puce) nigra, pedibus flavis, alarum margine externo nigro.

Hab. in Europa.

Desc. Minima, nigra, angustata, elongata. *Abdomen* apice acutum. *Alæ* abdomine longiores, margine exteriori nigro. *Femora* incrassata.

Cruciata. 369. M. (la croisée) flavescens, oculis nigris, alis incumbentibus glaucis.

Hab. in Europa.

Desc. Minima. *Oculi* nigri. *Corpus* luteum. *Alæ* cruciatae, cærulescentes. *Pedes* flavescentes.

Ex Enum.

Apiformis. 370. M. (l'apiforme) antennis setariis hirsuta nigra, thoracis basi cinguloque abdominis flavo, ano albido.

Hab. puppa in carie arborum emortuarum.

Desc. *Antennæ* setariæ. *Alæ* cruciformiter

incumbentes, uti in apibus, post mortem tamen parallelæ evadunt. *Corpus* totum valde hirsutum, ut in apibus bombinatricibus, præsertim vero api *hortorum* omnino similis. *Nigra tota*. *Frons* alba. Fascia in basi thoracis & alia per medium abdominis flavæ. *Abdominis* apex albet. *Abdomen* musca gerit deflexum, in cujus basi s. segmento primo utrinque foveola parva, ex cujus centro peculiaris fascis oritur. *Alæ* hyalinæ, medio umbra fuscescente. *Abdomen* subtus glabrum.

Puppa fuscescens, fuliginosa, gibba. Ad capitis regionem corpora duo verruciformia, fors vaginæ verrucarum totidem in declarato insecto in basi thoracis sub hirsutie latentium. In dorso macula alba furcata. Abdominis apex subaculeatus, prominente cuspe vaginis duabus inclusa, quarum superior nihil aliud, quam continuatio pellis puppæ, inferior vero cornu colore nitet. *Corpus* totum subtus subcomplanatum, cum vestigio trium parium pedum.

Argyrosto-371. M. (la riche) antennis setariis pilosa nigra, fronte fasciisque abdominis argenteis.

Hab. in Europa.

Desc. Subtus atra, carbonis instar, non nitens, supra atra nitens. *Thorax* lineis aliquot longitudinalibus minus atris. *Frons* & si adcurate intuearis, caput totum argenteum. *Oculi* rubescenti-nigri & in collo tomentum ferrugineum. *Antennæ* fuscae, rubescentes magis quam oculi. *Abdomen* oblongum, fasciis tribus tenuibus argenteis, quæ
bases

baseos secundi, tertii & quarti segmentorum occupant.

Clavicus. 372. M. (l'estropiée) antennis fetariis flava, nuda, oculis viridibus, femoribus posticis clavatis.

Hab. in Europa.

Desc. Antennis fetariis flava. *Oculi* virides, post mortem nigri. In *thorace* lineæ tres longitudinales testaceo-fuscæ. In *abdomine* fasciæ tres ejusdem coloris. *Femora* postica crassa.

5-Puncta- 373. M. (la 5-ponctuéée) antennis fetariis cinerea, ala punctis tribus ad marginem externum, uno ad apicem, uno ad internum.

Hab. in Europæ urtica dioica.

Punctata. 374. M. (la ponctuéée) antennis fetariis flava, thorace abdomineque lineis quatuor punctorum nigrorum, alis albis, margine fasciisque tribus flavis.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. *Oculi* virides a morte nigri fiunt.

Pæcilop- 375. M. (la péciloptère) antennis fetariis, alis rufo-fuscis, albo variegatis.

Beytr. Zur. nat. p. 96. §. 68.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Obs. Nomen ab alis variegatis sumtum, major præcedenti; aliæ eleganter pictæ. V.

Lamed. 376. M. (le Lamed) antennis fetariis, alis hyalinis, margine externo fusco-variis, interno *Lamed* hebræo fusco inscriptis, t. 10. f. 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Insect. Tomus III.

Mm

Desc. Caput album. Oculi nigri. Antennæ testaceæ, supra has squama reflexa fulva. Thorax cinereus; medio lineæ duæ approximatae longitudinales nigrae. Abdomen cinereum. Pedes pallide testacei. Alæ hyalinæ, margine externo obscuriore & præterea maculis quatuor fuscis latiusculis variegato. Harum postrema excurrit usque ad apicem aliique lineæ jungitur, quæ a basi marginis renuiori usque ad apicem forma *Lamed* hebræi excurrit.

Annulata. 377. M. (l'entourée) antennis setariis pilosa, oculis violaceis, fasciis purpureis sex, pedibus annulo albo.

Hab. in Europa. In plateis ad domorum pedes.

Desc. Nigra, nitida. Caput intra oculos rubrum. Scutellum utrinque subtus rubens s. cupreum. Abdomen utrinque subtus rubens. Pedum omnium *tarsi* basi annulo albo. Fasciæ oculorum in morte pereunt.

Obs. An la mouche verdâtre à anneau blanc aux tarses. *Geoff.* 67?

Resinella. 378. M. (de la ph. résinelle) antennis setariis nigra, halterum squama ferruginea, abdomine angulis duobus albis tenuibus.

Beytr. Zur. nat. n. 42. §. I.

Hab. in phalæna tinea *resinella*.

Ex Faun. Fridr.

Fasciata. 379. M. (la fasciée) antennis setariis nigra, glabra, alarum costa dimidia lutescente, abdomine fasciis septem flavis.

Hab. in Europæ nemoribus.

Placida. 380. M. (la tranquille) antennis setariis pilosa, thorace aureo, abdomine pellucido flavo, linea dorsali nigra.

Hab. in Europæ hortis.

Obs. Affinis M. *dorsali* D. Fab. sed thorax in hac cinereus, in musca placida auratus. V.

Squamata. 381. M. (l'écailleuse) antennis setariis pilosa viridis, abdomine geniculato, inflexo, squamis duabus terminalibus.

Hab. in Europæ hortis.

Cyanea. 382. M. (l'azurée) antennis setariis glabra, abdomine nitido violaceo, octo maculis cyaneis, pedibus subluteis.

Hab. in Europa.

Flavicans. 383. M. (la jaunâtre) antennis setariis pilosa, thorace sub cinereo, abdomine pedibusque flavis.

Hab. inter Europæ arbuscula.

Aurata. 384. M. (la dorée) antennis setariis pilosa nigra, fronte argentata, alis basi auratis.

Hab. in Europa.

Pullata. 385. M. (la pauvre) antennis setariis pilosa lutea, alis hyalinis maculis nigricantibus.

Hab. in Europæ arvis.

Æstiva. 386. M. (de l'été) antennis setariis pilosa, abdomine flavo, apice, thorace pedibusque nigris.

Hab. in Europæ sylvis.

Ex nost. Musc.

Cribrata. 387. M. (la criblée) fusca; alis innumeris punctis albis irroratis. t. 10. f. 7.

Mm ij

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Antennæ subplumatae, seta nivea. Tota fusco-ferruginea. Alæ cruciatæ, margine omni fusco, punctis innumeris albis confertis adpersæ, abdomine longiores, affinis M. parietinæ.

Hæmorrhoidalis. 388. *M. (l'hémorrhoidale) nigra, alis variegatis, stylo ani ferrugineo, lato, apice nigro. t. 10. f. 8.*

Hab. in Europa. Prope Nemausum capta.

Desc. Certe hæc nec M. tussilaginis D. Fab. nec solstitialis Syst. Thorax niger, vellere aurato. Alæ albæ nigro variegatæ. Fæminæ anus stylo ferrugineo lato, obtuso, apice nigro terminatur.

Viridescens. 389. *M. (la verdâtre) capite rufo, thorace abdomineque virescentibus, stylo nigro brevissimo. t. 10. f. 9.*

Hab. in Europa, Massiliæ.

Desc. Statura, magnitudo præcedentis. Alæ similiter pictæ. Fæmina stylo nigro brevissimo.

Aterrima. 390. *M. (le charbon) antennis fetariis atra, halterum squamis magnis cochleariformibus niveis.*

Hab. in Europa.

Desc. Rara & singularis species. Atra. Alæ basi ferrugineæ. Halteres squama nivea, concava, marginata tecti; inde facile dignoscenda.

Depressa. 391. *M. (l'aplatie) antennis fetariis grisea, occipite rufo, depresso.*

Hab. in Europa. In Bressia.

Desc. Media. Grisea. Occiput rufum, depressum inter oculos. Alæ ut in M.

ferrata, abdomine duplo longiores, albidæ, margine exteriori fusco, albido variegato. *Pedes* rufescentes.

Nitens. 392. M. (la brillante) antennis setariis æneo-nitens, alis flavescentibus.

Hab. in Europa. In Gallia Australiore.

Desc. Magna. *Tota* æneo-nitens. *Os* vesiculofum. *Thorax* tomentosus, pilis hirtis inter tomentum. Incisuræ abdominis ciliatæ. *Alæ* magnæ, amplæ, flavescentes, vix maculatæ. *Pedes* pallidi.

Aurifrons. 393. M. (la riche) antennis setariis, fronte, thorace alarumque basi aureis. t. 10. f. 10.

Hab. in Europa. In Occitania.

Desc. Media. *Os* vesiculofum album. *Frons* aurea. *Thorax* vellere aureo tectus. *Halterum* squamæ luteæ. *Alæ* basi auratæ, margine exteriori dimidiato fusco, in medio albicantes. *Abdomen* nigrum, crassum, basi maculis duabus flavis. *Pedes* nigricantes.

Obs. Variat abdomine rufo, linea longitudinali nigra in medio.

Elongata. 394. M. (l'alongée) antennis setariis, occipite thoraceque rubris, abdomine nigro.

Hab. in Europa. Rara.

Desc. Nec *ichneumona* Syst. nec *ichneumonoidis* inf. parif. magna, angusta, elongata. *Caput* inter oculos, rubrum. *Thorax* ruber, macula magna antice nigra. *Alæ* flavescentes, apice macula fusca. *Abdomen* nigrum, acuminatum. *Pedes* nigri, anticis rufescentibus.

Obs. Variat thorace absque macula nigra.

Leucoce- 395. M. (la leucocéphale) antennis setariis;
phala. capite argentato, albidī abdominis basī
diaphana. t. 10. f. 11.

Hab. in Europa. In montibus Gebennis, sed rarissima.

Desc. Media. Caput argenteum. Oculi magni, coaliti. Thorax niger, tomento niveo lateraliter subtusque vestitus. Alæ fere flavescentes. Halterum squamæ albæ. Abdomen antice diaphanum, postice nigrum. Pedes nigri, unguibus pallidis.

Bilineata. 396. M. (la bilinéaire) antennis setariis,
capite lineis duabus albis, corpore marmorato.

Hab. in Europa.

Desc. Vertex lineis duabus oculos cingentibus. Thorax & abdomen nigra, albo hastata. Alæ albæ, maculis punctisque fuscis s. fuscæ punctis maculisque albis.

Tubercu- 397. M. (la tuberculée) antennis setariis,
lata. capite octo vel decem tuberculis duplici
serie dispositis, abdomine punctato.

Hab. in Europa. In montibus Gebennis.

Desc. Minor. Caput inter oculos rufum, octo vel decem tuberculis e quibus exsurgit pilum rigidum. Os horribile. Thorax nigro-griseus. Alæ mirabiles, in medio fuscæ, punctis albis rotundis inæqualibus; totus margo albus: exterior lineis curvis fuscis intersectus, quæ lineæ albedinem marginis posterioris ad dimidium usque secant. Dein altera pars, uti margo interior, albo punctatus. Abdomen griseum, decem punctis nigricantibus lineas duas convergentes constituentibus. Anus fæminæ niger, stylo nigro brevi armatus. Pedes pallidi.

Atra. 398. M. (la partagée) antennis fetariis tota atra, alis dimidio-atris.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo M. domesticæ. Tota atra. Alæ apice albæ. Halteres corpori concolores.

GENUS IV.

TABANUS. Os proboscide carnosa terminata labiis duobus.

Rostrum palpis duobus subulatis, proboscidi lateralibus, parallelis.

Bovinus. 1. T. (des bœufs) oculis virescentibus; abdominis dorso maculis albis trigonis longitudinalibus. *

Scop. carn. 1006.

Jonst. inf. t. 8. *t.* 2. *f.* 22.

Reaum. inf. 4. *t.* 17. *f.* 8.

Geoff. paris. 2. *p.* 459. *n.* 1.

Schæff. elem. t. 122.

Fab. 3.

De Geer tom. 6. *p.* 219. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 10 & 11. fuscus, antennis lunulatis oculis viridibus, tibiis flavis, abdomine lineis transversis maculisque trigonis pallescentibus.

Enum. n. 974.

Poda gr. p. 117.

Harrif. inf. Angl. t. 7. *f.* 2. tabanus Tropicus.

Faun. Fridr. n. 767.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 984.

Tabani larvæ sub pratis degunt. D. de Geer auct. holmenf. 1760. *p.* 276.

Hab. in Europa, equis infestus.

Desc. In genere suo hic maximus est. *Alæ* diaphanæ, venis ferrugineis. *Corpus* griseum. *Thorax* cinereus. *Oculi* nigricantes. *Dorsum* abdominis sub alis magis flavescit, extra eas magis fuscum. In medio dorso, in singulo segmento, macula triangularis albida, acumine thoracem spectante. *Femora* nigricantia; *tibiæ* luteæ. *Faun.* 1882.

Autumnalis. 2. T. (de l'automne) alis hyalinis, abdomine fusco, ordine triplici albido maculato.

Scop. carn. 1007.

Fab. 5.

Harris. inf. Angl. t. 7. *f.* 4.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Paulo minor majore nostrate. *Faun.* 1883.

Obs. Præcedenti rarior. *Antennæ* similiter lunulata. V.

Tarandicus. 3. T. (des rennes) oculis viridibus ? abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis. *

Fab. 8.

Hab. in Lapponia, Norwegia, tarandorum tenella cornua pungens, vulnerans, deformans.

Desc. Magnitudine ad T. *bovinum* accedit. *Oculi, thorax, abdomen* nigra, sed incisurarum margines pilis s. margine flavo, tam in dorso quam in ventre, cinguntur. *Pedes & antennæ* rufæ sive obscure luteæ sunt. *Alæ* subgriseæ. *Faun.* 1884.

Rusticus. 4. T. (le rustique) oculis glaucis, corpore cinereo pubescente.

Fab. 17. oculis glaucis cinereus, fronte punctis duobus atris.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 462. n. 7.

Enum. n. 976.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 986.

Hab. in Europa, in Suecia. In Gallia Aust. V.

Corpus mediæ magnitudinis, totum villosum s. hirsutum, quo a bromio differt. Abdominis latera vix manifeste flavescentia. Alæ immaculatæ. Oculi immaculati. Plantæ pedum nigricantes. Antennæ testaceæ. Frons punctis 2 nigris, altero superiore.

Bromius. 5. T. (le bruyant) oculis fascia purpurascente, corpore cinerascente lævior. *

Scop. carn. 1011.

Fab. 14.

De Geer tom. 6. p. 221. n. 3. antennis lunulatis, oculis viridibus fascia purpurascente unica, corpore griseo-cinereo nigroque variegato.

Schaff. icon. t. 130. f. 6.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Alæ albæ. Totum corpus cinereum. Oculos linea transversalis, singularis coloris notat, qua manifeste distinguitur a reliquis, & præsertim a pluviali cui valde affinis. Tibiæ pallidæ. Faun. 1885.

Obs. Oculorum colores cum vita pereunt, aqua calida iterum reviviscunt.

Tropicus. 6. T. (le Tropicque) oculis fasciis ternis fuscis, abdominis lateribus ferrugineis. *

Scop. carn. 1008.

Fab. 20.

De Geer tom. 6. p. 220. n. 2. t. 12. f. 15.

antennis lunulatis, oculis viridibus;
fasciis ternis viridibus, pedibus fuscis,
abdominis lateribus macula magna
rufa.

Enum. n. 975.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 986.

Faun. Fridr. n. 768.

Harris. inf. Angl. t. 7. f. 3.

Schæff. icon. t. 137. *f.* 4.

Hab. in Europa, equis, instante pluvia;
molestus. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo bombylii. *Totus* hic
glaber. *Latera abdominis* versus basin
ferruginea; *margines segmentorum ab-*
dominis, præsertim in dorso, albidii.
Femora nigra. *Tibiæ* rufæ. *Alæ* albidæ.
Incisuræ abdominis tres priores testa-
cæ, tres posteriores nigræ. *Oculi*
virescentes, lineis tribus transversis
fuscis. *Antennæ* lunulatæ. *Faun.* 1886.

Obs. Variat. *Fæmina* major. *Abdomen*
fulvo nigroque dimidiatum; fasciis
oculorum ne fidas, etenim post mortem
raro conservantur. V.

Pluvialis. 7. T. (le pluvial) oculis fasciis quaternis
undatis, alis fusco punctatis. *

Scop. carn. 1012.

Reaum. inf. 4. t. 18. *f.* 1.

Geoff. parif. 2. p. 461. *n.* 5.

Fab. 23.

De Geer tom. 6. p. 223. *n.* 5. *t.* 13.
f. 1. & 2. antennis subulatis, oculis
viridibus, fasciis quinque undatis pur-
pureis, corpore fusco-cinereo, alis
fusco maculatis.

Enum. n. 978.

Schæff. icon. t. 85. *f.* 8. 9.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 997.

Harris. inf. Angl. t. 7. f. 8.

Pod. gr. p. 117.

Faun. Fridr. n. 769.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo *M. domestica*. *Totus* cinereo-fuscus. *Alæ* cinereæ, punctis minutissimis albis, cum puncto marginali majori nigricante. *Oculi* virescentes, lineolis transversis undulatis. *Thorax* cinereus, lineis longitudinalibus striatus: duo puncta nigra inter oculos. *Antennæ* nigræ filiformes. *Tibiæ* variegatæ. *Faun.* 1837.

Obs. *Antennæ* subulatæ. *Caput* subtus albedo-griseum vellereque albedo, uti pectus, tectum. V.

Cæcutiens. 8. T. (l'aveuglant) oculis nigro-punctatis, alis maculatis. *

Scop. carn. 1014.

Geoff. parif. 2. p. 463. *n.* 8.

Fab. 27.

De Gcer tom. 6. p. 224. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 3.-5. antennis subulatis, oculis aureis purpureo punctatis, abdominis maculis trigonis flavis, alis maculis tribus fuscis.

Schæff. icon. t. 8. *f.* 1.

Harris. inf. Angl. t. 7. *f.* 5.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudine vix *M. domesticam* superat. *Totus* fuscus. *Litura abdominis* juxta basin sub alis flava. *Alæ* magnis maculis albis & nigricantibus variegatæ. *Antennæ* subulatæ sive filiformes, versus basin pilosæ, nec ullo modo lunulatæ. *Oculi* virides fulvescentesque nitidissimi, maculis aliquot distinctis nigris. *Faun.* 1838.

Obs. In tabano cæcutiente, oculi coaliti. Hac nota præcipua a tabano *maritimo* aliisque distinguitur.

Lugubris. 9. T. (le lugubre) oculis corporeque nigro, alis fuscis macula alba. * t. 10. f. 12.

Fab. 28.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Similis T. *cæcutienti*, sed paullo minor. *Alæ* fuscae, macula una alterave albida ad marginem tenuiorem.

Abdomen nigrum, ad latera anteriora, imprimis subtus, luteolum. *Faun.* 1889.

Morio. 10. T. (le morio) oculis corporeque toto atro, alis hyalinis. t. 10. f. 13.

Hab. in Barbaria. In Gallia Aust. V.

Corpus magnitudine fere T. *bovini*, exceptis alis, totum atrum.

Obs. Variat magnitudine. *Alæ* in omnibus nostris flavescentes. V.

Ex Entom. Carn. D. Scop.

Ferus. 11. T. (le cruel) oculis viridibus maculis tribus atris, corpore toto sordide flavescente.

Hab. in Europa.

Desc. Punctum nigrum in fronte supra antennis ferrugineas. Rostri vagina & palmarum extrema nigra. *Alæ* immaculatæ, costa ferruginea. Villosus totus cito feriens, ictu cruento.

Alpinus. 12. T. (l'Alpin) oculis viridibus, punctis confertis, thorace cinereo, antennis, abdomine pedibusque ferrugineis. t. 10. f. 14.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura M. *cæsaris*. Punctum lucidum nigrum in fronte. *Antennæ* ferrugineæ, apice nigræ. Rostri vagina nigricans. *Thorax* glaber. *Halteres*

ferruginei. *Abdomen* ovatum. Palmarum extremitates nigricantes.

Rufus. 13. T. (le roux) rufus, oculis viridibus, abdomine fasciis rostri vagina femoribusque nigris.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Totus pilis rufis pubescens. *Oculi* neque fasciati neque punctati.

Salinarius. 14. T. (des salines) niger, alis fuscis, lineis duobus transversis punctoque intermedio albidis.

Hab. circa tergestum *alle saline*.

Desc. Statura, puncta nigra faciei, habitus prioris, sed *totus* niger. *Abdomen* punctis obsoletis dorsalibus trigonis pallidioribus.

Maritimus. 15. T. (le maritime) alis albidis, fascia lata & margine crassiore fuscis.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 464. n. II.

Enum. n. 979.

Hab. circa littora maris Adriatici, copiosus. In Gallia. *Geoff.* circa Lugdunum. V.

Desc. Habitus, *antennæ*, puncta faciei, ut in prioribus, sed *alæ* aliter maculatæ & *abdomen* basi lateraliter rufescens, una cum puncto subrufo dorsali ad basin.

Obs. Hic nec *cæcutiens* nec *lugubris* Linn, species propria. Specimina nostra variant maculis nigris irregularibus atris. *Oculi* virides, quatuor punctis fuscis, intermediis fascia atris.

Ex Inf. paris. Entom. que paris.

Bifasciatus. 16. T. (le bifascié) fuscus, abdomine

antice luteo , alarum margine exte-
riore fasciisque duabus transversis
nigris.

Hab. in Europæ sylvis humidis.

Desc. Abdominis duo prima segmenta
magna , flavescentia , reliqua fusca. *Alæ*
margine exteriori nigræ , duabus fasciis
nigris transversis.

Obs. Thoracis latera pilis fulvis tecta.
Pars abdominis obscura , pilis fere au-
reis certo situ nitens. V.

Intersectus. 17. T. (l'entrecoupé) niger , thorace
lineis duabus longitudinalibus cinereis ,
abdominis segmentis limbo cinereo.

Hab. in Europa.

Desc. *Oculi* brunnei. *Thorax* nigricans ,
fasciis duabus longitudinalibus griseis.
Incisuræ abdominis griseo marginatæ.
Corpus subtus nigrum. *Femora* nigra.
Alæ fulvo-flavescentes.

Ex spec. D. Fab.

Haußella- 18. T. (le bombyloïde) oculis fuscescen-
tus. tibus , abdomine atro , margine fulvo
pubescente , haustello corpore dimidio
breviore. t. 10. f. 13.

Hab. in Hispania. Mus. D. Banks. In
Gallia Aust. V.

Desc. *Haußellum* setis quinque hujus
generis videtur corpore brevius.
Thorax pubescens fuscus. *Abdomen*
atrum nitidum , margine fulvo pu-
bescente.

Obs. Inter magnos locum occupat. *Oculi*
magni coaliti. *Alæ* flavescentes. *Ant-*
ennæ hujus generis , *rostrum* bom-
bylii. V.

Pellucens. 19. T. (le transparent) oculis fasciatis niger, abdominis primo segmento cærulefcente, tibiis candidis.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Antennæ porrectæ, filiformes, nigrae. Caput nigrum, fronte villosa, alba. Oculi in mortuo nigri, at fascias obscuriores video. Abdomen atrum, primo segmento cærulefcente, macula media supra fusca subtus pellucida. Reliqua segmenta supra immaculata, subtus utrinque macula cærulefcente puncto parvo nigro. Pedes nigri, tibiis candidis.

Italicus. 20. T. (l'Italien) oculis fuscis cinereus, abdomine obscuro, basi pallido pellucido.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. Corpus parvum, statura T. bromii, cinereum, oculis magnis fuscis. Abdomen obscurum basi s. primo segmento pallido pellucido lineaque dorsali cinerea. Pedes pallide ferruginei, apice nigri.

Paganus. 21. T. (le villageois) oculis antice viridibus, fasciis tribus fulvis, abdomine utrinque ferrugineo maculato.

Harif. inf. Angl. t. 7. f. 1.

Hab. in Anglia. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura & magnitudo T. Tropici. Os cinereo-hirtum. Oculi glauci, nitescentes, antice virides, fasciis tribus fulvis, quarum inferior oculum terminat. Margo posticus fuscus. Thorax cinereo-villosus, striis quatuor fuscis, obsoletis. Abdomen fuscum, subtus cinereum, singulo segmento utrinque macula ferruginea adjacenteque nigra.

Alæ aqueæ, immaculatæ. *Pedes* cinerei, plantis nigris.

Borealis. 22. T. (le Norwegien) oculis fasciis tribus purpurascentibus, abdomine atro, segmentorum marginibus albidis.

It. Norwag..

Hab. in Norwagia rarius.

Bidentatus. 23. T. (le bidenté) oculis ferrugineus, abdomine utrinque maculis duabus flavis, scutello bidentato.

Hab. in Austria. D. Schulz.

Desc. Caput parvum ferrugineum, oculis magnis nunc atris. *Thorax* gibbus, ferrugineus, vix lineatus. *Scutellum* concolor, dentibus duobus approximatis validis. *Abdomen* ferrugineum, segmento primo macula dorsali fusca, secundo tertio utrinque macula marginali flava. *Pedes* ferruginei.

Bispinosus. 24. T. (l'épineux) oculis fuscus, abdomine ferrugineo, basi nigro, scutello bidentato.

Hab. Gottinguæ. D. Schulz.

Desc. Thorax pubescens, fuscus, sublineatus. *Scutellum* bidentatum, nigrum. *Abdomen* ferrugineum, primo segmento nigro, reliquis ferrugineis macula dorsali nigra, lateralibus flavis obsoletis.

Ex op. D. de Geer.

Fasciatus. 25. T. (le rayé) niger, antennis lunulatis, oculis viridibus, fasciis ternis purpureis, abdominis incisuris griseis.

Hab. in Europa.

Desc M. vomitoria minor. Niger. *Antennæ* rufæ, apice nigræ. *Oculi* virides, striis

striis tribus transversis purpurascen-
tibus. *Abdomen* griseo lineatum, de-
pressum. *Alæ* diaphanæ, nervis fuscis,
margine exteriori fusco.

Ex Enum.

Albipes. 26. T. (l'albipede) oculis fasciis quatuor,
tomentosus, abdomine cingulo atro,
tibiis albis. t. 10. f. 16.

Hab. in Europa. In Gallia Aust.

Desc. Totus tomentosus. *Frons* albens.
Rostrum antennæque nigræ. *Tarsi &*
femora maximam partem cinerea. *Tibiæ*
ex tomento albæ. *Thorax & pedus*
tomento flavescente teguntur, uti &
lata abdominis basis & anus, sed
medium nigrum.

Obs. Nostri specimina multo majora,
tabanum enim bovinum superant. *Tibiæ*
hirsutæ albæ. V.

Arcticus. 27. T. (l'arctique) oculis bifasciatis, tho-
race punctato, alis nigro reticulatis,
costa nigerrima.

Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Hirsutus. 28. T. (le hérissé) hirsuto cinereus, alis
immaculatis.

Hab. in Europa.

Desc. T. pluviali minor albido-cinera-
scens. *Frons* barbaque alba. *Antennæ*
nigræ. *Thorax* cinereo hirsutus. *Alæ*
albæ, immaculatæ. *Abdomen* vellere
albido-griseo obtectum, fasciculis pi-
lofis lateralibus. *Subtus* cinerascens.
Pedes nigro-fusci.

GENUS V.

CULEX. Os aculeis setaceis intra vaginam flexilem.

Pipiens. I. C. (le commun) cinereus, abdomine annulis fuscis octo. * t. 10. f. 17.

Scop. carn. 1017.

Fl. lapp. 363., 364.

Blank. inf. t. 15. f. A.-D.

Reaum. inf. 4. t. 43, 44.

Swamm. quart. t. 23.

— *bibl. t.* 31. f. 4.-8. t. 32. f. 1.-5

Sulz. inf. t. 21. f. a.

Ræf. add. t. 15.

Schæff. elem. t. 54.

Ledem. micr. 1. pp. 2. t. 13. f. A. B.
C. D. E. H. I. L.

Geoff. paris. 2. p. 579. t. 19. f. 4.

β. *Kalm. itin. 2. p.* 268. musquetoés.

Fab. 1.

De Geer tom. 6. p. 316. n. 1. nigro-fuscus, abdomine annulis cinereis.

Kleman. inf. p. 125. t. 15, 16.

Enum. n. 980.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 991.

Faun. Fridr. n. 772.

Hab. in Europæ aquosis; copiosissima in Lapponia; etiam in America obvia.

Kalm. Pellitur fumo, maxime ex inula helenio & cannabe.

Mas antennis palpisque barbatis, vix pungit aut sugit sanguinem.

Culicis larvæ plerumque in aqua degunt & pupæ moventur agiles; piscuntur ab anatibus, declarata vero a pullis tetraonum passeribusque. Fæminæ nos pungunt, mares vero vix, uti sabani.

Larva in aquis ; pupa bicornis reversa ; insectum pipiens , pungens : in Indiis magis venenata. Anates allicit , pullos tetraonum nutrit , Lapponum calamitas felicissima.

Desc. Corpus oblongum , cinereum. Abdomen octo zonis fuscis. Rostrum rectum setaceum. Alæ albicantes , vasculosæ , ad lumen nitentes. Thorax subtus hirsutus. Faun. 1890.

Ciliaris. 2. C. (le cilié) fusco - testaceus , alis ciliatis.

Enum. n. 981.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 991.

Hab. in Europa. Suecia rarior. In Bressia. V.

Simillimus C. pipienti , sed dimidio minor.

Thorax testiceus s. ferrugineus. Abdomen subfuscum. Pedes longi , lividi toti. Alæ obscurius hyalinæ margine (etiam venis) tenuiore ciliatæ. Antennæ nigræ , pilis vix conspicuis verticillatæ.

Bifurcatus. 3. C. (le fourchu) fuscus , rostro bifurco. *

Raj. inf. 74. n. 4.

Reaum. inf. 4. t. 40. f. 1 , 2.

Sulz. inf. t. 21. f. 136.

Fab. 2. fuscus thorace sublineato.

Enum n. 982.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 992.

Faun. Fridr. n. 773.

Hab. in Europa. In Gallia. Aust. V.

Desc. Culice sequente duplo major. Color cinereus. Alæ absque puncto. Antennæ minus plumosæ in mare. Rostrum prominens , ut in reliquis , ubi vagina apice bifurca , dilatata in duo foliola patula , lanceolata , villosa , intermedio rostro setaceo.

Nn ij

Pulicaris, 4. C.) le pygmée) alis hyalinis, maculis
tribus obscuris. *

Fl. lapp. 365.

Derh. phys.-th. l. I. c. II. f. 5, 6.

Fab. 4.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 579. n. 2.

Hab. in Europa. In America. Kalm.

Obs. Cur sitat, mordet, relinquit punctum
fuscum. *Amæn. acad.* 3. p. 343.

Desc. Corpus magnitudine minoris pulicis,
fuscum. *Alæ* angustæ albæ, incum-
bentes, margine exteriori tribus
punctis obscuris notatæ; hinc, clausis
alis & conniventibus punctis, fasciæ
tres transversæ fuscae in alis. *Faun.*
1892.

Reptans. 5. C. (le rampant) niger, alis hyalinis,
pedibus nigris annulo albo. *

Fab. 5.

Enum. n. 985.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 991.

*Hab. in Europa, reptatu molestus tem-
pore vespertino. In Gallia Aust. V.*

Desc. Minimus est, facie muscæ, magni-
tudine pulicis, vix lineam longus,
satis angustus. *Thorax* cinereo-cæru-
lescens. *Caput* nigrum. *Antennæ* fili-
formes, pallidæ. *Oculi* nigri. *Abdomen*
ovatum, fuscum. *Halteres* albi. *Pedes*
nigri, medio geniculo niveo. Pars
thoracis postica sæpe albicans. *Alæ*
hyalinæ incumbentes, ut unicum modo
alam spectes, sed posticæ parum dehif-
centes. *Faun.* 1893.

Equinus. 6. C. (des chevaux.) ater, abdomine
fusco, fronte alba. *

Fl. lapp. 359.

Fab. 7.

Hab. circum equos , quorum sanguinem haurit , inter crines eorum cursitans.

Desc. *Antennæ* filiformes & modus sanguinem hauriendi culicis , facies licet muscæ. *Caput* , *pedes* , *thorax* atra ; thoracis latera tamen cinerascunt ; supra & infra oculos regio alba est. Ovatus & minimus est. *Faun.* 1894.

Stercoreus. 7. C. (le stercoral) testaceus , alis reticulatis , linea thoracis tribusque abdominis nigricantibus.

Hab. in stercoreibus.

Ex spec. D. Fab.

Lutescens. 8. C. (le jaunâtre) flavis , alis hyalinis , costa flavescente.

Hab. in Daniæ paludosis.

Desc. Statura C. *bifurcati*. Totus flavus. Punctum fuscum haustellum terminat.

Morio. 9. C. (le morio) ater , alis albis , femoribus posticis clavatis , ferratis.

Hab. in Anglia.

Desc. Major C. *pulicari*. Totus ater , nitidus. *Antennæ* fasciculatæ. *Femora* antica basi pallida , postica elongata , clavata , ferrata.

Annulatus. 10. C. (l'annulaire) fuscus , abdomine pedibusque albo annulatis. C. 2. M.

Enum. n. 980. an ?

Hab. Hafniæ , in fenestris captus die XIII. Octobr.

Desc. Statura & magnitudo C. *pipientis*. *Rostrum* porrectum , longitudine dimidii corporis. *Caput* & *thorax* fusca , immaculata. *Abdomen* fuscum , segmentorum marginibus albis. Primum segmentum

linea dorsali alba. *Pedes* fusci, albo annulati. *Alæ* hyalinæ, maculis tribus aut quatuor fuscis.

Ex Faun. Fridr.

Fasciatus. 11. C. (le fascié) alis immaculatis, abdomine annulis 14 albis nigritque alternis.
Hab. in Europa.

Flavescens. 12. C. (le jaune) luteus, tomentosus, alis ciliatis, nervis subluteis.
Hab. in Europa.

Obs. 1. Tipulis affines culices, sed differunt rostro longo aculeis plurimis composito. Tipularum autem caput inerme. Contra culicum vesparum, apum, &c. vulnera alkali fluor remedium est. V.


Obs. 2. In aquis stagnantibus larvæ apodæ situ inverso. V.

Ex Enum.

Variegatus 13. C. (le varié) cinereus, pedibus albo nigroque variis.

Hab. in Europa.

Desc. Caput & halteres nigra. Antennæ simplices, pilis vix conspicuis verticillatæ. Thorax pilis ferrugineis brevibus. Pedes albo nigroque annulati. Abdomen cinereum. Alæ extrorsum versus marginem anteriorem ferruginescentes introrsum ciliatæ.



GENUS VI.

EMPIS. Os rostro corneo, inflexo, bivalvi;
thorace longiore, valvulis horizontalibus.

Borealis. 1. E. (la Boréale) antennis filatis nigra,
alis subrotundis fusco-ferrugineis.

Fab. 1.

De Geer tom. 6. *p.* 255. *n.* 2. *t.* 14.

f. 17.-19. nigra, alis maximis ovatis,
obscure fuscis, pedibus rufis nigrisque.

Hab. in Norlandia, choreas aereas circa
vesperas instituens. In Bressia. V.

Desc. Ore gaudet culicis longiusculo
nigro. *Corpus* nigrum. *Pedes* nigri,
femoribus ferrugineis. *Alæ* subrotundæ,
fuscae f. ferrugineæ, valde obtusæ.
Magnitudine alarum *M. domesticam*
superat; *corpus* tamen angustius est.
Faun. 1895.

Obs. *Alæ* maximæ. *Abdomen* cauda
bifida.

Pennipes. 2. E. (la plumipede) antennis filatis nigra,
pedibus posticis longis, alterius sexus
pennatis. * *t.* 10. *f.* 18, 19.

Scop. carn. 994. *asilus pennipes.*

Sulz. inf. t. 21. *f.* 137.

Fab. 2. nigra, pedibus posticis elongatis
pennatis.

Enum. n. 987.

Hab. in Europa, frequens in floribus
geranii sylvatici & cardamines pratensis.
Circa Lugdunum non rara. V.

Desc. *Musca domestica* dimidio fere minor.
Tota atra, abdomine non ovato, sed

Nn iv

admodum attenuato. *Pedes* pollicis admodum longi respectu animalis. *Alæ* nec fuscæ, nec cineræ, sed mediæ horum. *Faun.* 1896.

Variat magnitudine duplo majori.

Livida. 3. E. (la livide) antennis filatis livida, thorace lineis tribus nigris. *

Fab. 5. livida, thorace lineato, alis basi pedibusque ferrugineis.

De Geer tom. 6. p. 254. n. I. t. 14.

f. 14.-16. griseo-fusca, thorace lineis tribus longitudinalibus nigris, pedibus rufis, alis hyalinis.

Faun. Fridr. n. 777.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Corpus lividum. Thorax linea dorsali lateralibusque nigris. Abdomen supra magis fuscum. Alæ oblongæ, venis fuscis.

Desc. *Corpus* musca domestica majus, cinereum. Thorax lineis dorsalibus tribus nigris, parallelis. Abdomen cinereum, angustum. Alæ fuscescentes, basi subtestaceæ. *Pedes* lutescentes. *Faur.* 1897.

Obs. Empis nostra livida differt alis lutescentibus. V.

Forcipata. 4. E. (l'appendiculée) antennis filatis cinerea, alis oblongis, cauda appendiculata. *

Fab. 3. cinerea, alis oblongis, macula costali nigra, cauda appendiculata.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Corpus* cinereum, culice paullo majus. Oculi testaceo-lutei. Thorax cinereus f. plumbeus, pilis sparsis. Abdomen oblongum, magis cinereum. In cauda hæret forceps duplex carti-

lagineus, quarum prior f. exterior bivalvis apice bidentatus, interiore dente productiore; intra priorem forceps interior triplo longior, lanceolatus, gibbus, bivalvis. *Femora* antica livida. *Antennæ* subulatæ. *Alæ* hyalinæ longiusculæ. *Faun.* 1898.

Obs. In nostris *pedes omnes* lividi. V.

Stercorea. 5. E. (la stercorale) antennis filatis testacea, alis reticulatis, linea dorsali nigra.*
Fab. 8.

Enum. n. 986.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 995.

Hab. in Europa. In floribus umbellatis
Bressiæ sæpe legi. V.

Desc. Color M. *stercorariæ* lividus. *Antennæ* nigræ. Linea longitudinalis nigra per thoracem & abdomen excurrens. *Plantæ* fuscæ. *Alæ* lividæ, venis reticulatis obscurioribus. *Faun.* 1899.

Ex spec. D. Fab.

Maura. 6. E. (la Maure) nigra, tarsis anticis incrassato-ovatis.

Hab. Kiliæ, Hamburgi supra aquas stagnantes choreas innumeras instituens.

Desc. *haustellum* rectum vix inflexum, longitudine proboscidis. Vagina emarginata. *Antennæ* articulis inferioribus brevissimis, rotundatis, ultimo longiori setaceo. *Corpus* nigrum, immaculatum. *Pedes* nigri, tarsis anticis incrassatis, ovatis. *Alæ* albæ, costa dimidiata fusca. *Fæmina* pedibus simplicibus.

Maculata. 7. E. (la tachetée) cinerea, rostro, abdominis lateribus, pedibus, testaceis, alis maculatis.

Hab. in Italia. Dr. Allioni.

Desc. Statura omnino E. sequentis. *Caput* fuscum, rostro basi compresso, testaceo. *Thorax* cinereus, sublineatus. *Abdomen* cinereum, linea laterali testacea. *Alæ* albæ fusco maculatæ. *Pedes* testacei, ungulis nigris.

Cinerea. 8. E. (la pallipede) cinerea, thorace immaculato, pedibus pallidis, alis apice fuscescentibus.

Hab. in Sueciæ floribus umbellatis.

Desc. Statura E. *lividæ*, at triplo minor.

Ciliata. 9. E. (la ciliée) nigricans, alis costâ fusca, pedibus atris, posticis quatuor pennatis. E. 7. M.

Hab. in Europa.

Desc. Statura & magnitudo omnino E. *lividæ*. *Caput* parvum, nigrum, rostro testaceo. *Thorax* pilosus, nigricans, immaculatus. *Abdomen* conicum, nigrum, cinereo subpubescens. *Alæ* obscuræ, costâ fuscescente. *Pedes* atrî, femoribus tibiisque quatuor posticis utrinque ciliatis pennatis.

Marginata. 10. E. (la bordée) nigra, alis albis, marginibus nigris. M. 2.

Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.

Desc. *Corpus* parvum, nigrum. *Alæ* magnæ albæ, margine anteriori & postico late nigro.

Ex Enum.

Crassipes. 11. E. (la crassipede) nigra, tarforum omnium articulo longo crasso, alis albis, margine exteriori a medio ad apicem nigro.

Hab. in Europa, sed minima.

Ex Faun. Fridr.

Flava. 12. E. (la jaune) antennis filatis flava ,
linea dorsali abdominis nigra.

Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Lineata. 13. E. (la rayée) livida , thorace nigro
albido lineato. t. 10. f. 20.

Hab. in Europa.

*Desc. Antennæ nigricantes. Rostrum ,
pedes abdomenque livido - testacea.
Thorax supra nigricans , lineis duabus
albidis parallelis. Abdomen acutissimum.
Pedes postici longiores. Alæ magnæ ,
certa lucis incidentia , iridis coloribus
ornatæ.*

Nigra. 14. E. (la noire) nigra , femoribus pos-
ticis incrassatis.

Hab. in Europa.

*Desc. Parva. Oculi rubri. Antennæ nigrae.
Rostrum testaceum. Thorax & abdomen
nigra. Alæ magnæ diaphanæ , basi
ferrugineæ. Femora postica fusca ,
incrassata. Tibiæ testaceæ.*

Aurata. 15. E. (la dorée) nigra , femoribus
pennatis.

Hab. in Europa. In Pressiæ umbraticis.

*Desc. Ita similis E. pennipedi , ut , magni-
tudine excepta , una pro altera facile
sumeretur. Omnium nostratum emp.
maxima. Tota nigra. Femora postica
& intermedia pilis fuscis densis ciliata.
Tibiæ minus ciliatæ. Pedes postici
multo longiores ; cilia radiis solaribus
illuminata , aurato-rufa. Alæ in uno*

sexu abdomine duplo longiores, flavescentes.

Obs. Affinis *E. ciliatæ*. *D. Fab.*

Acephala. 16. *E.* (l'acéphale) capite inclinato, thorace gibbo nigro, maculis quatuor luteis, abdomine nigro luteo fasciato.
t. 10. f. 21.

Hab. in Gallia. Circa Lugdunum rarissima.

Desc. Singulare animal & forsan genus proprium. In floribus sedens, caput adeo inclinatum est, ut omnino sit invisibile. *Thorax* niger admodum gibbosus, flavedine cinctus, sed flavedo lateralis vix conspicua, nisi antice & postice. *Abdomen* latum, crassum, breve, nigrum, fasciis quatuor luteis, in medio interruptis, lateraliter cum flavedine incisuræ sequentis unitis. Ex singula fascia exsurgit dens flavus; *subtus* flavum, punctis nigris. *Pedes* rufi. *Alæ* fuliginoso-flavescentes.

Flavipes. 17. *E.* (la flavipede) nigra, pedibus flavis.

Scop. asilus 995?

Hab. in Europa.

Desc. Minima. *Tota* atra. *Alæ* albæ amplæ. *Pedes* testaceo-flavi.

Obs. Variat femoribus nigris.

Ex Entom. D. Scop.

Mucrona- 18. *E.* (la pointue) abdomine basi attenuato, postice ovato, apice mucronato, femoribus & tibiis ferrugineis.
Asilus 987.

Hab. in Europa.

Desc. *Abdominis* portio ovalis, *subtus* plana est, supra convexa. *Thorax* dorso

lineis tribus fuscis longitudinaliter striatus. Sexus alter mucrone abdominis caret.

Punctata, 19. E. (la ponctuée) abdomine antico ad latera piloso, thorace, lateribus scutelloque setosis. *Afilus* 988.

Hab. in Europa. Super plantas & arbores non rara.

Desc. *Antennæ* notabiliter divaricatæ. *Thorax* lineis tribus dorsalibus obscurioribus, quarum media duas series pilorum continet, laterales autem tres. *Abdomen* villosum, sed magis antice ad latera. *Alæ* costæ fusca. *Halteres* ferruginei. *Femora* sanguinea, genubus fuscis. *Tibiæ* ferrugineæ.

Ferruginea, 20. E. (la ferrugineuse) thorace & abdomine linea longitudinali fusca. *Afilus* 989.

Hab. in Europa.

Desc. Minor. *Oculi* brunnei. *Antennæ* fusca. *Thorax* præter lineam dorsalem, puncto quoque fusco laterali utrinque notatus. *Abdomen* alia linea fusca in singulo latere. *Alæ* hyalinæ, venis fuscis, puncto marginali fuscescente.

Setosa, 21. E. (la foyeuse) thorace fusco-cinereo, abdomine pedibusque ferrugineis, setulis in nucha, dorso, scutello & marginibus segmentorum abdominis. *Afilus* 991.

Hab. in Europa.

Desc. *Scutellum* ferrugineum, setulis quatuor. *Abdomen* villosum. *Palmae pedum* nigrae.

Cinerea, 22. E. (la cendrée) thorace cum abdomine

cinereo, alis apice fuscescentibus; femoribus tibiisque ferrugineis. *Afilus* 992.

Hab. in Europa.

Desc. *Thorax* duabus lineis fuscis in dorso. *Halteres* ferruginei. *Alæ* basi ferruginæ, linea fusca marginali. *Abdomen*, ut etiam *thorax*, villosum, basibus pilorum, lente observatus, totidem puncta referentibus. *Palmae* nigrae.

Æstiva. 23. E. (la caniculaire) cinerascens, thorace lineis pedibusque nigris *Afilus* 993.

Hab. in Europa. *Æstate* occurrit inter frutices.

Desc. *Dorsum thoracis* lineis quatuor nigris. *Halteres* albidii. *Alæ* pulchræ, hyalinæ, linea nigra marginali. *Abdomen* maris apice mucronatum. *Pedes* toti nigri.

Fulcrata. 24. E. (la printaniere) thorace antice, alis basi pedibusque ferrugineis, femoribus mediis crassis. *Afilus* 996.

Hab. in Europa, majo M. in foliis arborum.

Desc. *Antennæ* fuscæ. *Thorax* postice fuscus. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ, venis ferrugineis. *Genua* media spina nigra terminata. *Abdomen* lingulo segmento pari uno punctorum & macula nigra lucida depressa.

Dubia. 25. E. (l'incertaine) nigra, halteribus ferrugineis, pedibus posticis longioribus crassioribusque. *Afilus* 997.

Hab. in Europæ ceraso & quercu, nuptias initura aprili & majo M.

Desc. *Antennæ* triarticulatæ, articulo

medio minore rotundo, ultimo unguiculato ut in tabanis plerisque. *Oculi* contigui. Tuberculum in occipite. *Thorax* subrotundus villosus. *Halteres* pallide ferruginei. *Alæ* hyalinæ, leniter fuscescentes. *Abdominis* segmento singulo punctis quatuor impressis. *Pedes* nigri. *Femora* postica compressa, crassiora, compressa.

Obs. 1. Genere dubium animal. *Rostrum* unisetum breve, vagina bivalvi, valva inferiore apice dilatata, obtusa, basi attenuata, superiore connivente, acuminata. *Palpi* e basi rostri nati; potuerunt tamen aliæ duæ rostri setulæ, ob summam forte parvitatem, meos oculos meaque vitra effugisse, hic aliis notis cum asilo consentiens dipterum, hoc loco posui, donec novis observationibus de rostri fabrica genuina certior factus fuero.

Obs. 2. An omnes *Scop.* asili ad empes *Linn.* referendi? Dubium nascitur ex eo quod asilus *lineatus Scop.* a *D. Schrank* inter asilos *Syst.* ordinatus fuerit, quodque asilus *æstivus entom.* Carn. forte verus asilus sit. V.



GENUS VII.

CONOPS. Os rostro porrecto, geniculato.

† Rostrata. 1. C. (le porte-cône) antennis setariis nigra, abdomine ovato flavo lævi, rostro conico.

Fab. Rhingia. 1.

De Geer tom. 6. p. 129. n. 19. t. 7. f. 21. 22. musca antennis setariis tomentosa, abdomine ovato, brevi flavo, thorace nigro, capite rostrato conico.

Reaum. inf. 4. t. 16. f. 10, 11.

Enum. n. 989.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 996.

Hab. in Germania. P. Forskæl. In Gallia Aust. Prope Lugdunum V.

Statura muscæ domesticæ. Rostrum corneum, porrectum, conicum, capite longius, versus basin reliquis omnibus multo crassius. Tibiæ flavescences, Alæ pallidæ.

Calcitrans. 2. C. (le féroce) antennis subplumatis cinerea glabra ovata. *

Scop. carn. 1001. empis calcitrans.

Sulz. inf. t. 21. f. 138.

Geoff. paris. 2. p. 539. t. 18. f. 2. stomoxys 1.

Fab. stomoxys 4. antennis subplumatis grisea, pedibus atris.

De Geer tom. 6. p. 78. n. 11. t. 4. f. 12.-18. musca antennis plumatis, pilosa griseo-cinerea nigro maculata, rostro longo corneo porrecto.

Faun.

Faun. Fridr. n. 779.

Enum. n. 990.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 997.

Hab. ad Boum pedes, unde eorum continuus calcitratus. Amœn. acad. 3. p. 343. intrando domos pedesque ibi pungens praesugit tempestatem pluviosam.

Simillima muscæ domesticæ, ut vix distinguatur ab inexercitatis, nisi solo rostro subulato simplici acuto.

Abdominis segmenta punctis s. maculis 2 nigris.

Irritans. 3. C. (le méchant) antennis setariis cinerea subpilosa ovata. *

Fab. stomoxys 5. cinerea subpilosa, abdomine nigro maculato.

Hab. cum pecoribus, quorum dorso copiose insidet, ut con inuo sint in motu cauda verberando, pedibus calcitrando, ne copiosius pasti boves indigestis pereant.

In Gallia Aust. V.

Simillimus præcedenti, sed dimidio minor.

Vesicularis. 4. C. (le vésiculeux) antennis clavatis mucronatis subferrugineis subconnexis, occipite vesiculari, abdomine glauco-flavescente. *

Fab. C. 1. nigricans, occipite vesiculari, abdomine flavescente basi nigro.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 472. asilus 13. antennis capite longioribus clavatis, acuminatis, nigro rufoque variis, glaber, segmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fuscis margine albo.

Hab. in Europa.

Desc. Similis C. macrocephalæ. Facies flava. Occiput vesica pellucida. Thorax

Insect. Tomus III.

〇〇

niger, antice verrucis & lateribus ferrugineus. *Scutellum* ferrugineum. *Alæ* fulcæ, dimidiato albæ. *Halteres* flavi. Abdominis segmenta flava, sed prima basi fusca. *Pedes* ferruginei. *Abdomen* subcylindricum, obtusum, basi incurvum. *Faun.* 1903.

- Macrocephala. 5. C. (le macrocéphale) antennis clavatis mucronatis luteis, abdomine subcylindrico glabro, segmentis quatuor margine flavescentibus. *
- Uddm. diff.* 100.
- Geoff. paris.* 2. p. 491. asilus 12.
- Fab. C.* 4. nigra, abdomine segmentis quatuor margine flavis, antennis pedibusque rufis.
- De Geer tom.* 6. p. 263. n. 3. rufus, antennis pedibusque ferrugineis, abdomine fasciis fuscis flavisque, alis fusco maculatis.
- Reaum. ins. tom.* 4. t. 33. f. 12, 13.
- Hab. in Europa.* In Gallia Aust. Circa Lugdunum. V.
- Simillima M. *conopsoidi*, sed *antennæ* basi distinctæ.
- Desc.* Facies inflata, flava. *Antennæ* quasi lanceolatae, ferrugineæ. *Alæ* fuscæ ustulatae. *Thorax* rufus, dorso medio nigro. *Abdomen* cylindricum, incurvum, fuscum, segmentis margine flavis, imprimis primoribus. *Halteres* albidii. *Varietas* thorace toto nigro antennisque nigris. *Faun.* 1902.

Aculeata. 6. C. (le piquant) antennis clavatis setariis nigricans, abdominis incisuris scutello thoracisque punctis duobus anticis flavis. *

Fab. C. 2.

De Geer tom. 6. p. 261. n. 1. t. 15.

f. 1.-4. fasciata, nigra, antennis nigris, abdomine fasciis quatuor transversis apiceque flavis, pedibus rufis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo M. domesticæ. Antennæ clavatæ, setariæ, nigræ. Facies inflata flava. Thorax niger, antice utrinque puncto prominulo flavo; lineola flava transversa ante alas. Scutellum flavum. Abdomen ovatum, nigrum, margine luteo inæquali sinuato colore, subtus flavum lineola fusca. Pedes lutei, plantis nigris. Aculeus in fæmina niger, incurvus, inflexus. Faun. 1906

Obs. Variat scutello nigro punctoque flavo utrinque sub scutello.

Flavipes. 7. C. (le flavipede) antennis clavatis mucronatis nigris, abdomine subcylindrico glabro, segmentis tribus margine flavis.*

Fab. C. 5.

Hab. in Europa.

Desc. Simillima M. conopsoidi, nigra. Antennæ nigræ. Thorax ater, puncto flavo utrinque ante & pone alas. Scutellum puncto flavo. Halteres ferruginei. Abdomen clavatum nigrum, postice canescens, punctis 2 luteis ad basin, segmentis 2, 3, 4 marginibus flavis. Pedes flavi (nec, ut præcedentis ferruginei) fasciis nigris. Faun. 1904.

Obs. Pedes flavi, fasciis nigris.

Ferruginea. 8. C. (le ferrugineux) antennis setariis ferruginea, abdomine cylindrico, fronte lutescente.

Fab. myopa 1.

Scop. carn. 1004. ficus ferrugineus.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 473. n. 14.

afilus antennis capite brevioribus clavatis, setosis, nigro rufoque varius, glaber, alis nigris, oris aculeo in medio incurvato.

Faun. Fridr. n. 780.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura C. flavipedis. Corpus totum ferrugineum. Thorax dorso fuscus. Abdomen cylindricum. Frons flava. Faun. 1907.

Petiolata. 9. C. (le pétiolé) antennis clavatis nigris clava rubra, capite flavo abdomine petiolato. † t. 10. f. 22.

Hab. in Sibiria. Er. Laxman. In Bressia. V.

Antennæ basi geniculatæ. Rostrum nigrum. Truncus abdominis niger. Ad angulum anteriorem thoracis macula albo-rufescens. Pedunculus teres, tenuis, ruber. Abdomen apice rotundatum albumque. Alæ fuscae, margine tenuiore apiceque hyalinae. Pedes rufescentes. Halterum clavae flavae.

Atomaria. 10. C. (le pointillé) antennis setariis, abdomine ovato grisea, alis fuscis albo confertissime punctatis.

Hab. in Europa.

Corpus griseum. Abdomen ovatum. Alæ ovales, rotundatae, punctis tamquam atomis albidis punctatae; ad marginem crassiores puncta 3 majora alba.

Testacea. 11. C. (le testacée) antennis setariis, abdomine subovato hamoso, facie vesiculari alba, alis hyalinis.

Scop. carn. 1004. fuscus ferrugineus.

Schæff. elem. t. 120. stomoxoides.

Fab. myopa 2. ferruginea, thoracis dorso nigro.

Hab. in Europa Australi. Ascanius. In Gallia Aust. V.

Corpus ferrugineum. Abdomen non cylindricum, inflexum. Alæ hyalinæ venis ferrugineis. Statura C. buccatæ.

*Buccata. 12. C. (l'enflé) antennis fetariis, abdomine hamoso griseo, facie vesiculari alba, alis nebulosis. **

Scop. carn. 1005. sicut buccatus.

Fab. myopa 5.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Media. Caput pallidum, subtus album, inflatum, pellucidum. Oculi nigri. Antennæ approximatae, flavæ, extimo articulo glabro, obtuso cum arista. Alæ pallidæ, fasciis obsolete fuscis. Abdomen oblongum, cylindricum, lividum, apice admodum incurvatum. Halteres flavi. Pedes lividi. Faun. 1905.

Obs. Nostra specimina tomentosa, alis puncto fusco. V.

Subcoleop-13. C. (le déguisé) antennis fetariis, abdomine subferrugineo, alis præmorsæ externe crassioribus.

Fab. Syrph. 12. antennis fetariis tomentosus, abdomine ferrugineo, dorso nigro, alis crassioribus.

Schæff. icon. t. 71. f. 6.

Hab. Upsaliæ. Carol. Christiernin, p. m. juvenis.

Refert insectum coleoptratum. Antennæ fetariæ, uti caput, thorax, pedes muscæ domesticæ. Abdomen magis rotundatum, ferrugineum apice nigro. Alæ erectæ, abdomine vix longiores, quasi præmorsæ, latissimæ, crassiores quam

in aliis , quasi ustulatae ex fusco & albo ; unde peregrina facies.

Ex oper. D. de Geer.

- 3-Fasciata. 14. *C.* (le trifascié) nigra , antennis nigris , abdomine fasciis tribus transversis flavis , pedibus flavis nigrisque , alis margine fuscis. *t.* 10. *f.* 23.

Schæff. icon. t. 104. f. 3.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. C. aculeatae similis. *Thorax* , *abdomen* , *antennae* rostrumque aterrima. *Caput* antice flavum. *Thorax* quatuor punctis elevatis flavis. *Abdomen* fasciis flavis tribus. *Ultimae* duae incisurae nigrae.

Obs. An species ? An *C. aculeatae* varietas. *V.*

- Nigra. 15. *C.* (le noir) nigra , fronte flava , antennis pedibusque ferrugineis , abdomine antice petiolato , alis dimidiato fuscis. *tom.* 6. *p.* 265. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 9.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus ichneumonis. *Thorax* , *abdomen* rostrumque nitido nigra. *Alae* dimidiato fuscae albæque. *Pars* media exterior fusca. *Halteres* rufi. *Pedes* rufi , *femoribus* basi nigris.

Ex spec. D. Fab.

- Rufipes. 16. *C.* (le rufipede) atra , abdomine basi ferrugineoque segmentorum marginibus albis , pedibus ferrugineis. *Con.* 3.

Hab. in Germania. D. de Hattorf.

Desc. Statura *C. aculeatae*. *Frons* flava , antennis fuscis. *Thorax* ater , immaculatus antice utrinque prominet. *Hal-*

teres flavi. Abdomen clavatum, basi ferrugineum, apice nigrum, segmentorum marginibus albis. Pedes ferruginei. Alæ costâ fusca.

Siberita. 17. C. (le demi-transparent) antennis plummatis grisea pilosa, abdominis lateribus pallido-diaphanis. *Stomoxys* 3.

Hab. Hafniæ.

Desc. Caput griseum, orbita oculorum nivea. Thorax & scutellum pilosa, grisea, immaculata. Abdomen conicum, griseum, lateribus diaphanis. Pedes nigri, femoribus pallidis.

Atra. 18. C. (le charbonnier) abdomine cylindrico incurvo, corpore atro. *Myopa* 3.

Hab. in Daniæ nemoribus. In Bressia. V.

Desc. C. ferruginea minor. Antennæ, setariæ, nigrae, fascia flavescens. Frons flavescens, lateribus albis. Pedes nigri, femoribus posticis flavescens.

Lineata. 19. C. (le rayé) thorace lineato, abdomine nigro, maculis lateralibus flavis. *Rhingia* 2. M.

Hab. Hafniæ. D. Lund.

Desc. Statura omnino muscæ, at labium elongatum, corneum proboscidi involvens, flavum, apice emarginatum, nigrum. Antennæ breves clavatae, nigrae, clava ferruginea seta nigra. Abdomen nigrum. Thorax niger, lineis quatuor albis scutelloque testaceo. Abdomen nigrum, utrinque maculis tribus ultimoque segmento flavis. Alæ albidæ. Pedes flavi, femoribus cingulo albo.

Pungens. 20. C. (le méchant) cinereus, femoribus nigris. *Stomoxys* 6. M.

Hab. in Europa, pecorum dorso inhians.
Dr. Heisse.

Desc. Statura omnino *C. irritantis*, at triplo minor. *Corpus* totum parum pilosum, obscure cinereum, alis albidis, immaculatis.

Obs. Variat interdum abdomine obscuriore.

Ex Faun. Fridr.

Hexagona. 21. *C.* (l'exagone) antennis filatis, oculis fascia cærulea, abdomine nigro sexangulari, subtus luteo.

Hab. in Europæ pratis.

Ex Entom. Carn.

Palustris. 22. *C.* (des marais) antennis setariis, articulo ultimo nigro, abdomine subovato cinereo-rufo, femoribus ferrugineis.

Hab. in Europa, circa palludes Majo. M.

Desc. Cinerea, sed cum aliquo rufo immixto colore, pilosa. *Abdomen* segmentis margine fetosis.

Ex nost. Mus.

Punctata. 23. *C.* (le ponctué) capite inflato niveo, nigro punctato, femoribus incrassatis.
t. 10. f. 24.

Hab. in Europa. In Gallia, prope Massiliam.

Desc. *C. buccata* paullo major. *Caput* triangulare, inflatum, niveum, nigro punctatum. *Rosstrum* corpore longius. *Abdomen* rufescens griseo marmoratum, lateraliter tomentosum, apice incurvum. *Pedes omnes* hirsuti, *femoribus* omnibus incrassatis.

Lutea. 24. C. (le jaune) antennis filatis , abdomine pedibusque luteis. t. 10. f. 25.

Hab. in Europa. In Gallia , in montibus Cebennis.

Desc. Antennæ nigræ filatæ , basi separatæ. Occiput vesiculosum. Puncta duo lutea elevata ab basin thoracis qui nigro - fuscus. Abdomen , scutellum pedesque lutea. Alæ albæ fere flavescences.

Sericea. 25. C. (le soyeux) antennis filatis , abdomine postice sericeo albo. t. 10. f. 26.

Hab. in Europa. In Gallia , circa Nemausum.

Desc. Affinis præcedenti. Antennæ filatæ rubræ , apice nigræ. Rostrum medio rufum , basi & apice nigrum. Thorax niger , punctis duobus albis elevatis ad basin , duabus aliis sub alis. Scutellum albidum. Alæ dimidiato flavæ. Abdomen annulis albis nigrisque alternis. Ultima segmenta albido sericea ; ultimum nigrum ; subtus nigrum. Pedes testacei. Tarsi nigri.

Cinerea. 26. C. (le cendré) antennis setariis , corpore cinereo , pedibus rufescentibus. t. 10. f. 27.

Hab. in Europa. In Gallia , in Bressia.

Desc. Parva. Caput inflatum album. Thorax abdomenque cinerea. Alæ albæ. Pedes pallide rufescentes. Abdomen apice incurvatum.



GENUS VIII.

ASILUS. Os rostro corneo, porrecto, recto bivalvi.

Algirus. 1. A. (l'Algérien) corpore toto ferrugineo.

Fab. 3.

Hab. in Barbaria. E. Brander. In Gallia Australiore. V.

Corpus magnitudine crabronis, totum ferrugineum, subpilosum pilis pallidis, non tomentosum. Oculi nigri. Alæ hyalinae, reticulatae. Abdominis incisuræ margine lucidiores s. magis ferrugineæ; cæterum abdomen subcylindricum, postice magis attenuatum, nudum.

Barbarus. 2. A. (l'Africain) fronte, thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis apice margineque tenuiore nigris. t. 10. f. 28.

Fab. 4.

Hab. in Mauritania. E. Brander. Prope Massiliam rarior. V.

Major congeneribus. Squamula alba ad latera thoracis. Frons ciliata. Femora & tibiæ spinis sparsis tenuissimis.

Obs. Barba rufa. Rostrum nigrum. Abdomen fericeo-aterrimum. Femora posteriora nigra; media nigricantia, antica rufa ut tibiæ & tarfi omnes. V.

Crabroni- 3. A. (le frélon) abdomine tomentoso formis. antice segmentis tribus nigris postice flavo inflexo. *

Asili capiunt insecta diptera iisque visitant.

Raj. inf. 267.

Frisch. inf. 3. t. 8.

Mouff. inf. t. 46.

Jonst. inf. t. 10. f. 2.

Reaum. inf. 4. t. 8. f. 3.

Geoff. paris. tom. 2. p. 468. n. 3. t. 17. f. 3.

Scop. carn. 974. *erax crabroniformis*.

Fab. 5.

Schæff. elem. t. 13.

— *icon.* t. 8. f. 15.

De Geer tom. 6. p. 244. n. 7. t. 14.

f. 3, 4. *subhirsutus*, *antennis fetigeris*, *abdomine antice nigro*, *postice flavo-fulvo*.

Enum. n. 992.

Pod. gr. p. 119.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1002.

Hab. *intra terram larva*.

Desc. *Facies crabronis*. *Thorax magnus*, *gibbus*. *Rostrum nigrum*, *subulatum*.

Alæ, *pedes*, *venter subtus ferruginea*.

Abdominis tres articuli primores nigri;

proxime insequentes flavi. *Anus seu*

cauda ipsa rufa. *Alæ ad marginem*

tenuiorem nigro maculatæ. *Faun.* 1909.

Gibbosus. 4. A. (*le bossu*) *hirsutus niger*, *abdomine postice albo*. *

It. Scanic. 414.

Fab. 7.

De Geer tom. 6. p. 238. n. 1. t. 13.

f. 6.-8. *asilus bombylius hirsutus niger*,

antennis muticis, *abdomine postice*

albido-griseo, *capite villis griseis*.

Lin. Flor. lapp. p. 360. *æstrum bovinum*, *cauda alba*.

Schæff. icon. t. 8. f. 11.

Faun. Fridr. n. 783.

Hab. *in Europa*. *In Gallia*, *in montibus Cebennis*. V.

Desc. Magnitudo præcedentis. *crabronem* ipsum superat. *Totus* oblongus, niger & hirsutus est. *Frons* pallescit. *Alæ* griseæ. Segmenta *abdominis* tria ultima alba. *Anus* ipse corneus, niger, ungulæ caprinæ instar latus; cauda simplex & abdomen dilutius flavum alteri sexui. *Faun.* 1909.

Obs. Caput hirsutie densa alba.

Ater. 5. A. (le noir) hirsutus totus niger, barba albida. *

Scop. carn. 973. erax prostratus.

Fab. 10.

Pod. gr. p. 119.

Enum. n. 993.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1003.

Geoff. tom. 2. p. 469. n. 5. totus niger subhirsutus, alis atris.

Faun. Fridr. n. 784.

Hab. in Germania Bergh. Isacson.

Similis præcedenti, sed brevior, totus hirsutus. Barba sub capite & ungulæ albæ. Antennæ subclavatæ. Sedens pectori incumbit expansis pedibus S.

Flavus. 6. A. (le jaune) niger hirsutus, thorace postice flavo, abdomine supra fulvo, plantis ferrugineis. *

It. Gotl. 327.

Fab. 12. hirsutus niger, thorace postice cinereo, abdomine hirsuto flavo.

De Geer tom. 6. n. 3. t. 13. f. 10. antennis muticis hirsutus niger, thorace villis albidis, abdomine ovato, villis flavo-rufis splendentibus.

Hab. in Europa. In Delphinatu. In Burgundiæ comitatu, in loco vulgo Epy.

Schæff. icon. t. 51. f. 2. male.

Desc. Magnus est. In cauda quasi ungula

caprina, intra quam varii aculei innocui. *Faun.* 1911.

Obs. Marem decripsisse videtur *D. de Geer*.
In utroque sexu *antennæ* filatæ nigræ.
Rostrum nigrum. *Caput* depressum, in
mare minus, pilis albidis, in *fæmina*
rufis. *Femora* hirsuta nigra, pilis
rufescentibus. *Tibiæ omnes* rufæ, pilis
rufis: *posteriores* incurvatæ. *Tarsi* rufi,
in quibusdam nigris. *Alæ* flavescentes.
Mas multo minor. V.

Gilvus. 7. A. (le roux) abdomine pubescente
nigro, supra rufo. *

Geoff. parif. 2. p. 468. n. 4.

Fab. 14. niger, abdomine supra fulvo.

De Geer tom. 6. p. 241. n. 4. t. 13.

f. 15? *antennis* muticis hirsutus niger,
alis nigricantibus, abdomine supra
villis rufis splendentibus.

Schæff. icon. t. 78. f. 6?

Scop. n. 977. *erax* ferox?

Enum. n. 991?

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1004?

Hab. in Europa.

Desc. *Totus* ater, parum hirsutus. *Area*
magna a tergo abdominis rufa. *Alæ*
fuscæ. *Faun.* 1912.

Obs. *Linn. entom. carn.* non citavit.
Erax igitur *ferox* synonymus *asili gilvi*
non judicatus fuit, & revera *erax*
ferox *D. Scop.* *femoribus* crassius valde
& pilosis *tibiisque* posticis arcuatis
semper gaudet, quod non observatur
in *asilo gilvo*. Insuper *abdomen* in hoc
glabrum, in illo in utroque sexu tomen-
tosum; denique *pedes* multo longiores
in *asilo gilvo*. Synonymiam auctorum
retuli propter omnium fere Entomolo-
gorum consensum; sed species omnino

diversæ mihi videntur. Adde quod
Linnæus a *D. Scop.* non fuit citatus. V.

Marginatus. 8. A. (le bordé) halteribus abdominisque
incisuris flavis , femoribus nigris. *

Fab. 16.

De Géer tom. 6. p. 242. n. 5. t. 14. f. 1.
antennis muticis subhirsutus niger,
alis fuscis , halteribus flavis , abdo-
minis incisuris villoso-flavescentibus.

Schæff. elem. t. 23. f. 1.

Hab. in Europa. *T. Bergman.* In Gallia
Aust. V.

Abdomen nigrum , pilis fulvis tomen-
tosum : imprimis ad incisuras. Thorax
niger.

Obs. Noster multo minor imagine *D. Schæff.*

Teutonus. 9. A. (le chevalier) niger , thorace fugaci-
aureo maculato , abdomine utrinque
maculis quinque albis.

Fab. 27.

Enum. n. 994.

Schæff. icon. t. 8. f. 13.

Hab. in Germania *D. Schreber.* In Gallia,
in Bressia. V.

Corpus medium. Antennæ luteæ. Frons
flava. Thorax niger varie maculis
villosis , certo respectu auricoloribus.
Abdomen glabrum , nigrum , segmentis
singulis margine laterali albis. Pedes
ferruginei , geniculis & plantis nigris.

Germani- 10. A. (l'Allemand) hirtus subcinereus ,
cus. femoribus nigris , tibiis rubris , alis
fuscis basi albis.

Fab. 19.

Schæff. icon. t. 48. f. 9 , 10.

Hab. in Germania. *P. Forskal , Bergh.*
Isacson. In Gallia Aust. V.

Sequenti similis, etiam antennis, sed duplo major.

Obs. 1. Vix asilo forcipato distinctus. Cauda etiam forcipata. V.

Obs. 2. Major A forcipato. Corpus nigrum, immaculatum. Tibiæ omnes rufæ. Cauda forcipata. *Fab.*

Forcipatus. II. A. (le menaçant) hirtus subcinereus, lateribus flavis. *

Frisch. inf. 3. p. 35. t. 17.

Geoff. parif. 2. p. 473. n. 16.

Scop. carn. 975. erax forcipatus.

Fab. 18. hirtus cinereus, ano pedibusque nigris.

De Geer tom. 6. p. 246. t. 14. f. 5.-9. antennis setigeris subhirsutus griseo-fusco-nigricans, thorace fascia longitudinali nigra, pedibus fuscis, abdomine elongato cylindrico.

Enum. n. 997.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1005.

Faun. Fridr. n. 782.

Hab. intra terram Europæ, in Java triplo major.

Obs. Muscarum prædo, nec attellabo apiario, cantharidibus aliisque mollioribus insectis coleoptratis parcit. *Enum.*

Desc. Magnitudo M. domesticæ. Corpus cinereum, subpilosum. Abdomen cylindricum. Alæ hyalinæ. Halteres flavi. Pedes nigri. Maris cauda forcipata, forcipe quadridentata, dentibus duobus superioribus majoribus. Fæmina acuta. Varietas major tibiis ferrugineis. *Syst. Faun. 1914.*

Tipuloides. 12. A. (le tipuloïde) cinereus nudus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris. *

Geoff. parif. tom. 2. p. 474. n. 17.

Fab. 26. cinereus nudus, pedibus ferrugineis, plantis nigris.

Faun. Fridr. n. 785.

Scop. carn. 990.

Enum. n. 999.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1005.

Hab. in Europa.

Desc. Magnitudo *muscæ*. *Abdomen* & *femora* longa s. livida. *Thorax* lividus, a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris. *Oculi* grisei. *Rostrum* nigrum, sub pectore inflexum, longitudine thoracis. *Alæ* hyalinæ. *Antennæ* nigrae. *Pedes* flavescentes. *Faun.* 1915.

Ælandicus. 13. A. (le cylindrique) ater nudus, alis nigris, pedibus halteribusque ferrugineis. *

It. Æland. 155.

Geoff. parif. 2. p. 470. n. 8. An. n. 9. Varietas. V.

Fab. 31.

De Geer tom. 6. p. 249. n. 10. t. 14. f. 13. antennis setigeris, cylindricus glaber niger, abdomine elongato cylindrico, apice clavato, pedibus flavis, alis corpore brevioribus.

Faun. Fridr. n. 787.

Enum. n. 995.

Hab. in Europa.

Desc. Totus glaber. *Abdomen* clavatum, atrum nitidum. *Caput* & *thorax* atra. *Pedes* ferruginei, plantis nigris. *Halteres* ferruginei. *Alæ* angustæ, nigrae. *Faun.* 1916.

Obs. Variat alis nigris & hyalinis & interdum pedibus nigris. *Fab.*

Morio. 14. A. (le morio) hirtus niger, alis albo nigroque variis. *

Enum.

Enum. n. 1001.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1006.

Hab. Upsaliæ, usque in Cap. B. Spei.
In Gallia Aust. V.

Desc. Simillimus *M. morioni*. Conneſtit
afilos & bombylios. *Thorax* niger,
lateribus pilis lutescentibus vestitus.
Alæ corpore longiores, atro alboque
variegatæ, præſertim verſus marginem
tenuiorem. *Abdomen* ovatum, nigrum,
medio ſalcia fere alba. *Pedes* nigro-
ferruginei. *Antennæ* articulis tribus,
extimo ſubulato. *Roſtrum* apice lan-
ceolatum. *Faun.* 1917.

Lufitani- 15. A. (le Portugais) nigricans, alis albo
cus. maculatis, abdomine flavo trifariam
nigro maculato.

Hab. in Italia.

Corpus magnitudine & ſtatura muſcæ
vulgaris. *Roſtrum* breviffimum, obtu-
ruſum, nigrum. *Alæ* fuſcæ, albo plu-
rimum maculatæ. *Caput* & *thorax* nigra,
pubeſcentia. *Abdomen* luteum, ſub-
conicum, depreſſiuſculum, ſegmento
ſingulo in medio & lateribus margine
macula nigra tranſverſa.

Ex entom. Carn. D. Scop.

Barbatus. 16. A. (le barbu) erax fuſco - cinereus ;
barba alba, alis puncto fuſco, apice
fuſceſcentibus.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Aſilo forcipato ſimilis, ſed rarior.
Cauda forcipata, antennæ femoraque
ſpinofa ut in priore. Diverſus barba
alba, fronte pilioſiore, roſtri apice
ruſo, thorace linea equidem dorſali
obſcuriore, ſed abſque maculis fuſcis,

abdomine punctorum nigricantium seriebus tribus, *halteribus* capitulo fusco, pedibus fusco-ferrugineis, alis puncto medio fusco & apice fuscescente.

Obs. An *afilus forcipati* varietas? V.

Ferox. 17. A. (le féroce) *erax* niger, thorace postice rufis villis tomentoso, femoribus crassis, tibiis posticis curvis.

Hab. in Europa. In Galliæ pinetis. V.

Obs. 1. Licet hic *afilus* pro *afilus gilvo* in enumeratione proponatur, species tamen propria mihi videtur, ut ex *D. Scop.* descriptione patebit. V.

Desc. *Frons* pilis rufis barbata. In *A. gilvo* argentea *antennæ* adscendentes, clavatae, obtusæ, muticæ nigræ; in *gilvo* rufæ. Dorsum in medio fere glabrum, postice tomentosum, pilis rufis aut fulvis. *Halteres* fulvi. *Alæ* incumbentes, fuscescentes, basi excolore. *Abdomen* supra antice glabriusculum, postice & lateraliter hirsutum, cylindraceum. In *gilvo* nudum. *Femora* omnia crassa & pilosa. *Tibiæ* postice arcuatae, in *gilvo*. *Pedes* elongati, *femora* non incrassata, *tibiæ* posteriores rectæ. *Abdomen* terminatum laminis tribus, apice rotundatis, subovatis, nigris, quibus laminis caret *A. gilvus*. *Sexus unus* major, tomento fulvo abdominali, inter lamellas posticas fovens setam, acuminatam. Parvis lamellis binis munitam; *alter* tomento rufo & inter lamellas caudales corpore molli albido ciliato, cui utrinque adjacet corpus aliud fulcatum bicornè, cornu inferiore basi dente notato.

Obs. 2. *Afilus gilvus* s. *afilus*. *D. Geoff.* n. 4. A. *feroce* major; *pedes* longiores sunt tarforumque globuli diversi. V.

Conopsoi- 18. A. (le conopsoïde) niger hirsutus ,
des. abdomine ovato , supra fulvo-tomen-
toso , femoribus posticis clavatis , tibiis
omnibus cinerascens villo externe
barbatis.

Hab. in Europa.

Desc. Septem fere lineas longus. *Halteres*
albidi. *Abdomen* inflexum , ovatum.
Alæ neque fuscæ , neque maculatæ.
Diversissimus a *crubroniformi* & *gilvo*
celeb. *Linn.* qui fuscas alas habet.

Tenthredo- 19. A. (le tenthredoïde) niger , glaber ;
des. antennis , alis costæ , femoribus tibiis-
que ferrugineis.

Hab. in Europa. In Galliæ Aust. pinetis. V.

Desc. *Frons* pallide flavescens. *Thorax*
linea laterali maculisque lateralibus
aureo nitore fulgidis , quarum una etiam
utrinque distinguit segmenta abdominis.
Similium punctorum par sub scutello ,
nec non duo inter bases pedum me-
diorum & anticorum. *Halteres* ferru-
ginei. *Abdomen* cylindricum convexum ,
subtus concavum , glabrum. *Palmæ*
nigræ.

Obs. *Mas* unicolor s. *Totus* niger , inde
tenthredini *bicinctæ* eo similior. *Antennæ*
filatæ muticæ. V.

Rufipes, 20. A. (le rufipede) niger totus , fronte
barbata , antennis pedibusque ferru-
gineis.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* articulus ultimus in setam
continuatus. *Dorsum* & *abdomen* absque
maculis. *Halteres* ferruginei. *Pedes* toti
ferruginei. *Alæ* excolores , apice paullo
obscuriores , nervis fuscis.

Obs. Sub eodem nomine triviali asilum

diversum descripsit *D. de Geer*, sed in hoc antennæ muticæ sunt, in illo apice setigeræ. V.

Niger. 21. A. (le noir) fronte, halteribus abdominisque incisuris margine aureis.

Hab. in Europæ floribus. *Ibid.* In Gallia Aust. V.

Desc. *Antennæ* clavatæ, muticæ. Aureus nitor frontis & marginis lateralis segmentorum abdominis in alio oculi situ fere evanescit. *Abdomen* semicylindricum. *Oculi* fusco-virescentes. *Alæ* subviolaceæ, basi excolores.

Obs. Nec est *afilus niger D. de Geer*, cujus antennæ apice sunt setigeræ.

Aquaticus. 22. A. (l'aquatique) niger, halteribus abdominisque incisuris margine albis.

Hab. in Europa.

Desc. Quatuor lineas longus, totus niger. *Halteres* albi, capitulo compresso. *Alæ* hyalinæ, sine maculis. *Abdomen* semicylindricum.

Puillus. 23. A. (le Pygmée) nigricans, thorace cinerascens, lineis nigris, halteribus albis.

Hab. in Europa.

Desc. *Corpus* lineas tres longum. *Alæ* immaculatæ, hyalinæ, venis fuscis, linea marginali nigra. *Abdominis* incisuræ margine albidæ.

Maculatus. 24. A. (le tacheté) oculis subviridibus, thorace fusco, lineis pallidioribus, abdomine ferrugineo, linea laterali maculisque dorsalibus nigris.

Hab. in Europæ sylvis & ericetis, non rarus.

Desc. *Antennæ* articulus ultimus subrotundus, setula nigra terminatus. *Oculi* fusco-virides. *Pedus*, cui pedes inferuntur, cinereum. *Alæ*, linea marginali ferruginea, venis fuscis, patentibus. *Femora* ferruginea. *Tibiæ* ferrugineæ, apice fuscæ. *Palmae* fuscæ. *Mas* segmentis, abdominis 2, 3, 4, 5, macula nigra tetragona, ceteris ubique nigris, margine ferrugineo. *Fæmina* maculis segmentorum abdominis prædictorum conicis contiguis, subtus vero tetragonis.

Inquinatus. 25. A. (le taché) alis hyalinis, apice venisque fuscis, linea costali nigra.

Hab. in pratis Europæ.

Desc. *Antennæ*, *abdomen*, *pedesque* ferruginei. *Thorax* cinereus, lineis fuscis. *Abdomen* maculis trigonis dorsalibus. *Alæ* apice fuscescentes, sub quo in medio est punctum fuscum transversum, supra basin transversa serpentina linea decurrit. Variat staturâ majore, nempe alis lineas 5 longis.

Rufus. 26. A. (le roux) totus rufus, thorace lineis dorsalibus fuscis tribus longitudinalibus, abdominis dorso punctis 4 nigris.

Hab. in Europa.

Desc. Non debet confundi cum A. *maculato*, a quo pluribus notis differt, præsertim vero alis absque linea fusca marginali, iisdemque ad costam rufis, oculisque viridibus.

Ex oper. D. de Geer.

Dorsalis. 27. A. (le dorsal) hirsutus niger, antennis.

muticis, thorace postice villis viridiflavus. *tom. 6. t. 13. f. 9.*

Fab. 6. hirsutus ater, thorace basi albo.

Hab. in Germania. D. de Hattorf. Fab. In montibus Cebennis. V.

Desc. A. gibbosi longitudine. Antennæ muticæ, nigræ. Barba griseo-nigricans. Thorax antice niger, postice pilis albidis, vel viridi-flavis dense vestitus. Hirsuties alarum basin tegit. Abdomen longum, pilis rufis lateralibus imprimis ad marginem segmentorum. Alæ in uno sexu abdomine longiores, in altero paullo breviores. Pedes hirsuti, fere ut in afilo flavo, sed hirsutia nigricans. V.

Rufipes. 28. A. (le rufipede) niger glaber, antennis muticis, fronte alba, halteribus flavis, pedibus quatuor anticis fulvis. *tom. 6. t. 8. f. 14.*

Schæff. icon. t. 8. f. 14.

Hab. in Europa. In Gallia frequens. V.

Desc. Ichneumoniformis. Frons alba. Antennæ, caput, thorax, abdomenque nitido-nigra. Alæ flavescences, nervis nigris. Abdomen elongatum fere cylindricum. Pedes quatuor primores rufi, posteriores nigri.

Obs. A. ælandico affinis, sed antennæ simplices. V.

Niger. 29. A. (le noir) subhirsutus niger, antennis setigeris, tibiis halteribusque rufis. *tom. 6. t. 14. f. 12.*

Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.

Desc. Statura faciesque A. forcipati, sed paullo major. Niger. Alæ flavescences. Femora nigra. Tibiæ rufæ. Tarforum articuli rufescences, unguibus nigris.

Ex spec. D. Fab.

Diadema. 30. *A.* (le diadème) ater , alis nigris , fronte alba.

Enum. n. 998.

Hab. in Europa. In Italia. *Dr. Allioni.*
Prope Lugdunum in arvis. V.

Desc. Statura omnino *A. atri* , a quo tamen differt fronte sub antennis alba , barba vero nigra alisque totis , imprimis tamen versus marginem crassiolem , nigris.

Obs. Nimium Affinis *A. atro* , sed minor. V.

Violaceus. 31. *A.* (le violet) hirsutus ater , abdomine violaceo.

Hab. in Germania. *D. de Hattorf.* In Bressia rarior. V.

Desc. Corpus totum pilis erectis rigidis hirtum , atrum. *Abdomen* ovatum , violaceum , nitidum. *Alæ* fuscae.

Obs. Præcedenti minor , sed latior. *Halteres* fusci. *Pedes* hirsutissimi. *Abdomen* depressum , latum , apice acuminatum. V.

Punctatus. 32. *A.* (le ponctué) hirtus , thorace cinereo pubescente , abdomine atro , punctis tribus marginalibus albis maculisque dorsalibus rufis.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Magnitudo & statura *A. gilvi*. *Caput* fronte barbaque cinereis. *Antennæ* nigrae. *Thorax* niger , dorso pube cinerascens. *Abdomen* atrum , segmento 4 , 5 , macula dorsali fulva. *Puncta* tria alba utrinque in margine. *Pedes* atri. *Alæ* fusco-ferrugineae.

Obs. Adeo similis *A. gilvo entom. parif.* ut vix distinguatur ab *A. n. 4. inf. parif. D. Geoff.* attamen hic pro asilo *gilvo* indicatus fuit. *Frons* barbaque alba. *Antennæ* muticæ, basi rufæ, antice nigræ. *Thorax* pilis rigidis. *Abdomen* punctis albis lateralibus tribus quatuorve. *Pedes omnes nigri. Alæ* flavicantes. Inter majores numerandus. V.

Cingulatus. 33. *A. (l'entouré) cinereus, tibiis rufis nigro annulatis.*

Hab. in Italia. Dr. Allioni. In Gallia Aust. V.

Desc. Corpus minus *A. forcipato*, cinereum, immaculatum. *Pedes nigri, femoribus rufis, annulis duobus nigris.*

Cinctus. 34. *A. (le cerclé) cinereus, abdomine atro, segmentorum marginibus albis.*

Hab. in Germania. D. de Hattorf. In Bressia. V.

Desc. Parvus. Caput & thorax obscure cinerea, halteribus flavis. *Abdomen* atrum, nitidum, segmentorum marginibus albis. *Pedes nigri.*

Obs. Variat rarius pedibus rufescentibus. V.

Culiciformis. 35. *A. (le culiciforme) ater glaber, femoribus posticis longitudine abdominis.*

Hab. in Anglia.

Desc. Parvus, statura conopis. Rostrum bivalve hujus generis. *Antennæ* breves, seta porrecta. *Alacmen* subcylindricum, compressum, incurvum. *Alæ* magnæ, hyalinæ, halteribus flavis. *Femora* postica porrecta, longitudine abdominis, subtus subtilissime serrata.

Linearis. 36. A. (le rayé) ater, thoracis dorso cinereo, atro lineato, abdomine lineari, segmentorum marginibus flavis.
A. 38. M.

Hab. in Daniæ insulis. Dr. Pflug.

Desc. Parvus. Caput atrum, labio tomento argenteo, nitidulo recto. *Thorax* ater, nitidus, dorso cinereo, lineis quatuor atris, lateralibus abbreviatis. *Abdomen* elongatum, lineare, atrum, nitidum, segmentorum marginibus flavis. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ, halteribus flavis. *Pedes* flavi.

Ex inf. parif. Entom.que parif.

Tarfusus. 37. A. (les tarfes noirs) niger glaber, femoribus tibiisque rufis, alarum puncto marginali nigro.

Hab. in Europa.

Desc. Niger glaber, *alæ* albæ, puncto marginali nigro. *Pedes* fulvi, tarsis nigris, articulo primo cæterorum longitudinem æquante.

Obs. Affinis A. *alandico*, sed diversus, ut patet ex descriptione. V.

Fulvus. 38. A. (le fauve) hirsutus ferrugineus, alis fulvis, femoribus nigris.

Hab. in Europa.

Desc. Major. *Antennæ* apice setigeræ. *Thorax* lineatus, aliquoties absque lineis. *Abdomen* vellere tomentoso flavicante tectum, apice acutum. *Pedes* spinosissimi fusco-testacei, *femoribus* nigris. V.

Undulatus. 39. A. (l'ondulé) niger hirsutus, tibiis halteribusque ferrugineis, alis nigro undulatis.

Hab. in Europæ pratis frequens.

Desc. Niger hirsutus. *Thorax*, certo situ, pilis auratis lineis quatuor itidem auratis longitudinalibus. *Alæ* nigro undulatae. *Halteres* flavi. *Pedes* rufescentes, *femoribus* nigris tarsisque nigricantibus.

Marmora- 40. A. (le marbré) niger glaber, antennis, *femoribus*, *halteribus* tibiisque secundi & postici paris rufis, alis fusco-undulatis.

Hab. in Europa. Captus prope Fontem-bellaqueum.

Desc. Niger. *Antennæ* muticæ fulvæ. *Thorax* linea longitudinali maculaque sericeo-luteis. *Alæ* fusco undulatae. *Halteres* fulvi. *Pedes* quatuor postici fulvi. Affinis præcedenti. V.

Ex Enum.

Podagiri- 41. A. (le goutteux) niger, thorace flavo, nigro lineato, pedibus pallidis, tarforum posticorum articulo primo incrassato.

Hab. in Europa. In sylva Dorabucensi.

Desc. Niger, nitidus. *Frons* inter oculos argentea. *Thorax* flavus, lineis longitudinalibus adproximatis punctisque ad earum latera totidem nigris nitentibus. *Abdomen* nigrum nitidum, segmentis apice maculisque utrinque tribus ad concursum segmentorum positis ferrugineis. *Alæ* hyalinæ, venis nigris. *Pedes* ferruginei, ad partem anticam tam in tibiis, quam *femoribus* linea nigra notati. *Halteres* ferruginei. Characterem singularem constituunt tarsi postici, quorum articulus primus longior (& id quidem in ceteris quoque

tarsis obtinet, non quod sequitur)
incrassatus.

Ex Faun. Fridr.

Maculatus. 42. A. (le trimaculé) alis trimaculatis ,
abdomine flavo , ultimo segmento maculifque nigris.
Hab. in Europa.

Medius. 43. A. (le moyen) hirsutus subcinereus ,
alis fuscis , pedibus nigris.
Hab. in Europa.

Ignavus. 44. A. (le paresseux) alis immaculatis ,
abdomine flavo , tribus posticis segmentis nigris.
Hab. in Europa.

Ex nost. Mus.

Viridescens. 45. A. (le verdâtre) niger , abdomine
vellere virescente obtecto.
Hab. in Europa. In montibus Gebennis.
Desc. Omnes latitudine superat , sed quibusdam longitudine cedit. *Caput* parvum nigrum. *Antennæ* muticæ nigræ. *Thorax* ater vellere griseo , fusco albidoque *Abdomen* nigrum , tomento viridescente tectum , in medio nigredinem non occultante. *Subtus* nigrum nudum. *Femora* hirsutissima. *Tibiæ* posticæ incurvatae. *Alæ* fusco-diaphanæ , venis fuscescentibus.

Fascicula- 46. A. (le fasciculé) niger , tomento luteo
tus. tectus , basi antennarum fasciculis duobus albis.
Hab. in Europa. In montibus Gebennis.
Desc. Minor niger , sed luteus adparet.

Thorax gibbus. *Caput* postice tomentosum. *Antennæ* nigræ, basi fasciculis f. penicellis duobus albiſſimis. *Abdomen* nigrum, tomento luteo tectum, duodecim punctis nigris longitudinaliter digestis, inæqualibus, majoribus prope basin. *Halterum* clava lutea. *Alæ* breves fuscescentes. *Subtus* tomentum albidum. *Pedes* quatuor anteriores albedo-cinerei, tarsis nigris.

Flavipes. 47. A. (le flavipede) niger, abdomine rubello fasciato, pedibus flavis.

Schæff. icon. t. 17. f. 7.

Hab. in Europæ floribus.

Desc. Niger. *Antennæ* nigræ muticæ. *Thorax* niger, lineis duabus nigris adproximatis. *Abdomen* fere cylindricum, segmentorum marginibus rubellis. *Alæ* albæ immaculatæ. *Pedes omnes* pallide flavi.

Bombylius. 48. A. (le bombyle) niger, hirsutus bombylifomis.

Hab. in Europa. Prope Massiliam rarior.

Desc. facies staturaque bombylii. Niger. *Rostrum & antennæ* hujus generis. *Totus* pilosus. *Abdomen* nigrum, pilosis fasciculis lateralibus obtectum. *Alæ* albæ, basi fuscescentes. *Pedes* tenues, nigri.

Fuscipes. 49. A. (le fuscipede) niger, pedibus fuscis, femoribus posticis incrassatis.

Hab. in Europa. In sylvis prope Nemaufum.

Desc. Medius. *Antennæ* nigræ muticæ. *Caput, thoraxque* nigra. *Alæ* immaculatæ. *Abdomen* nigrum, maculis quinque lateralibus auratis. *Pedes* fusco-castanei. *Femora* postica incrassata.

GENUS IX.

BOMBYLIUS. Os rostro porrecto , fetaceo , longissimo , bivalvi , valvulis horizontalibus intra quas aculei fetacei.

Major. 1. B. (le grand) alis dimidiato-nigris. *

Scop. carn. 1018.

Mouff. inf. 64. f. 5.

Aldr. inf. t. 350. f. 10.

Raj. inf. 273.

Hoeffn. inf. t. 8. f. 1.

Geoff. parif. 466. asilus 1.

Fab. 1.

De Geer tom. 6. p. 268. t. 15. f. 10, 11.
niger , villis griseis , alis dimidiato
fuscis & hyalinis.

Schæff. elem. t. 27. f. 1.

—— *icon.* t. 79. f. 5.

Enum. n. 1002.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1007.

Faun. Fridr. n. 790.

Hab. in Europa mel florum volitando
hauriens.

Desc. Rostrum longum , semper exsertum.
Alæ dimidium longitudinaliter fuscum ,
quod scilicet margini crassiori adjacet ;
album , quod teneriori proximum. Totum
corpus nigrum , sed hirsutiae & lana
albida undique vestitum. Apis bombylii
instar , unde facies exsurgit singularis.
Faun. 1918.

Obs. 1. Cl. *Scopoli* hoc insectum non
novit , aliudque hoc nomine insignivit.
Majori errore synonymista , quo usus
est celeb. *Linnaeus* , *Plinium Carnioli-*
cum ad insectum praesens laudavit. *Enum.*

Obs. 2. Nomen triviale a magnitudine sumtum, infelix; nam in Gallia Aust. bombylii medii hoc majores sæpe reperiuntur. V.

Medius. 2. B. (le moyen) alis fusco punctatis, corpore flavescente postice albo. *

Scop. carn. 1019.

Pet. gaz. t. 36. f. 5.

Fab. 3.

De Geer tom. 6. p. 269. n. 2. t. 15. f. 12. niger, villis fulvis, alis fusco punctatis.

Enum. n. 1003.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1019.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Circa Lugdunum. V.

Desc. Corpus vix præcedente minus, differt vero alis antice s. ad marginem crassiorem fuscis, sed tota pagina adpersis punctis fuscis. *Faun.* 1919.

Obs. Schæff. *elem.* t. 27. citaverunt DD. de Geer & Fab. Linnæus contra ad præcedentem retulit. Revera bombylius ibi pictus alis punctatis caret. Variat magnitudine. V.

Minor. 3. B. (le petit) alis immaculatis. *

It. scan. 164.

Scop. carn. 1020.

Pet. gaz. t. 42. f. 9.

Réaum. ins. 4. t. 8. f. 11.-13.

Fab. 5.

Enum. n. 1004.

Scop. 1018. rufo villo tomentosus, alis hyalinis immaculatis, basi fuscis.

Scop. 1020. testibus DD. Linn. Fab. que.

Totus subrufa lana testus, unicolor, alis immaculatis, hyalinis.

Schæff. icon. t. 46. f. 9.

Hab. in Europa. In Gallia Aust. Circa Lugdunum. V.

Desc. Præcedentibus triplo minor. *Alæ* hyalinæ, antice versus basin obsolete fuscescentes. *Faun.* 1920.

Obs. 1. Ex definitionibus *D. Scop.* constat bombylium n. 1018. esse *B. minorem Syst.* nam *alæ* sunt hyalinæ, immaculatæ, basi fusæ. Quid sentiendum: mox patebit. V.

Ater. 4. *B.* (le noir) alis basi seminigris ater, abdomine albo maculato.

Schæff. icon. t. 79. f. 6.

Scop. carn. 1021. bombylius ater.

Fab. 6.

Enum. n. 1006.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1008.

Hab. in Germania. In Gallia Aust. Prope Lugdunum. V.

Frons pilosa. Antennæ cylindricæ. Caput puncto parvo niveo utrinque ante oculos. Thorax pilosus, ater, immaculatus. Abdomen marginibus hirsutis; dorso minus piloso atro, puncto niveo majori utrinque ad basin & altero ad apicem; in medio puncta 4 minora, longitudinaliter digesta. Pedes nigri. J. C. Fab.

Ex spec. D. Fab.

Fuscus. 5. *B.* (le brun) ater, immaculatus, alis fuscis.

Hab. in Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

Desc. Immaculatus. *Alæ* basi atræ, apice fusæ.

Obs. Statura *B. majoris.* Totus niger, vellere nigro. *Alæ* apice aliquando fere hyalinæ. V.

Minimus. 6. B. (le nain) alis basi fuscescentibus corpore flavescente hirtus, rostro pedibusque nigris. B. 6. M.

Hab. in Germania.

Desc. Corpus B. minori duplo minus, totum pilis densis flavescens hirtum.

Rostrum; antennæ, pedes nigricantes.

Alæ albidæ, apice parum fuscescentes.

Obs. Sub eodem nomine alius describetur infra. An species diversa? V.

Griseus. 7. B. (le gris) hirtus, alis albis basi fuscis, thorace nigro albo lineato, abdomine griseo.

Hab. in Hispaniæ floribus compositis.

D. Vahl.

Desc. Statura omnino B. sequentis. Corpus pilis griseis, at minus densis hirtum.

Thorax niger, lineis duabus dorsalibus

albis. Alæ albæ, basi ad marginem crassiorem fuscæ punctisque duobus in medio nigris.

Virescens. 8. B. (le verdâtre) alis albis immaculatis, corpore hirtus virescente, rostro abbreviato. B. 12. M.

Hab. in Hispaniæ floribus. D. Vahl.

Desc. Rostrum breve, vix longitudine capitis. Corpus totum pilis densis virescentibus tectum.

Verficolor. 9. B. (le verficolor) alis albis hirtus cinerascens, capite, pedibus atris M. 14.

Hab. in Barbariæ floribus compositis D. Vahl. In Gallia Australiori. V.

Desc. Reliquis duplo minor, pilis erectis sparsis tectus. Rostrum porrectum atrum.

Thorax cinerascens immaculatus. Alæ

albæ, immaculatæ. Abdomen subrotundum, cinerascens, maris macula magna

magna dorsali ferruginea , *famina*
immaculatum.

Ex Enum.

- Minimus. 10. B. (le pygmée) alis fuscescentibus ;
corpore fulvescente , frontis villo nigro.
An verus bombylius *minor* Linn. ?
Hab. in Europa. In Gallia Aust. V.
Desc. *Rostrum* , frontis villus & subtus
totus niger. *Alæ* subfuliginosæ. Supra
insectum subfulvum est.
Obs. An bomb. *minimo*. *D. Fab.* species
distincta. V.

Ex nost. Mus.

- Fulvipes. 11. B. (le fulvipe) alis flavescens ;
rostro pedibusque fulvis.
Hab. in Europa.
Desc. B. *majori* minor , *minori* major.
Rostrum fulvum : *Caput* vellere albido
antice tectum. *Corpus totum* vellere
albo lanuginatum. *Alæ* modo albæ ,
modo flavescens. *Pedes* testaceo-fulvi.
Uterque sexus similis. V.
Obs. Variat bombylius major magnitu-
dine. Variat B. *ater* maculis argenteis
sex loco punctorum niveorum. Variat
B. *minor* magnitudine forsanne alis
basi fuscis. V.

- Nudus. 12. B. (le nu) niger , capite barbato ,
corpore nudo.
Hab. in Europa. Prope Massiliam captus.
Desc. Omnium minimus. *Totus* ater lu-
cidus. *Caput* barbatum. *Thorax* , *abdo-*
menque nullo vellere obtecta. *Alæ*
albæ , basi costaque flavescens , corpore
longiores. *Pedes* tenues , testacei ;
posteriores elongati.

GENUS X.

HIPPOBOSCA. Os rostro bivalvi, cylindrico, obtuso, nutante.

Pedes unguibus pluribus.

Equina. 1. H. (des chevaux) alis obtusis, thorace albo variegato, pedibus tetradactylis. *

Scop. carn. 1022.

Mouff. inf. 59.

Frisch. inf. 5. t. 20?

Reaum. inf. 6. t. 48.

Sulz. inf. t. 21. f. 141.

Geoff. paris. 2. p. 547. n. 1. t. 547.

Fab. 1.

De Geer tom. 6. p. 275. n. 1. t. 16. f. 1.-20. fusca, alis magnis fuscis, unguibus simplicibus.

Schæff. icon. t. 179. f. 8, 9.

Poda gr. t. 120.

Enum. n. 1007.

Faun. Fridr. n. 791.

Hab. in Europa & America Septentrionali, equis & bobus infesta, vitæ tenacissima, pupipara.

Desc. Notissima ubique est, tota glabra, grisea, tenacissima, capite privata, vivit adhuc diu. *Pedes posteriores* longiores sunt. *Faun.* 1921.

Avicularia. 2. H. (des oiseaux) alis obtusis, thorace unicolore. *

Fab. 2.

Hippoboscæ ovatum facile matre majus, potius pupa excludenda in volatilis.

*De Geer tom. 6. p. 285. n. 2. t. 16.
f. 21.-27. viridis, alis magnis hyālinis,
unguibus appendiculatis.*

*Hab. in Avibus. D. C. Solander. In Gallia
Aust. V.*

*Desc. Præcedente dimidio minor. Alæ
corpore sesquolongiores, lateribus atris.
Faun. 1922.*

Hirundinis. 3. H. (des hirondelles) alis subulatis,
hexadactylis.

Scop. carn. 1023.

Reaum. inf. 4. t. 11. f. 1.-5.

*Geoff. parif. 2. p. 547. H. pedibus hexa-
dactylis, alis divaricatis.*

Fab. 3.

Schæff. elem. t. 70. f. 1.

— icon. t. 53. f. 1, 2.

Hab. in hirundinibus.

*Desc. Præcedenti minor. Abdomen postice
emarginatum. Alæ angustæ, in tergo
abdominis spatio remotæ. Pedes singuli
sex unguibus. Faun. 1923.*

Ovina. 4. H. (des brebis) alis nullis.

It. Wgoth. 59.

Frisch. inf. 5. t. 18.

Fab. 4.

Enum. n. 1008.

Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1010.

Faun. Fridr. n. 729.

Hab inter ovium lanam. In Gallia Aust. V.

*Corpus testaceum. Rostrum filiforme,
lingua setacea, exserenda. Pedes hirti.
Ungues gemini duplicati. Abdomen dis-
tentum, pallidum, obtusum, utrinque
linea undulata geminata albida; macula
rubra in medio dorfi.*

Corvi. 5. H. (du corbeau) femoribus viridibus ;
unguibus nigris , longis quatuor.

Hab. in corvo corace.

Desc. Statura H. *equinæ* , sed diversissima ,
Tibiis non fasciatis , *oculis* minus nitidis
& castaneis , occipite non tubere albido
trigono , sed tuberculis tribus conti-
guis , scutello *thoracis* non albo , sed
concolore , ore non albo , *alarum* costa
imberbi , *abdomine* non toto villoso ,
corpore rufescente.

Scop. 1024.

Obs. Hanc hippoboscam solus *D. Scop.*
memoravit , sed negative descripsit ;
species igitur non facile determina-
tur, V.

Finis Tomi III.



INSECTA NEUROPTERA.

Fig. 1.

Libellula 4-Maculata.
Demoiselle, la Françoisse.

Fig. 3.

Ephemera, Maculata.
Ephémère, la Tachetée.

Fig. 5.

Phryganea, Variegata.
Frigane, la bigarrée.

Fig. 7.

Hemerobius, Fulvicephalus.
Hémérobe, le Fulvicephale.

Fig. 9.

Myrmeleon, Libelluloides.
Murméléon, Libelluloïde.

Fig. 11.

Panorpa, Tipularia.
Mouche-scorpion, la Tipule.

Fig. 13.

Raphidia, Mantissa.
La Raphidie-Mante.

Fig. 2.

Libellula, Virgo.
Demoiselle, la Louise.

Fig. 4.

Phryganea, Bicaudata.
Frigane, la Double-queue.

Fig. 4.

Hemerobius, Phalanoides.
Hémérobe, le Phalénoïde.

Fig. 8.

Hemerobius, Raphidioides.
Hémérobe, le Raphidioïde.

Fig. 10.

Myrmeleon, Occitanicum.
Murméléon, le Languedocien.

Fig. 12.

Raphidia, Ophiopsis.
La Raphidie.

INSECTA HYMENOPTERA, Tab.

Fig. 14.

Cynips, Potentilla.
Cynips, de la Potentille.

Fig. 16.

Tenthredo, Furcata.
Mouche à scie, la fourchue.

Fig. 18.

Tenthredo, Pini-minor.
Mouche à scie, la petite.

Fig. 20.

Tenthredo, Septentrionalis.
Mouche à scie, la Septentrionale.

Fig. 22.

Sirex, Dromedarius.
Urocère, le Dromadaire.

Fig. 15.

Tenthredo, Am.
Mouche à scie, la

Fig. 17.

Tenthredo furcata f.
Mouche à scie, la four

Fig. 19.

Tenthredo, Rust.
Mouche à scie, la

Fig. 21.

Tenthredo, Inan.
Mouche à scie, la Dia

Fig. 23.

Sirex, Reflexus.
Urocère, le Réfléchi.

Fig. 1.




INSECTA HYMENOPTERA, Tab. VIII.

<p>Fig. 1. <i>Ichneumon, Ferrugineus.</i> Ichneumon, le Rouillé.</p>	<p>Fig. 2. <i>Ichneumon, Atratorius.</i> Ichneumon, le Noir.</p>	<p>Fig. 3. <i>Ichneumon, Corculatorius.</i> Ichneumon, le Porte-cœur.</p>	<p>Fig. 4. <i>Ichneumon, Falsator.</i> Ichneumon, le Déguisé.</p>	<p>Fig. 5. <i>Ichneumon, Lingulator.</i> Ichneumon, la Spatule.</p>
<p>Fig. 6. <i>Ichneumon, Terrefactor.</i> Ichneumon, le Formidable.</p>	<p>Fig. 7. <i>Ichneumon, Torquatus.</i> Ichneumon, le Cordé.</p>	<p>Fig. 8. <i>Ichneumon, Longicornis.</i> Ichneumon, le Longicorne.</p>	<p>Fig. 9. <i>Ichneumon, Apterus.</i> Ichneumon, l'Aptère.</p>	<p>Fig. 10. <i>Ichneumon, Bicolor.</i> Ichneumon, le Tranché.</p>
<p>Fig. 11. <i>Sphex, 4-Fasciata.</i> Sphex, le Quadrifascié.</p>	<p>Fig. 12. <i>Sphex, Clypeata.</i> Sphex, le Bouclier.</p>	<p>Fig. 13 & 14. <i>Sphex, Flavifrons.</i> Sphex, l'Îtérique.</p>	<p>Fig. 15. <i>Sphex, Monstrosa.</i> Sphex, le Monstrueux.</p>	<p>Fig. 16. <i>Chrysis, Punctatissima.</i> Guèpe-dorée, le Pointillé.</p>
<p>Fig. 17. <i>Leucopsis, Dorsifera.</i> Leucopse, le Crocheteur.</p>	<p>Fig. 18. <i>Leucopsis, Gallica.</i> Leucopse, le François.</p>	<p>Fig. 19. <i>Vespa, Tricuspadata.</i> Guèpe, la Trompeuse.</p>	<p>Fig. 20. <i>Vespa, Histrion.</i> Guèpe, l'Arlequine.</p>	<p>Fig. 21. <i>Vespa, Nigricornis.</i> Guèpe, la Nigricorne.</p>
<p>Fig. 22. <i>Vespa, Ciliata.</i> Guèpe, la Ciliée.</p>	<p>Fig. 23. <i>Apis, Bicornis.</i> Abeille, le Diable.</p>	<p>Fig. 24. <i>Apis, Lucifera.</i> Abeille, le Deuil.</p>	<p>Fig. 25. <i>Apis, Cærulea.</i> Abeille, la Bleue.</p>	<p>Fig. 26. <i>Apis, Lunulata.</i> Abeille, la Turque.</p>
<p>Fig. 27. <i>Apis, Bicolor.</i> Abeille, la Bicolor. N^o. 121.</p>	<p>Fig. 28. <i>Apis, Frontalis.</i> Abeille, la Frontale.</p>	<p>Fig. 29. <i>Apis, Brachiptera.</i> Abeille, la Brachiptère.</p>	<p>Fig. 30. <i>Apis, Argillacea.</i> Abeille, l'Architecte. N^o. 123.</p>	<p>Fig. 31. <i>Formica, Flavipes.</i> Fourmi, la Flavipède.</p>
<p>Fig. 32. <i>Formica, Pubescens.</i> Fourmi, la Velue.</p>	<p>Fig. 33. <i>Mutilla Argentata.</i> Mutille Argentée. N^o. 8.</p>	<p>Fig. 34. <i>Mutilla, Calva.</i> Ichneumon-Aptère, la Chauve.</p>	<p>Fig. 35. <i>Mutilla Europæa, mas.</i> Mutille Européenne, mâle.</p>	<p>Fig. 36. <i>Mutilla Europæa, femina.</i> Mutille Européenne, femelle.</p>



* *mutilla europæa femina*





INSECTA DIPTERA, Tab. IX.

<p>Fig. 1. <i>Oestrus</i>, <i>Lineatus</i>. L'Oestre, le Rayé.</p>	<p>Fig. 2. <i>Tipula</i>, <i>Crocata</i>. Tipule, la Saffranée.</p>	<p>Fig. 3. <i>Tipula</i>, <i>Crocata</i>. Tipule, Saffranée. <i>D. Schrank</i>, <i>Geoff. que.</i></p>	<p>Fig. 4. <i>Tipula</i>, <i>Transversalis</i>. Tipule, la Transversale.</p>	<p>Fig. 5. <i>Tipula</i>, 6-Punctata. Tipula, la 6-Ponctué.</p>
<p>Fig. 6. <i>Tipula</i>, <i>Forcipata</i>. Tipule, la Prolongée.</p>	<p>Fig. 7. <i>Tipula Marci</i>, <i>Fulvipes</i>. Tipule de S. Marc, à cuisses rouffes.</p>	<p>Fig. 8. <i>Musca</i>, <i>Conopsoidea</i>. Mouche, la Conopsoïde.</p>	<p>Fig. 9. <i>Musca</i>, <i>Ferruginea</i>. Mouche, la Rouillée.</p>	<p>Fig. 10. <i>Musca</i>, <i>Ænea</i>. Mouche, la Sèmi-bronzée. N^o. 35.</p>
<p>Fig. 11. <i>Musca</i>, <i>Hirsuta</i>. Mouche, la Velue.</p>	<p>Fig. 12. <i>Musca</i>, <i>Tuberculata</i>. Mouche, la Tuberculée.</p>	<p>Fig. 13. <i>Musca</i>, <i>Ciliata</i>. Mouche, la Ciliée.</p>	<p>Fig. 14. <i>Musca</i>, <i>Bidentata</i>. Mouche, la Bidentée. N^o. 65.</p>	<p>Fig. 15. <i>Musca</i>, <i>Bombylans</i>. Mouche, la Grondeuse.</p>
<p>Fig. 16. <i>Musca</i>, <i>Lunula</i>. Mouche, la Lunaire.</p>	<p>Fig. 17. <i>Musca</i>, <i>Ichneumonea</i>. Mouche, l'Ichneumon.</p>	<p>Fig. 18. <i>Musca</i>, <i>Ruficornis</i>. Mouche, la Ruficorne.</p>	<p>Fig. 19. <i>Musca</i>, <i>Lugubris</i>. Mouche, la Lugubre.</p>	<p>Fig. 20. <i>Musca</i>, <i>Murina</i>. Mouche, la Souris.</p>
<p>Fig. 21. <i>Musca</i>, <i>Crassipes</i>. Mouche, la Crassipède.</p>	<p>Fig. 22. <i>Musca</i>, <i>Cruentata</i>. Mouche, l'Ensanglantée.</p>	<p>Fig. 23. <i>Musca</i>, <i>Semi-luctifera</i>. Mouche, le Demi-deuil.</p>	<p>Fig. 24. <i>Musca</i>, <i>Viridescens</i>. Mouche, la Verdâtre.</p>	<p>Fig. 25. <i>Musca</i>, <i>Speculifera</i>. Mouche, Porte-miroir.</p>
<p>Fig. 26. <i>Musca</i>, <i>Cærulescens</i>. Mouche, la Bleuâtre.</p>	<p>Fig. 27. <i>Musca</i>, <i>Elegans</i>. Mouche, l'Elégante.</p>	<p>Fig. 28. <i>Musca</i>, <i>Pellucens</i>. Mouche, la Transparente.</p>	<p>Fig. 29. <i>Musca</i>, <i>Fumigata</i>. Mouche, l'Enfumée.</p>	<p>Fig. 30. <i>Musca</i>, <i>Zonaria</i>. Mouche, la Cerclée.</p>

Fig. 1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



18.



17.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.




29.



30.








INSECTA DIPTERA, Tab. X.

Fig. 1. <i>Musca, Petronella.</i> Mouche, la Courtifane.	Fig. 2. <i>Musca, Capitata.</i> Mouche, la Grosse-tête.	Fig. 3. <i>Musca, Seminationis.</i> Mouche, la pointillée.	Fig. 4. <i>Musca, Lineata.</i> Mouche, l'Ictérique.	Fig. 5. <i>Musca, Globulipes.</i> Mouche, l'Estropiée.
Fig. 6. <i>Musca, Lamed.</i> Mouche, le Lamed.	Fig. 7. <i>Musca, Cribrata.</i> Mouche, la Criblée.	Fig. 8. <i>Musca, Hemorroidalis.</i> Mouche, L'hémorrhoidale.	Fig. 9. <i>Musca, Viridescens.</i> Mouche, la Verdâtre.	Fig. 10. <i>Musca, Aurifrons.</i> Mouche, la Riche.
Fig. 11. <i>Musca, Leucocephala.</i> Mouche, la Leucocéphale.	Fig. 12. <i>Tabanus, Lugubris.</i> Taon, le Lugubre.	Fig. 13. <i>Tabanus, Morio.</i> Taon, le Morio.	Fig. 14. <i>Tabanus, Alpinus.</i> Taon, l'Alpin.	Fig. 16. <i>Tabanus, Haustellatus.</i> Taon, le Bombyloïde.
Fig. 16. <i>Tabanus, Albipes.</i> Taon, l'Albipède.	Fig. 17. <i>Culex, Pipiens.</i> Coufin, le commun.	Fig. 18 & 19. <i>Empis, Pennipes.</i> Empis, la Plumipède.	Fig. 20. <i>Empis, Lineata.</i> Empis, la Rayée.	Fig. 21. <i>Empis, Acephala.</i> Empis, l'Acéphale.
Fig. 22. <i>Conops, Petiolata.</i> Conops, le Pétiolé.	Fig. 23. <i>Conops, 3-Fasciata.</i> Conops, le Trifacié.	Fig. 24. <i>Conops, Punctata.</i> Conops, le Ponctué.	Fig. 25. <i>Conops, Lutea.</i> Conops, le Jaune.	Fig. 26. <i>Conops, Sericea.</i> Conops, le Soyeux.
Fig. 27. <i>Conops, Cinerea.</i> Conops, le Cendré.	Fig. 28. <i>Afilus, Barbarus.</i> Afile, l'Africain.	Fig. 29. <i>Afilus, Violaceus.</i> Afile, le Violet. N ^o . 31.	Fig. 30. <i>Afilus, Punctatus.</i> Afile, le Ponctué. 32.	Fig. 31. <i>Afilus, Fasciculatus.</i> Afile, le Fasciculé. 46.
Fig. 32. <i>Afilus, Bombylius.</i> Afile, le Bombyle. 48.	Fig. 33. <i>Bombylius, Fuscus.</i> Bombyle, le Brun. 5.	Fig. 34. <i>Bombylius, Fulvipes.</i> Bombyle, le Fulvipède. 11.	Fig. 35. <i>Hippobosca Equina.</i> Hippobosque des chevaux. 1.	

Fig. 1.









T O M I I I I

NOMENCLATOR

ENTOMOLOGUS,

INSECTORUM SYSTEMATIS NATURÆ GENERA;

SPECIES LINN. ANTÍQUAS RECENTIORESQUE

NUPERRIME DETECTAS,

NECNON PRÆCIPUORUM ENTOMOLOGORUM

SYNONYMIAM,

ORDINE ALPHABETICO INDICANS.

ABBREVIATIONES.

* Species novas designat.

D. F. D. Fabricium.

Enum. Austriæ Insectorum Enumerationem.

Scop. Entomologiam Carniolicam.

Geoff. Insectorum Parisiensium Historiam.

Ent. parif. . . . Entomologiam Parisiensem.

V. Nostrum Musæum.

D. Linn.

Pag.

Gall.

LIBELLULA.

DEMOISELLE.

<i>Ænea.</i>	6	L'Aminthe.
<i>Albidella.</i>	* 15	La Life. V.
<i>Cancellata.</i>	5	La Philis.
<i>Cecilia.</i>	* 11	La Cécile. <i>Geoff.</i>
<i>Cyanea.</i>	* 9	La Henriette. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Depressa.</i>	4	La Sylvie.
<i>Flaveolata.</i>	3	L'Éléonore.
<i>Forcipata.</i>	8	La Caroline.
<i>Fridrichs Dalensis.</i>	* 11	L'Agathe. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Frumentii.</i>	* 11	La Catherine. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Fulva.</i>	* 10	La Cristine. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Grandis.</i>	7	La Julie.
<i>Hafnienfis.</i>	* 10	La Danoise. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Juncea.</i>	8	La Lifette.
<i>4-Maculata.</i>	1	La Françoisse.
<i>Pedemontana.</i>	* 9	La Piémontoise. <i>Fab.</i> . .
<i>Pratensis.</i>	* 10	La Bergere. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Puella.</i>	13	L'Amélie.
<i>Rubicunda.</i>	4	La Laïs.
<i>Rubra.</i>	* 11	La Pudique. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Sanguinea.</i>	* 10	La Ninon. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Tenella.</i>	* 15	La Thérèse. V.
<i>Triedra.</i>	* 10	La Gertrude. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Variegata.</i>	* 11	La Rosalie. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Victoria.</i>	* 11	La Victoire. <i>Geoff.</i> . .
<i>Virgo.</i>	12	La Louise.
<i>Vulgata.</i>	3	La Claire.
<i>Vulgatissima.</i>	5	La Justine.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

DEMOISELLE.

DEMOISELLE.

LI^{re}ELL.
AESHNA,
AGRION.

Demoiselle dorée L'Aminthe. . . ead.
verte.

. ead.

. La Sylvie. . . ead.

. L'Éléonore. . . ead.

Demoiselle à taches La Caroline. . . Aeshna. 1.
d'un verd-céladon.

Demoiselle à ailes La Julie. . . Aeshna. 2.
jaunes.

. La Françoise. . . ead.

. ead.

Demoiselle verte , La Dorothée. Agrion. 2.
à taches bleues.

. ead.

. La Victoire.

. La Louise. L'Ulrique. Agrion. 1.

. ead.

. La Justine. . . ead.

D. Linn. *Pag.* *Gall.*

EPHEMERA. ÉPHÉMERE.

Albipes.	* 23	L'Albipede. <i>Enum.</i>
Bioculata.	18	La Tuberculée.
Culiciformis.	20	La Culiciforme.
Danica.	* 18	La Danoise. <i>Faun. Frid.</i>
Diptera.	21	La Diptere.
Flava.	* 22	La Dorée. <i>Enum.</i>
Fuscata.	19	La Brunette.
Gemmata.	* 23	La Perlée. <i>Scop.</i>
Halterata.	* 18	La Ceinture. <i>F.</i>
Horaria.	20	L'Ephémère.
Lutea.	17	La Jaune.
Maculata.	* 22	La Tachetée. <i>V.</i>
Marginata.	17	La Bordée.
Nervosa.	* 22	La Nerveuse. <i>D. de Geer.</i>
Nigra.	19	La Noire.
Parvula.	* 23	Le demi-Deuil. <i>Scop.</i>
Speciosa.	* 22	La Belle. <i>Enum.</i>
Striata.	21	La Striée.
Vespertina.	17	La Noire. Lége la Délicate.
Vulgata.	16	La Commune.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

ÉPHÉMERE.

ÉPHÉMERE.

EPHEM.

. Ephém. jaune à deux
filets & ailes reti-
culées. ead.
. Ephém. à deux filets
& ailes blanches. ead. 10.

Ephém. à deux ailes
& à bande brune. ead.
. Ephém. à deux filets
& ailes reticulées.

Ephém. à ceinture
blanche. ead.
. Ephém. à deux filets
& ailes marginées. ead.
. Ephém. à trois filets
& ailes reticulées. ead.

Ephém. noire à ailes
blanches. Ephém. à trois filets
& ailes brunes. ead.

Ephém. grise en
dessous. Venosa. 6.
. ead:

. Ephém. à deux filets
& ailes brunes. ead.

. Ephém. noire à trois
filets. ead.

Ephém. Commune. Ephém. à trois filets
& ailes tachetées. ead.

D. Linn. Pag. Gall.

PHRYGANEÆ.

FRIGANE.

Albicornis.	* 36	L'Albicorne. <i>Scop.</i>
Albifrons.	33	Le Front blanc.
Analís.	* 39	La Marquée. <i>F.</i> . . .
Atra.	* 44	La Savoyarde. . . .
Azurea.	32	L'Azurée. . . .
Bicaudata.	24	La double Queue. . . .
Bicolor.	* 42	La Bicolor. <i>Enum.</i>
Bilineata.	34	La Bilinéaire. . . .
Bimaculata.	30	La Bimaculée. . . .
Bimaculata.	* 37	La Bimaculée. <i>Scop.</i>
Binervosa.	* 44	La Binerveuse. <i>De Geer.</i>
Collaris.	* 42	Le Collier. <i>Enum.</i>
Ciliaris.	32	La Ciliée. . . .
Cylindrica.	* 45	La Cylindrique. <i>De Geer.</i>
Digitata.	* 42	La Digitée. <i>Enum.</i>
Dubia.	* 38	La Douteuse. <i>Scop.</i>
4-Fasciata.	* 40	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . .
Ferruginea.	* 36	La Rouillée. <i>Scop.</i>
Filosa.	33	La Filiforme. . . .
Flava.	35	La Jaune.
Flavicornis.	* 27	La Flavicorne. <i>V.</i>
Flavilatera.	* 31	La Dilatée. . . .
Fuliginosa.	* 38	La Fuligineuse. <i>Scop.</i>
Funerea.	* 43	La Pleureuse. . . .
Fusca.	34	La Brune. . . .
Grammatica.	26	La Turque. . . .
Grandis.	29	La Grande. . . .
Grisea.	28	La Grise. . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

FRIGANE.

FRIGANE.

PHRYGA-
NEA.

.....	ead.
.....	<i>Ent. parif.</i>	
.....	ead.
.....	La Perle brune , à	
.....	raies jaunes. . .	Semblis. 6.
.....	ead.
Frigane noire à	La Frigane à anten-	
bandés. . . .	nes panachées.	ead.
Frigane à deux ner-		
vures tachetées.		
.....	Puffila ?
Fausse-Frigane cy-		
lindrique.		
.....	ead.
.....	ead. ?
.....	L'Hémérobe aqua-	
.....	tique.	
.....	Frigane-mouche en	
.....	deuil.	
.....	ead.
.....	La Perlè brune à	
.....	pattes jaunes. An?	
Frig. à deux points		
blancs.	ead.
Frig. grise à points		
noirs.	ead.

xxvii] *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Hirta.	* 40	La Hérissée. <i>F.</i> . . .
Interrupta.	* 40	L'Interrompue. <i>F.</i> . . .
Lineola.	* 41	La Linéaire. <i>Enum.</i> . . .
Longicornis.	33	La Longicorne. . . .
Lugubris.	* 44	L'Enfumée.
Marginata.	32	La Bordée.
Martia.	* 39	La Précoce. <i>Scop.</i> . . .
Minuta.	35	La Petite.
Musciformis.	* 44	La Mouche. <i>Geoff.</i> . . .
Nebulosa.	25	La Nébuleuse.
Nigra.	31	La Noire.
Nigro-nervosa.	* 45	Les Nervures noires. <i>D.</i> <i>Geer.</i>
Nitida.	* 42	La Brillante. <i>Faun. Frid.</i>
Obfuscata.	* 37	L'Obscure. <i>Scop.</i> . . .
Occulta.	* 43	La Cachée. <i>Faun. Frid.</i> . .
Pallipes.	* 40	La Pallipede. <i>F.</i> . . .
Pectinicornis.	* 39	La Pectinée. <i>Scop.</i> . . .
Phalaenoides.	25	La Phalénoïde.
Pilosa.	* 40	La Velue. <i>F.</i>
Plumbea.	* 43	La Plombée. <i>Geoff.</i> . . .
Pyrulina.	* 38	La Pyraloïde. <i>Scop.</i>
Regelationis.	* 39	La Pressée. <i>Scop.</i> . . .
Reticulata.	27	La Reticulée.
Rhombica.	29	Le Rhombe.
Ruficrus.	* 36	La Tuberculée. <i>Scop.</i> . .
Saltatrix.	35	La Sautreuse.
Striata.	28	La Striée.
Testacea.	* 38	La Testacée. <i>Scop.</i>
Tineoides.	* 37	La Tinéoïde. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	ead.
.	Frig. demi-Deuil.	
	<i>Ent. paris.</i> . .	ead.
Frig. grise à points noirs. An ?		
.	Frig. à ailes tachées & longues antennes. . .	ead.
.	<i>Ent. Paris.</i>	
.	ead.
.	ead.
.	Frigane-mouche de couleur pâle.	
Fausse-Frigane cen- drée.	La Perle brune à ailes pâles. . .	Semblis. 7.
Frig. noir-bleuâtre à ailes courbées.	La Frigane à ailes ponctuées. . .	ead.
Frig. brune à ner- vures noires.		

Lege l'Obscurcie.

.	ead.
.	Semblis. 5.
.	ead.
.	Frigane plombée à ailes fauves.	
.	ead.
.	Frigane panachée.	ead.
.	F. de couleur fauve.	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Tripuntata.	* 26	La Triponctué. <i>Scop.</i>
Umbrosa.	35	L'Obscure.
Uncinata.	* 26	La Crochue. <i>Enum.</i>
Variegata.	* 37	La Bigarrée. <i>Scop.</i> . . .
Variegata.	* 44	La Marbrée.
Venosa.	* 43	La Veinée. <i>Geoff.</i> . . .
Viridis.	* 41	La Verdâtre. <i>F.</i> . . .
Viridis.	* 43	La Verte. <i>Geoff.</i>
Wæneri.	33	La Suédoise.

HEMEROBIUS.

H É M E R O B E.

Abdominalis.	* 54	L'Imperceptible. <i>F.</i> . . .
Albus.	47	Le Blanc.
Aphidioides.	* 55	L'Aphidioïde. <i>Enum.</i>
Bipunctatus.	52	Le Biponctué.
Chrysops.	47	Le Porte-Or.
Fasciatus.	* 54	Le Fascié. <i>F.</i>
Flavicans.	50	Le Jaunâtre.
Flavus.	* 55	Le Jaune. <i>Scop.</i>
Fulvicephalus.	* 55	Le Fulvicéphale. <i>Scop.</i>
Hirtus.	48	Le Hérissé.
Humuli.	49	Du Houblon.
Longicornis.	* 53	Le Longicorne. <i>F.</i> . . .
Lutarius.	50	L'Aquatique.
Maculatus.	* 54	Le Tacheté. <i>F.</i>
Nemoralis.	* 55	Le Sauvage. <i>Faun. Frid.</i>
Nitidulus.	* 53	Le Brillant. <i>F.</i>
Obscurus.	* 56	L'Obscur. <i>Faun. Frid.</i>
Paganus.	49	Le Payfan.
Parvulus.	* 56	Le Roux. <i>Faun. Frid.</i>
Pedicularius.	51	Le Pédiculaire.
Perla.	46	La Perle.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	F. marbrée à pattes panachées. <i>Ent.</i> <i>parif.</i>	
• • • • •	Frig. noire à ailes pâles veinées.	
• • • • •	• • • • •	Semblis. 9.
• • • • •	Frigane verte.	

HÉMEROBE.

HÉMERÔBE.

HEMEROB.

.
.
																			id.
.
																			id.
																			id. 13.
Hém. verd , tacheté							Hémérobe à ailes												
de noir . . .							punctuées. . .								id.				
.
.
																			Mantiss. 13.
.
																			id.

Hém. gris, tacheté	
de brun.	id.
.	id.
.	id.
H. aquatique noir.	Semblis 8.
.	id. M.
.	id.

Pou du bois. . .	Le Pou du bois. .	Pulsatorius.
.	Le Lion des puce-	
	rons.	id.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Phalænoides.	43	Le Phalénoïde.
6-Punctatus.	49	Le Sixpoinctué.
4-Punctatus.	* 54	Le Quadripoinctué. <i>F.</i> . . .
Raphidioides.	* 56	Le Raphidioïde. <i>V.</i>
Rufus.	* 56	Le Roux. <i>V.</i>
Striatulus.	* 53	Le Strié. <i>F.</i>
Varius.	* 56	Le Varié. <i>V.</i>

MYRMELEON.

MYRMELEON.

Australe.	* 62	L'Austral. <i>F.</i>
Barbarum.	61	L'Africain.
Formicarium.	59	Le Fourmilion.
Formicalynx.	61	Le Formicalynx.
Italicum.	* 62	L'Italien. <i>F.</i>
Libelluloides.	57	Le Libelluloïde.
Longicorne.	58	Le Longicorne.
Lugdunense.	* 63	Le Lyonnais. <i>V.</i>
Occitanicum.	* 63	Le Languedocien. <i>V.</i>
Pantherinum.	* 62	La Panthere. <i>F.</i>

PANORPA.

MOUCHE-SCORPION.

Communis.	64	La Commune.
Coa.	65	L'Insulaire.
Germanica.	65	L'Allemande.
Hyemalis.	65	L'Hyémale.
Tipularia.	* 66	La Tipule. <i>F.</i>

RAPHDIA.

RAPHDIE.

Mantispa.	67	La Raphidie-Mante.
Notata.	* 68	La Tachetée. <i>F.</i>
Ophiopsis.	66	La Raphidie.

D. Geer.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Hémer. phalenoïde.	id.
. La Frigane à ailes	
. ponctuées.	id.
.	id. <i>M.</i>

.	id.
-----------	-----

FOURMILION.

FOURMILION.

MYRMEL.
ASCALAP.

.	id. <i>M.</i>
.	Ascalaph. i.
. Le Fourmilion.	id.
Fourmilion à ailes	
sans taches.	id.
<i>Delendum.</i>	id.
Fourmil. moucheté.	id.

.	id. <i>M.</i>
-----------	---------------

MOUCHE-SCORP.

MOUCHE-SCORP.

PANORPA.

Mouche - Scorpion	La Mouche - Scor-	
commune.	pion.	ead.
.	ead.
.	ead.
.	ead.
.	ead.

RAPHIDIE.

RAPHIDIE.

RAPHIDIA.

.	<i>Mantis</i> 37.
.	ead.
Raphidie commune.	ead.
<i>Inject. Tomus IV.</i>	<i>c</i>

D. Linn. Pag. Gall.

CYNIPS.

CINIPS.

Adscendens.	* 77	Le Relevé. <i>F.</i>
Amerinæ.	74	Du Saule pentandrique. . .
Arerrima.	* 75	Le Charbon. <i>Enum.</i>
Aurata.	* 77	Le Doré. <i>Faun. Frid.</i>
Capreæ.	74	Du Saule - Marceau. . .
Cardui.	* 77	Du Chardon. <i>Faun. Frid.</i>
Pagi.	73	Du Hêtre.
Glechomæ.	70	Du Glécome-Lierre. . .
Hieracii.	70	De l'Eperviere.
Inanita.	74	Le Diaphane.
Phragmitis.	* 76	Des Roseaux. <i>Enum.</i>
Potentilla.	* 77	De la Potentille <i>Geer.</i> .
Quercus baccarum.	70	Des Baies.
Quercus Corticis.	72	De l'Ecorce.
Quercus Folii.	71	Des Feuilles.
Quercus Gemmæ.	73	Des Boutons.
Quercus Inferus.	71	L'Abrité.
Quercus Pedunculi.	72	Du Péduncule.
Quercus Petioli.	72	Du Fétiole.
Quercus Ramuli.	72	Des Rameaux.
Quercus Surculi.	* 75	Des Rejetons. <i>Enum.</i>
Rosæ.	69	De la Rose.
Rubi.	75	Le Porte - Or.
Salicis Strobili.	74	Du Cône du Saule. . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

CINIPS.

CINIPS.

CYNIPS.

. *Mantiff.*
. ead.

. ead.

. ead.

. Cinips de la Galle du
Lierre terrestre. ead.

ead.
. Cin. de la Galle en
chapeau du Chêne. ead.

. Le Diplolepe de la
Galle ronde &
dure du Chêne. ead.

. Cin. de la Galle en
rose du Chêne.

Lege Abrité. ead.

. Cin. de la Galle en
pomme des extrê-
mités des bran-
ches du Chêne. ead.

. Cinips de la Galle
en grappe du
Chêne. . . . ead.

. Le Diplolepe du
Bédéguar. . . ead.

. Le Cin. Porte-Or.

. ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Viminalis.	73	Du Saule à feuilles longues.
Viridis.	* 76	Le Verd. <i>Faun. Frid.</i>
TENTHREDO.		MOUCHE-A-SCIE.
Abietis.	91	Du Sapin.
Albicincta.	* 102	La Cordeliere. <i>Enum.</i> .
Albicornis.	* 110	L'Albicorne. <i>F.</i>
Alneti.	* 105	Des Aulnées. <i>Scop.</i>
Alni.	95	De l'Aulne.
Americana.	82	L'Américaine.
Amerinæ.	80	Du Saule pentandrique. .
Annularis.	* 117	L'Annulaire. <i>V.</i>
Annularis.	* 101	L'Annulaire. <i>Enum.</i>
Annulata.	* 86	L'Annulée. <i>F.</i>
Apicaris.	* 116	La Ferrugineuse. . . .
Astroites.	* 116	L'Etoile d'Or.
Atra.	94	Le Velours noir. . . .
Betulæ.	* 112	Du Bouleau. <i>Geer.</i> . .
Betulæ.	120	Du Bouleau.
Bicincta.	97	La double Ceinture.
Bicolor.	* 85	La Bédeau. <i>Enum.</i>
Bifasciata.	* 114	La Bifasciée. <i>Geoff.</i> .
Blanda.	* 111	L'Agréable. <i>F.</i>
Cærulescens.	* 115	La Bleuâtre. <i>Geoff.</i> . .
Campestris.	94	La Champêtre.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. ead.

MOUCHE-A-SCIE. MOUCHE-A-SCIE. TENTHR.

. Mouche-à-Scie noire avec le milieu du ventre fauve. ead.

. M.-à-Scie noire à pattes argentées.

. *Geoff.* præced. var.? ead.

. ead.

L'Américaine. ead.

M.-à-Scie , frelon roux. *Lege* 943. ead.

. ead.

. Mouche-à-Scie fauve à points jaunes. *Ent. paris.*

. *Ent. paris.*

. M.-à-Scie noire à pattes fauves. ead.

M.-à-Scie jaune & noire du Bouleau.

Mouche-à-Scie feticorne rousse , à derriere noir. ead.

. M.-à-Scie à deux bandes jaunes. ead.

. Mouc.-à-Scie noir-bleuâtre.

xxxviiij Tom. III. NOMENCLATURE

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Caprea.	122	Du Saule - Marceau. . .
Carbonaria.	99	La Charbonniere. . . .
Cephalotes.	* 88	La Tête-noire. <i>F.</i> . . .
Cerafi.	91	Du Cerisier.
Ciliaris.	85	La Ciliaire.
Cincta.	97	La Ceinture.
Cingulata.	* 107	La Mandarine. <i>Scop.</i> . .
Connata.	* 84	L'Epaulette. <i>Enum.</i> . .
Cordata.	* 115	Le Porte-Cœur. <i>Geoff.</i> .
Costalis.	* 110	La Liserée. <i>F.</i>
Crassa.	* 102	L'Épaisse. <i>Enum.</i> . . .
Crocea.	* 113	La Safranée. <i>Geoff.</i> . .
Cynobasti.	119	Du Rosier.
Dealbata.	* 104	La Blanchie.
Depressa.	* 124	L'aplatie. <i>Enum.</i> . . .
Dorsata.	* 89	Le Dos-Noir. <i>F.</i>
Enodis.	84	La Violette.
Erythrogona.	* 105	L'Érythrogone. <i>Enum.</i> .
Erythrocephala.	117	L'Érythrocéphale. . . .
Fasciata.	82	La Fasciée.
Femorata.	78	La Difforme.
Ferruginea.	* 101	La Ferrugineuse. <i>Enum.</i>
Flava.	127	La Jaune.
Flavicornis.	* 103	La Flavicorne. <i>F.</i> . . .
Fuliginosa.	* 104	La Faligineuse. <i>Enum.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • •	La Bedeaude du	
	Saule. • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
Mouche-à-Scie de		
la Larve limace. • • • • •		ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	Le Frêlon à épau-	
	lettes.	
• • • • •	Mouche - à - Scie	
	Porte-Cœur.	
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	M.-à-Scie safranée.	
• • • • •	Mouche - à - Scie à	
	jambes variées.	ead.
M.-à-Scie feticorne	M.-à-Scie à ventre	
noire, à ventre	& pattes fauves	
jaune.	& corcelet pa-	
	naché.	
• • • • •	• • • • •	ead.
M.-à-Scie bleue,		
à ailes bleues. • • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	M.-à-Scie noire à	
	genoux fauves.	ead.
M.-à-Scie feticor-		
ne, à tête jaune. • • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
M.-à-Scie frelon	Frêlon noir à	
noir, à grosses	échancrure. • • •	ead.
cuisses. <i>Lege 944.</i>		
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	ead.

xī T O M. III. N O M E N C L A T O R

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fulvinenia.	* 106	L'Entourée. <i>Enum.</i>
Fulviventris.	* 105	La Précocce. <i>Enum.</i>
Furcata.	* 86	La Fourchue. <i>V.</i>
Germanica.	* 109	L'Allemande. <i>F.</i> . . .
Hæmatodes.	* 105	L'Enfanglantée. <i>Enum.</i>
Hæmorrhoidalis.	* 23	L'Hémorrhoidale. <i>F.</i> . .
Impura.	* 108	La Mûlâtre. <i>Scop.</i>
Inanita.	* 125	La Diapane. <i>V.</i>
Intercus.	121	La Mineuse.
Juniperi.	88	Du Genévrier. . . .
Labiata.	* 115	La Labiée. <i>Geoff.</i> . .
Lateralis.	* 110	La Latérale. <i>F.</i> . . .
Linearis.	* 124	La Linéaire. <i>Enum.</i>
Livida.	98	La Livide. . . .
Longicornis.	* 125	L'Extraordinaire. . .
Longicornis.	* 125	La Longicorne. <i>Geoff.</i>
Lonicerae.	122	Du Chevre-feuille.
Lucorum.	81	La Sauvage. . . .
Lucorum.	* 123	La Sibylle. <i>F.</i> . . .
Lutea.	79	La Jaune. . . .
Luteicornis.	* 108	La Lutéicorne. <i>F.</i> . .
4-Maculata.	* 110	La Quadrimaculée. <i>F.</i> .
Maculata.	* 114	La Tachetée. <i>Geoff.</i> . .
Marginata.	79	La Bordée. . . .
Mesomela.	93	La Mésomele. . . .
Montana.	* 106	La Montagnarde. <i>Enum.</i>
Moric.	* 111	La Négresse. <i>F.</i> . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. ead.

. ead.

. M.-à-Scie à bouquet. *Ent. paris.* ead.

. M.-à-Scie noire à pattes & corcelet variés de jaune.

. ead.

. M.-à-Scie à antennes blanches au bout. ead.

. M.-à-Scie à corps alongé. *Ent. par.*

. M.-à-Scie à longues antennes.

. ead.

. ead.

M.-à-Scie frelon
jaune.

. ead.

. ead.

. ead.

. M.-à-Scie noire
à ventre jaune
noir en haut &
en bas.

. ead.

. Vaga 46.

. ead.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Multifasciata.	*	114	La Rayée. <i>Geoff.</i> . . .
Nassata.		100	L'Écuffonnée.
Nemoralis.		118	La Faune.
Nigra.		98	La Noire.
Nigrata.	*	112	La Noircie. <i>Geer.</i> . . .
Nitena.		82	La Brillante.
Obscura.	*	84	L'Obscure. <i>F.</i>
Ochroptera.	*	113	L'Ochroptere. <i>Geoff.</i> . .
Opacæ.	*	111	L'Opaque. <i>F.</i>
Ovaia.		95	L'Ovale.
Padi.		91	Du Prunier à grappe. . .
Palmata.	*	116	La Palmée.
Papillosa.	*	112	La Mamelonnée. <i>Geer.</i> .
Pavida.	*	109	La Craintive. <i>F.</i>
Perlata.	*	116	La Perlée.
Pini-Rufa.	*	88	La Rouffe. <i>D. Geer.</i> . .
Pini-Minor.	*	87	La Petite. <i>D. Geer.</i> . .
Pini.		87	Du Pin.
Pini.	*	112	Du Pin. <i>De Geer.</i> . . .
Pocilechroa.	*	110	L'Arlequine. <i>Enum.</i> . . .
Populi.		119	Du Peuplier.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • • Mouche-à-Scie à
ventre rayé.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

Mouche-à-Scie à
larve noire.

M.-à-Scie bleue à
jambes jaunes.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

• • • • • M.-à-Scie noire
à ailes jaunes.

• • • • • ead.

Mouche-à-Scie co-
tonneuse.

• • • • • ead.

• • • • • Mouche-à-Scie aux
pieds blancs.

M.-à-Scie, à anten-
nes barbues ; la
Petite. *Lege* 933,
t. 35.

M.-à-Scie, à cein-
ture rousse.

• • • • • ead.

• • • • • M.-à-Scie perlée.
Ent. parif.

Mouche-à-Scie, à
antennes barbues
rousses.

Mouche-à-Scie, à
antennes barbues
la Petite.

Mouche-à-Scie, à
antennes barbues;
la Grande.

M.-à-Scie noire
à antennes pecti-
nées. • • • • ead.

M.-à-Scie du sapin.

• • • • • ead.

liv Tom. III. NOMENCLATOR

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Prolongata.	*	125	La Prolongée.
Pruni.		122	Du Prunier.
12-Punctata.		100	La Ponctué.
Punctata.	*	114	La Ponctué. <i>Geoff.</i> . . .
Punctum-Album.		93	Le Point-Blanc.
Rapæ.		97	De la Rave.
Reticulata.		120	La Reticulée.
Ribis.	*	104	Du Groseiller. <i>Enum.</i>
Rosæ.		96	Du Rosier.
Rubi.	*	124	De la Ronce. <i>Geoff.</i> . . .
Rufides.		94	La Rufpede.
Rumicis.		121	De la Patience.
Rustica.		89	La Rustique.
Salicis.		92	Du Saule.
Salicis cinerea.	*	113	Du Saule cendré. <i>De Geer.</i>
Salicis pentandræ.	*	113	Du Saule pentandrique. <i>De Geer.</i>
Saluum.		120	La Bizarre.
Scrophulariæ.	*	89	De la Scrophulaire. <i>F.</i> .
Scutellata.	*	126	L'Écuffonnée. <i>V.</i>
Semi-Annularis.	*	117	La Sémi-Annulaire. <i>V.</i>
Semicincta.	*	103	La Demi-Ceinture. <i>Enum.</i>
Septentrionalis.		99	La Septentrionale.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

t	M.-à-Scie à pro- longement. <i>Ent.</i> <i>paris.</i>	
t		ead,
.	M.- à - Scie noire marquée de jaune sur le premier & & dern. anneaux du ventre.	
.		ead,
M.-à-Scie jaune & noire du Rosier.	Mouche-à-Scie du Rosier. . . .	ead,
.	M.-à-Scie à points jaunes au corce- let & milieu du ventre fauve.	
M.-à-Scie guêpe.	M.-à-Scie à quatre bandes jaunes. .	ead.
M.-à-Scie jaune & noire du Saule.	M.-à-Scie safran- née à tête noire.	ead.
M.-à-Scie des Galles rondes du Saule.		
M.-à-Scie des Galles ligneuses du Saule.		
.	ead.
	Mouche-à-Scie de la Scrophulaire.	ead.
Mouche-à - Scie à larges pattes.		ead.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Sericea.		82	La Soyeuse.
Signata.	* 107		La Marquée. <i>Scop.</i>
Signata.	* 123		La Marquée. <i>F.</i> . . .
Solitaria.	* 101		La Solitaire. <i>Enum.</i> . .
Stellata.	* 115		L'Étoile. <i>Geoff.</i> . . .
Sylvatica.		118	La Sauvage.
Temula.	* 107		Du Perfil. <i>Scop.</i>
Thoracica.	* 116		La Variée.
Tibialis.	* 117		La Tibiale. <i>V.</i>
Trifasciata.	* 114		La Trifasciée. <i>Geoff.</i> . .
Tristis.	* 83		La Triste. <i>F.</i>
Ulmi.	121		De l'Orme.
Ustulata.	85		La Brûlée.
Vafra.		119	La Rusée.
Vernalis.	* 115		La Printanniere. <i>Geoff.</i> .
Vespiiformis.	* 103		La Vespiforme. <i>Enum.</i>
Viennensis.	* 103		La Viennoise. <i>Enum.</i>
Viridescens.	* 116		La Verdâtre. <i>Geoff.</i> . .
Viridis.		94	La Verte.
Virgata.	* 114		La Vergée. <i>Geoff.</i> . . .
Vitellinæ.		81	L'Apothicaire.

D. Geer.

D. Geoff.

Fab.

. ead.

. ead.

. M.-à-Scie noire à
pattes & milieu
de ventre fauves.

. M.-à-Scie noire à
ventre bordé de
taches jaunes.

M.-à-Scie féticorne
noire à pattes
jaunes. ead.

. M.-à-Scie à pattes
fauves & taches
blanch. *Ent. par.*

. M.-à-Scie à trois
bandes jaunes.

. ead.

M.-à-Scie bleue à
jambes noires. ead.

. ead.

. M.-à-Scie noire à
corcelet rouge.

. M.-à-Scie noire à
ventre bordé de
vert.

. La Lettre hébraïque
verte. ead.

. Mouche-à-Scie à
deux bandes noi-
res sur le ventre.

. ead.

D. Linn. Pag. Gall.

SIREX.

UROCERE.

Camelus.	* 129	Le Chameau.
Dromedarius.	* 131	Le Dromadaire. <i>F.</i>
Fantoma.	* 131	Le Fantôme. <i>F.</i>
Fuscicornis.	* 130	Le Fuscicorne. <i>F.</i>
Gigas.	126	Le Géant.

Juvenus.	128	Le Taureau.
----------	-----	---------------------

Magus.	* 130	Le Magicien. <i>F.</i>
Mariscus.	129	L'Enflé.
Pacca.	* 131	L'Étoile. <i>F.</i>
Pygmeus.	129	Le Pygmée.
Reflexus.	* 133	Le Réfléchi. <i>V.</i>
Spectrum.	128	Le Spectre.

Struthiocamelus.	* 132	L'Autruche. <i>V.</i>
Tabidus.	* 132	Le Foible. <i>F.</i>
Troglodyta.	* 132	Le Troglodyte. <i>F.</i>

ICHNEUMON.

ICHNEUMON.

Abrogator.	* 183	Le Destructeur. <i>Enum.</i>
Acicularis.	* 214	L'Aiguillette. <i>Geoff.</i>
Acuminator.	* 180	L'Aiguiseur. <i>F.</i>
Acutorius.	* 158	L'Anguleux. <i>V.</i>
Adulterator.	* 192	Le Pantomime. <i>V.</i>
Affectator.	* 174	Le Cambré.

Agricolator.	175	Le Laboureur.
Albatorius.	* 156	Le Blanchi. <i>V.</i>

D. Geer.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

ICHNEUMON-
BOURDON.

UROCERE.

SIREX.

id.

• • • • • *M. id.*

. *M. id.*

• • • • • M, id.

Ichneum.-Bourdon, L'Urocere. . . . id.

à ventre demi-
noir & dem. jaune.

Ichneum.-Bourdon,
noir-bleuâtre luisant.

. M. id.

id.

• • • • • *M. id.*

id.

Ichneum.-Bourdon, id.
à-jambes rouffes.

id.

..... *M. id.*

ICHNEUMON. ICHNEUMON ICHNEUM;
ET CINIPS.

. Ichn. l'Aiguillette. id.
 , , , , ,

..... Ichn. noir à pattes
postérieures gros-
ses & milieu du
ventre fauve, id.

I Tom. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Albipes.	* 214	Du Cirse. <i>Geoff.</i> . . .
Albus.	* 214	Le Blanc. <i>Geoff.</i> . . .
Alveariformis.	* 213	La Ruche. <i>Geoff.</i> . . .
Ambiguorius.	* 157	L'Équivoque. <i>V.</i>
Ambulatorius.	* 139	Le Vagabond. <i>F.</i> . . .
Amictus.	* 203	L'Habillé. <i>F.</i> . . .
Anceps.	* 204	Le Douteux. <i>V.</i>
Annulatorius.	* 149	Ce Jouailler. <i>F.</i> . . .
Aphidum.	208	Des Pucerons. . . .
Apicarius.	* 189	Le Mélanure. <i>Geoff.</i> . .
Apparitorius.	* 145	Le Bedeau.
Apterus.	* 217	L'Aptère. <i>Geoff.</i> . . .
Apum.	* 211	Le Rusé. <i>D. Geer.</i> . .
Araneorum.	* 211	Des Araignées. <i>Geer.</i> . .
Araneorum.	* 216	Le Hardi. <i>Geoff.</i> . . .
Arlequinatus.	* 191	L'Arlequiné.
Armatorius.	* 140	Le Fourbisseur. <i>F.</i> . . .
Arrogator.	* 175	Le Vernisseur. <i>F.</i> . . .
Atomus.	210	L'Atome.
Atratorius.	* 142	Le Noir. <i>V.</i>
Basilaris.	* 142	Le Basilaire.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Ichn. noir à corps allongé & ovale, à jambes d'une feuille-morte jau- nâtre.	Ichneumon noir à pattes blanchâtres.	
.	Ichneumon blanc.	
.	Ichn. à coque en forme de rayons de ruche.	
.	id.
.	id.
.	id.
Ichn. des Pucerons.	L'Ichneumon des Pucerons.	id.
.	Ichn. jaune à pointe du corcelet noir.	
.	Ichn. noir à pattes & base des an- tennes fauve, & femelle fans ailes.	
Ichn. noir-verdâtre des Abeilles ma- çonnes.		
Ichn. des Araignées.		
.	Ichn. à anneaux sur le ventre, & fe- melle fans ailes.	
.	Ichn. à pattes arle- quinées. <i>Ent. par.</i>	
.	id.
.	id.
.	Ichneumon. Basilaire. <i>Ent. paris.</i>	

Tom. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Bedeguaris.	205	Du Bédéguar.
Bicolor.	* 204	Le Bicolor. V.
Bicolor.	* 218	Le Tranché. V.
Bidentorius.	* 150	L'Armé. F.
Bifasciatus.	* 192	Le Bifascié. Geoff.
Bimaculatus.	* 140	Le Bimaculé. Enum.
Bipartitus.	* 142	Le Mi-Parti.
Brachyurus.	* 154	Le Court. Enum.
Cælestis.	* 142	Le Céleste.
Cæpæ.	* 192	De l'Oignon. Geoff.
Cantator.	* 218	Le Crieur. D. Geer.
Carpini.	* 217	De la Charmille. Geoff.
Cavator.	* 196	Le Creusé. V.
Cephalator.	* 195	Le Monstrueux. V.
Cinctipes.	* 187	Le Garotté. D. Geer.
Cinctorius.	* 151	Le Ceinturonnier. F.
Cinctus.	199	L'Entouré.
Circumflexus.	* 199	Le Circonflexe.
Cirrogastr.	153	Le Cirrogastrique.
Cylindrator.	* 180	Le Rouleur. F.
Cynipedis.	207	Des Cynips.
Coccorum.	207	Des Gallinsectes.
Colorator.	* 196	Le Barbouilleur. V.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Ichneumon doré du Le C'nips doré à
Bédéguar. queue, du Bédé-
guar lisse. . . *M. id.*

. *id.*

. Ichn. noir à deux
bandes sur les ailes.

. Ichn. à ventre mi-
partie. *Ent. paris.*

. Ichn. Céleste étoilé.
Ent. paris.

. Ichn. à pattes, &
milieu du ventre
fauves.

id.

. Ichn. à pattes va-
riées de fauve, &
femelle sans ailes.

Ichn. noir à tarfes
jaunes au milieu.

. *id.*

. Ichn. à deux bandes
sur les ailes. *id.*

. *id.*

. Ichn. jaune à tête
& corcelet noirs,
avec la pointe
jaune.

. *id.*

. *id.*

Ichn. vert à anten-
nes en massues. *id.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Compunctor.	167	Le Piqueur.
Compunctator.	* 180	Le Dangereux. <i>Enum.</i>
Compunctor.	* 187	Le Traître. <i>Geoff.</i> . . .
Comitator.	159	Le Suivant.
Conicus.	* 212	Le Conique. <i>F.</i> . . .
Consecutorius.	* 156	Le Découpé. <i>V.</i>
Constrictorius.	137	L'Enchaîné.
Corculatorius. <i>Lege f. 3.</i>		Le Porte-Cœur. <i>V.</i>
— — — — —	* 158	
Coruscator.	166	Le Brillant.
Cothurnatus.	* 163	Le Comédien. <i>Enum.</i>
Coxator.	* 193	Le Hanché. <i>V.</i>
Craffipes.	* 188	Le Craffipede.
Crispatorius.	138	Le Friseur.
Croceatorius.	* 143	Le Safrané. <i>V.</i>
Cruciator.	* 197	L'Inquiétant. <i>V.</i>
Culpatorius.	136	Le Méchant.
Cunctatorius.	* 149	Le Temporiseur. <i>Scop.</i>
Curtus.	* 163	Le Raccourci. <i>Enum.</i>
Debellator.	* 161	Le Conquérant. <i>F.</i> . .
Debellator.	* 184	Le Conquérant. <i>Enum.</i>
Deceptorius.	* 142	Le Trompeur. <i>Scop.</i>
Decorator.	* 195	Le Décorateur. <i>V.</i>
Defensorius.	* 156	Le Spadassin. <i>V.</i>
Deliratorius.	147	L'Extravagant.
Delufor.	168	Le Moqueur.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

..... Ichn. noir à queue
de la longueur du
corps & ventre
lisse. *M. id.*

..... Ichn. à pattes fau-
ves & courte
queue.

Ichneumon noir. Ichn. noir à an-
neaux blancs aux
antennes. *id.*

..... *id.*

..... *id.*

..... Ichneumon Sphex. *id.*

..... *id.*

..... *id.*

..... Ichn. noir à pieds
rougeâtres , &
pointe du corce-
let blanche. *id.*

..... I. noir à pattes &
mil. du vent. fauves
& p. de derr. noirs. *id.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Denigrator.	165	Le Ramonceur.
Dentatus.	* 200	Le Défendu. <i>F.</i>
Depressator.	* 196	L'Aplati. <i>V.</i>
Desertor.	165	Le Déserteur.
Designatorius.	147	L'Ordonnateur.
Dimidiator.	* 162	Le Tailleur. <i>F.</i>
Dumetorum.	* 164	Des Buissons. <i>Geoff.</i> . .
Edictorius.	147	Le Crieur.
Elegantulus.	* 181	L'Élégant. <i>Enum.</i>
Elongator.	* 175	L'Alongé. <i>F.</i>
Enervator.	171	Le Languissant.
Exarator.	169	Le Traceur.
Excitator.	* 185	L'Excitateur. <i>Scop.</i>
Exhortator.	* 162	L'Incitateur. <i>F.</i>
Extensor.	169	Le Filiforme.
Extensorius.	135	Le Coureur.
Extricator.	* 193	Le Développé. <i>V.</i>
Falcator.	* 178	Le Faucheur. <i>F.</i>
Falcatorius.	* 151	Le Faucheur. <i>F.</i>
Falculator.	* 124	Le Moissonneur. <i>V.</i>
Falsator.	* 164	Le Déguisé. <i>V.</i>
Fasciator.	* 175	L'Interrompu. <i>F.</i>
Fasciatorius.	* 149	Le Fascié. <i>F.</i>
Fasciatus.	* 192	Le Fascié.
Fasciatus.	* 205	Le Fascié.
Femoralis.	* 188	Le Gorgé. <i>Geoff.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Ichn. noir à ventre couleur de cerise.	<i>M.</i> id.
.		id.
.		id.
.		id.
.		id.
.	Ichn. noir à cuisse rougeâtre & an- neaux blancs aux antennes.	
.		id.
.		id.
.	Ichn. noir à pattes fauves , à cuisses postérieures gros- ses , & ventre en faucille.	
.		id.
.	Ichn. brun en filet.	id.
.	Ichn. panaché de noir & citron à anneau blanc aux antennes.	id.
.		id.
.		id.
.		id.
.		id.
.	I. fascié. <i>Ent. paris.</i> <i>Deleatur.</i>	
.	I. noir à p. brunes & grosses cuisses. <i>An. sphex ?</i>	

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Femoratus.	* 204	L'Hydropique. V.
Ferrugineus.	* 141	Le Rouillé. <i>Enum.</i>
Fischeri.	* 163	Le Fischer. <i>Enum.</i>
Flavipes.	* 191	Le Flavipede.
Flavifrons.	* 182	Le Distingué. <i>Enum.</i> . . .
Fomentator.	171	Le Baigneur.
Forcipatus.	* 203	Le Taillandier. V.
Formicatus.	200	La Fourmi.
Fornicator.	* 176	Le Voûté. <i>F.</i>
Fossorius.	148	Le Fossoyeur.
Fraudatorius.	* 144	Le Courtifan. V.
Funereus.	* 141	Le Funebre. <i>Geoff.</i> . . .
Fuscatus.	* 200	Le Rembruni. <i>F.</i>
Fuscicornis.	* 215	Le Fuscicorne. <i>D. Geer.</i>
Fuscus.	148	Le Brun.
Fusorius.	148	Le Frondeur.
Gallarum.	206	Des Galles.
Geniculatus.	* 188	Le Géniculé. <i>Geoff.</i> . . .
Gladiator.	* 161	Le Gladiateur. <i>Scop.</i>
Glaucopterus.	* 199	Le Glaucoptere.
Globatus.	209	Le Tourneur.
Globiceps.	* 211	Le Globuleux. <i>D. Geer.</i> .
Glomeratus.	210	Le Fileur.
Gravidator.	172	Le Fécond.
Gregarius.	* 213	Le Social. <i>Enum.</i>
Illecebrator.	* 194	L'Attrayant. V.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Ichn. à ventre fauve & pattes jaunes. <i>Ent. parif.</i>	
.	Ichn. noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.	
.	<i>M. id.</i>
.	<i>id.</i>
.	<i>id.</i>
.	<i>id.</i>
.	Ichn. noir avec la pointe du corce- let & le milieu des antennes blancs.	
.	<i>id.</i>
Ichn. non ailé , à antennes brunes.	<i>Agilis.</i>
.	<i>i</i>	<i>id.</i>
.	<i>id.</i>
.	Ichn. noir à pattes fauves & genoux blancs.	
.	<i>id.</i>
Ichn. à coton blanc.	Ichn. à coton blanc.	<i>id.</i>
Ichn. verd - doré à tête ronde.		
Ichneumon noir à jambes jaunes.	Ichn. à coton jaune.	<i>id.</i>
.	<i>id.</i>

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Imitator.	* 197	L'Analogue. V.
Impostor.	* 186	L'Imposieur. <i>Scop.</i> . . .
Impregnator.	* 183	L'Ébaucheur. <i>Enum.</i>
Impugnator.	* 183	Le Hardi. <i>Enum.</i>
Incrassatorius.	* 158	Le Crassicorne. V.
Incubitor.	160	Le Pareseux.
Inculcator.	172	Le Paveur.
Inflammatorius.	* 143	L'Enflammé. V.
Infraactorius.	136	Le Destructeur.
Inguinalis.	* 154	L'Alongé. <i>Geoff.</i> . . .
Inquisitor.	* 185	L'Enquêteur. <i>Scop.</i>
Insectator.	* 184	L'Insecteur. <i>Enum.</i>
Insignitor.	* 164	Le Remarquable. V.
Intercus.	* 213	Le Mineur. <i>Enum.</i>
Inversus.	* 191	L'Inverse. <i>Geoff.</i> . . .
Irrorator.	* 178	Le Jardinier. <i>F.</i> . . .
Jaculator.	173	L'Archer.
Junci.	* 155	Du Jonc. <i>Geoff.</i> . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. Ichn. noir à ventre
couleur de cerise.

. Ichn. noir à ventre
& pattes fauves,
& anneau blanc
aux antennes. . id.

. Ichn. noir à pattes
& ventre fauves. id.

. id.

. Ichn. noir à pattes
fauves & points
blancs à la base
des cuisses.

. Ichn. noir à pattes
antérieures ci-
tronnées & ventre
fauve en dessous.

. Ichn. noir à plaque
de poils bruns sur
le ventre. . id.

I. noir à antennes
courtes & gros-
ses & jambes pos-
térieures longues
& très-grosses. Ichn. tout noir à
pattes postérieu-
res très-longues
& grosses. . id.

. Ichn. noir à pointe
du corcelet jaune,
pattes & milieu
du ventre fauve.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Juniperi.	206	Du Génévrier.
Lætororius.	150	Le Gai. <i>F.</i>
Lævigator.	* 193	Le Polisseur. <i>V.</i>
Larvarum.	206	Des Larves.
Latrator.	* 176	L'Importun. <i>F.</i>
Latro.	* 181	Le Voleur. <i>Enum.</i>
Linearis.	* 189	Le Linéaire. <i>Geoff.</i> . .
Lineator.	* 176	Le Régleur. <i>F.</i>
Lineatorius.	* 157	Le Rayé. <i>V.</i>
Lingulator.	* 194	La Spatule. <i>V.</i>
Lituratorius.	146	L'Effacé.
Longicornis.	* 215	Le Longicorne. <i>V.</i>
Lotorius.	* 152	Le Baigneur. <i>V.</i>
Luctatorius.	144	Le Lutteur.
Lunulatus.	* 203	Le Turc. <i>V.</i>
Luteus.	198	Le Jaune.
Lutorius.	* 152	Le Jauni. <i>F.</i>
Maceratorius.	* 157	Le Jeûneur. <i>V.</i>
Macropus.	* 182	L'Étique. <i>Enum.</i>
Maculator.	* 177	Le Barbouilleur. <i>F.</i> . .
Maculatorius.	* 152	Le Tacheté. <i>F.</i>
Mandator.	171	L'Infligateur.
Mandator.	* 179	L'Ordonnateur. <i>F.</i> . . .
Manifestator.	166	Le Glorieux.
Melanocephalus.	* 216	Le Mélanocéphale. <i>Enum.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.
Ichn. verd - doré à ventre noir. • • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	Ichn. fauve à ta- ches noires & ailes croisées.	
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	Ichn. noir à pointe du corcelet, par- tie des pattes & milieu du ventre fauves.	
Ichneumon faucille jaune. • • • • •	Ichn. jaune à ven- tre en faucille. • • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	M. id.
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	M. id.
• • • • •	• • • • •	M. id.
Ichn. noir à pattes rouffes, à anten- nes à filets coni- ques dont le ven- tre est très-long & cylindrique.	Ichneumon à longue queue. • • • • •	id.

Ixiv Tom: III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Melanophthalmus.	* 203	Le Melanophthalme. <i>Enum.</i>
Melanops.	* 201	Le Bruni. <i>Enum.</i>
Melanopteros.	* 189	Le Méléanoptère. <i>Geoff.</i>
Mensurator.	* 177	Le Mefureur. <i>F.</i>
Migrator.	* 162	Le Paffager. <i>F.</i>
Moderator.	170	Le Modérateur.
Molitorius.	137	L'Entrepreneur.
Mofchator.	* 179	Le Parfumeur. <i>F.</i>
Motatorius.	* 139	L'Inconftant. <i>F.</i>
Mufcarum.	205	Des Mouches.
Mutillarius.	* 201	Le Mutille. <i>F.</i>
Mutillarius.	* 217	Le Mutillaire. <i>F.</i>
Myftacatus.	* 183	Le Grenadier. <i>Enum.</i>
Necator.	* 179	Le Meurtrier.
Niger.	* 214	Le Noir. <i>Geoff.</i>
Nigro-Caudatus.	* 187	Le Caudataire. <i>De Geer.</i>
Nigroculus.	* 202	Le Noirci. <i>Enum.</i>
Notatorius.	* 159	Le Marqueur. <i>V.</i>
Obfufcator.	* 167	L'Obscurci. <i>V.</i>
Obscurus.	* 189	L'Obscur. <i>Geoff.</i>
Occifor.	* 184	Le Boucher. <i>Enum.</i>
Ochrocephalos.	* 214	L'Ochrocéphale. <i>Geoff.</i>
Oculator.	* 177	L'Oculifte. <i>F.</i>
Ofculatorius.	* 151	L'Ofculateur. <i>F.</i>
Ovulorum.	209	Des Œufs.
Pectinicornis.	210	Le Pectiné.

D. Geer:

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Ichn. brun à taches noires & ailes noirâtres. /	
.		id.
.	Ichn. noir à ventre fauve en devant & à anneaux blancs aux pattes & aux antennes.	id.
.		id.
.		id.
.		M. id.
.		id.
.		id.
.		id.
.		M. id.
.		id.
.	Ichn. tout noir.	
Ichn. jaune à extrémité noire.		

.	Ichn. brun à tête & bout du ventre noir.	
.	Ichn. noir à ventre & tête jaunes.	
.		id.
.		M. id.
Ichn. noir à jambes brunes.		id.
Ichn. noir à jambes jaunes.		id.
Insect. Tomus IV.		e

lxxj *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Pedestris.	* 217	Le Piéton. <i>F.</i>
Peregrinator.	160	Le Voyageur.
Perfuasorius.	145	L'Attrayant.
Petiolatus.	* 188	Le Pétiolé.
Petiolatus.	* 191	Le Pétiolé. <i>Geoff.</i>
Pictor.	* 197	Le Peintre. <i>V.</i>
Pictus.	* 141	Le Peint. <i>Enum.</i>
Pisorius.	138	Le Reclus.
Porrektorius.	* 140	Le Mécanicien. <i>F.</i>
Prærogator.	171	Le Privilegié.
Pteromelas.	* 196	Le Ptéronéle. <i>V.</i>
Pugillator.	172	Le Champion. :
Punctulatus.	* 190	Le Militaire.
Punctorius.	* 153	Le Ponctué. <i>F.</i>
Pupparum.	206	Des Chrysalides.
Quadrupes.	* 190	Le Quadrépède.
Quadripunctorius.	* 202	Le Quadriponctué. <i>Enum.</i>
Quadrum.	* 212	Le Géometre. <i>F.</i>
Quæstorius.	136	Le Furet.
Ramicornis.	* 212	Le Ramicorne. <i>F.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	id.
.	Ichn. noir à ventre fauve en devant, noir postérieure- ment & terminé de blanc & à an- neaux blancs aux antennes.	
Ichn. noir à taches blanchâtres, jam- bes rouffes à lon- gues tarrières.	id.
.	Ichn. à bandes tranf- verses. <i>Ent. paris.</i>	
.	Ichn. à pattes fauves & ventre en filet.	
.	<i>M.</i> id.
.	<i>M.</i> id.
.	id.
Ichn. noir à anten- nes jaunâtres dans le milieu.	Ichn. noir à pattes & milieu du ven- tre citron. . .	id.
.	Ichneum. à points. <i>Ent. paris.</i>	
.	<i>M.</i> id.
Ichneum. vert-doré des Chryfalides.	Le Cin. des Chryfa- lides des Papillons.	id.
.	Ichneum. chauffé de blanc. <i>Ent. paris.</i>	
.	<i>M.</i> id.
.	id.
Ichneumon vert à antennes bran- chues.	id.
		<i>e ij</i>

lxvii] *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Ramidulus.	198	Le Taché.
Raptorius.	134	Le Ravisseur.
Reluctator.	160	Le Vaporeux.
Refinellæ.	170	De la Résine.
Restaurator.	* 161	Le Restaurateur. <i>F.</i> . . .
Rubicundus.	* 214	Le Rouge. <i>Geoff.</i> . . .
Rufescens.	* 211	Le Rouffâtre. <i>D. Geer.</i> .
Ruficornis.	* 215	Le Ruficorne. <i>D. Geer.</i> .
Rufus.	* 218	Le Roux. <i>D. Geer.</i>
Ruspator.	173	Le Furet.
Rusticus.	* 190	Le Rustique.
Rutilator.	166	Le Doreur.
Salrator.	* 177	Le Sauter. <i>F.</i>
Sarcitorius.	135	Le Charpentier.
Saturatorius.	137	Le Gourmand.
Scanicus.	* 190	Le Panaché. <i>Geoff.</i> . .
Scirpi.	* 155	Du Scirpe. <i>Geoff.</i> . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Ichn. jaune à corcelet noir en dessous & extrémité du ventre noir.	
.	Ichn. noir à bande fauve sur le ventre, avec la pointe du corcelet & anneaux des antennes blancs.	id.
.		id.
<i>Lege</i> de la Phalene		
de la Réfine.		id.
.		id.
.	I. noir à corcelet & ventre rouges.	
I. roux à taches brunes sur les ailes.		
Ichn. non-ailé à antennes brunes.	<i>Agilis.</i>
.	Ichn. noir à pattes brunes & grosses cuisses dentelées.	id.
.	Ichn. à pattes fauves & pieds noirs.	
	<i>Ent. paris.</i>	
<i>Fab. 6. lege 61.</i>		id. 61.
.		id.
.		id.
Ichn. noir à front & à jambes jaunes.	id.
	Ichn. noir à pattes postérieures panchées.	
.	I. noir à pointe du corcelet & bout du ventre blancs.	

lxx TOM. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Scutellatus.	* 155	L'Écuffonné. <i>Geoff.</i> . . .
Secalis.	208	Du Seigle.
Segmentarius.	* 152	Le Partagé. <i>F.</i>
Segmentofus.	* 191	Le Bizarre.
Semiannulatus,	* 162	Le Semiannulaire. <i>Enum.</i>
Signatus.	* 191	Le Marqué.
Speculator.	* 185	L'Espion. <i>Scop.</i>
Sphægum.	* 213	Des Sphex. <i>F.</i>
Sponsorius.	* 150	Le Fiancé. <i>F.</i>
Strobilellæ.	170	Des Cônes.
Subcutaneus.	208	Des Mineuses.
Sugillatorius.	134	L'Athlete,
Superbus.	* 153	Le Superbe. <i>Enum.</i> . . .
Surratus.	* 182	L'Ankilosé. <i>Enum.</i>
Tarsoleucos.	* 181	Le Pondreux. <i>Enum.</i>
Tentator.	* 196	L'Essayeur. <i>V.</i>
Terebrator.	* 184	Le Menuisier. <i>Scop.</i>
Terrefactor.	* 195	Le Formidable. <i>V.</i>
Tibialis.	164	Le Bigarré.
Tinearum.	* 211	L'Étoile. <i>D. Geer.</i> . . .
Tiphæ.	* 155	De la Massette. <i>Geoff.</i> .

D. Gser.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • •	Ichn. fauve à taches noires & pointe du corcelet jaune.	
• • • • •		id.
• • • • •		id.
• • • • •	I. à base du ventre rouge. <i>Ent. paris.</i>	
• • • • •	Ichn. noir à anten- nes fauves vers le bas & anneaux blancs aux an- tennes.	
• • • • •	I. à raies blanches.	
• • • • •		id.
• • • • •		id.
• • • • •		id.
Ichn. noir à ailes velues. • • •		id.
• • • • •	Ichn. noir à pointe du corcelet & ta- ches du ventre blanches. • • •	id.
• • • • •	Ichn. noir à ventre tacheté de citron sur les côtés.	

Deleatur.

Ichn. des teignes
domestiques.

• • • • • Ichn. noir à
antennes, pattes
& milieu du ven-
tre fauves.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Titillator.		168	Le Tâteur.
Torquatus.	*	203	Le Cordé. V.
Tortricis.	*	213	Des Tortrix. <i>Enum.</i>
Tuberculatus.	*	187	Le Tuberculé. <i>Geoff.</i> . . .
Turionellæ.		169	Des Larves.
Tyrannus.	*	141	Le Tyran. <i>Enum.</i>
Usurpator.	*	161	L'Usurpateur. <i>Scop.</i>
Vagator.	*	186	Le Coureur. <i>Scop.</i>
Vaginatorius.		145	Le Gainier.
Variegator.	*	178	Le Moucheté. <i>F.</i> . . .
Venator.		168	Le Chasseur.
Vespiformis.	*	181	Le Vespiforme. <i>Enum.</i>
Vesicularis.	*	216	Le Vesciculeux. <i>D. Geer.</i> .
Viator.	*	163	L'Errant. <i>Enum.</i> . . .
Victor.	*	186	Le Vainqueur. <i>Scop.</i>
Vinctus.	*	202	L'Enchaîné. <i>Enum.</i>
Virgatus.	*	204	Le Flagellé. <i>Geoff.</i> . . .
Visitator.	*	184	Le Visiteur. <i>Scop.</i>
Vitratus.	*	190	Le Mandarin.
Volutatorius.		145	Le Tourneur.
Xanthopus.	*	201	Le Blond. <i>Enum.</i> . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • • Ichn. noir à ventre
fauve au milieu &
pieds de derriere
blancs. • • • id.

• • • • • Ichn. à queue de la
longueur du corps
& ventre à tuber-
cules. • • • • • id.

• • • • • id.

• • • • • id.

• • • • • id.

Ichneum. non ailé à
deux vessies mo-
biles. *Lege* p. 209.

• • • • • Ichn. noir à pattes
rougeâtres, à ta-
ches blanches sur
les jambes & an-
neaux blancs aux
antennes.

• • • • • Ichn. jaune, à cor-
celet rayé.

• • • • • Ichn. à bandes jau-
nes. *Ent. paris.*

• • • • • id.
• • • • • I. à tête & corcelet
noirs & ventre
jaune en faucille.

D. Linn. Pag. Gall.

S P H E X.

<i>Abietina.</i>	* 248	Des Sapinées. <i>Scop.</i>
<i>Albifrons.</i>	* 228	Le Frontal. <i>V.</i>
<i>Albomaculata.</i>	* 249	Le Blanchi. <i>Enum.</i>
<i>Anthracina.</i>	* 224	Le Negre. <i>Scop.</i>
<i>Apiaria.</i>	* 247	L'Abeille. <i>Scop.</i>
<i>Appendigaster.</i>	221	L'Appendigastrique. <i>Leges</i> t. 8. & f. 11.
<i>Arenaria.</i>	* 225	Le Solitaire. <i>F.</i> . . .
<i>Arenaria.</i>	235	Des Sablonnières. . . .
<i>Argurometopa.</i>	* 250	Le Front-d'Argent. <i>V.</i>
<i>Austriaca.</i>	* 227	L'Autrichien. <i>Enum.</i>
<i>Bilocularis.</i>	* 248	Le Partagé. <i>Scop.</i>
<i>Boops.</i>	* 249	Le Myope. <i>Enum.</i>
<i>Carbonaria.</i>	* 248	Le Charbonnier. <i>Scop.</i>
<i>Ciliata.</i>	* 242	Le Cilié. <i>F.</i>
<i>5-Cincta.</i>	* 239	Les Zones. <i>F.</i>
<i>Cincta.</i>	* 223	Le Mandarin. <i>Scop.</i>
<i>4-Cincta.</i>	* 247	Le Cordelier. <i>F.</i> . . .
<i>4-Cincta.</i>	* 251	Le Quadriannulé. <i>V.</i> . .
<i>Clavipes.</i>	220	L'Enflé. . . . , . .
<i>Clavipes.</i>	* 226	Le Clavipede. <i>F.</i> . . .
<i>Clypeata.</i>	234	Le Bouclier.
<i>Coarctata.</i>	* 224	Le Rétréci. <i>Scop.</i>
<i>Collaris.</i>	237	L'Esclave.
<i>Collaris.</i>	* 244	L'Esclave. <i>F.</i>
<i>Colon.</i>	235	Le Colon.
<i>Conica.</i>	* 228	Le Conique. <i>V.</i>
<i>Contigua.</i>	* 246	Le Contigu. <i>F.</i> . . .
<i>Crafficornis.</i>	* 242	Le Crafficorne. <i>F.</i> . .
<i>Cribraria.</i>	232	Le Criblé.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Ichn. à ventre court

& tronqué.

Evania 1.

M. ead.

Crabro are-
narius M.

Tiphia 7 *M.*

Tiphia 2.

Crabro 12

M.

Crabro 12

M?

Deleatur. Citatio

D. Fab.

M. ead.

Crabro 9.

M. ead.

Crab. 11 *M.*

Tiphia 2. *M.*

Guêpe-Ichn. à deux

bandes interrom-

pues & à crible.

Crabro 8.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Curva.	* 252	Le Courbé. V.
Elongata.	* 250	L'Alongé. V.
Emarginata.	* 250	L'Echancré. V.
Ephippia.	232	Le Sellé.
Exaltata.	* 239	L'Exalté. <i>F.</i>
4-Fasciata.	* 229	Le Quadrifascié. V.
Fasciata.	* 253	Le Fascié. V.
Femorata.	* 225	Le Partagé. <i>F.</i>
Figulus.	221	Le Potier.
Fistipes.	222	Le Déginguendé.
Flavicornis.	* 254	Le Flavicorne. V.
Flavifrons.	* 239	L'Ictérique. <i>F.</i>
Fossoria.	236	Le Fosseyeur.
Fuliginosa.	* 223	Le Ténébreux. <i>Scop.</i>
Furcata.	* 223	Le Fourchu. <i>Scop.</i>
Fusca.	230	Le Cerclé.
Gibba.	* 228	Le Bossu. V.
Gibba.	236	Le Bossu.
4-Guttata.	* 240	Le Quadrillé. <i>F.</i>
2-Guttata.	* 244	Le Transversal. <i>F.</i>
Hæmorrhoidalis.	* 243	L'Hémorroïdal. <i>F.</i>
Hirsuta.	* 223	Le Velu. <i>Scop.</i>
Hortorum.	* 243	Le Jardinier. <i>F.</i>
Interrupta.	* 241	L'Interrompu. <i>F.</i>
Leucostoma.	237	Le Leucostome.
Lineata.	* 254	Le Rayé. V.
Lucida.	* 252	Le Vernissé. V.
Lugubris.	* 252	Le Lugubre. V.
Lutaria.	* 225	Le Dépravé. <i>F.</i>
Maculata.	* 226	Le Maculé. <i>F.</i>
6-Maculata.	* 239	Le Six-Maculé. <i>F.</i>
Maculata.	* 241	Le Maculé. <i>F.</i>
Montrosa.	* 252	Le Monstreux. V.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

• • • • • La Guêpe - Dégin-
guendée. • • • ead.

• • • • • Scolia 5.

• • • • • Crabro 3.

Guêpe - Ichneumon
du fable. • • • ead.

• • • • • ead.

• • • • • Scolia 15.

• • • • • Scol. 19 *M.*

• • • • • Scolia 6 *M.*

• • • • • Scol. 12 *M.*

• • • • • Scolia 18.

• • • • • Crabro 17.

• • • • • *M.* ead.

• • • • • ead.

• • • • • Scolia 6.

• • • • • *M.* ead.

• • • • • Ichn. à pattes pos-
térieures fauves
très - grosses &
tachetées. • • Chalcis 2 *M.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Call.</i>
Morio.	* 243	Le Morio. <i>F.</i>
Myſſacea.	231	Le Grenadier.
Naviculata.	* 253	Le Batelier. <i>V.</i>
Nigra.	* 233	Le Noir. <i>F.</i>
Palmipes.	231	Le Palmé.
Pectinipes.	230	Le Cilié.
Plumbea.	* 242	Le Plombé. <i>F.</i>
Prisma.	* 244	Le Prisme. <i>F.</i>
Profuga.	* 224	Le Vagabond. <i>Scop.</i>
Punctata.	* 225	Le Ponctué. <i>F.</i>
5-Punctata.	* 240	L'Étoilé. <i>F.</i>
4-Punctata.	* 240	L'Enfumé. <i>F.</i>
4-Punctata.	* 241	Le Quadriponctué. <i>F.</i> . . .
2-Punctata.	* 245	Le Biponctué. <i>F.</i>
Punctum.	238	Le Point. <i>F.</i>
Ruficornis.	* 245	Le Ruſicorne. <i>F.</i>
Rufipes.	235	Le Ruſipede.
Rufipes.	* 246	Le Ruſipede. <i>F.</i>
Sabuloſa.	219	Le Foſſoyeur.
Scutata.	* 244	L'Écuyer. <i>F.</i>
Semiaurata.	237	Le Demi-Doré.
Semi-Cincta.	* 251	Le Semi-Annulé. <i>V.</i>
Spinofa.	* 246	L'Épineux. <i>F.</i>
Spirifex.	220	L'Égyptien.
Thoracica.	243	Le Jeune. <i>F.</i>
Triangulum.	* 251	Le Triangle. <i>V.</i>
Tricolor.	* 209	Le Tricolor. <i>Enum.</i>
Tuberculata.	253	Le Tuberculé. <i>V.</i>
Unicolor.	* 226	L'Unicolor. <i>F.</i>
Vaga.	238	L'Errant.
Variegata.	23	Le Varié.
Vefpiformis.	* 227	Le Vefpiforme. <i>Enum.</i>
Vefpoides.	* 248	Le Vefpoïde. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

Fab.

• • • • •	• • • • •	Tiphia 15.
• • • • •	• • • • •	Crabro 11.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M.</i> ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Scol.</i> 21.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	Scolia 14.
• • • • •	• • • • •	Scolia 16.
• • • • •	• • • • •	<i>M.</i> ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Crab.</i> 18.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Crab.</i> 17.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Crab.</i> 21.
Guêpe - Ichneumon du fable.	Ichn. noir à ventre fauve en devant & à long pédicule.	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Crab.</i> 15.
• • • • •	La Guêpe dorée- cuivreuse , à ventre fauve & noir.	Chrysis 17.
• • • • •	• • • • •	Crabro 2.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Scol.</i> 10.
• • • • •	• • • • •	<i>M.</i> ead.
• • • • •	• • • • •	Crabro 10.

D. Linn. Pag. Gall.

Viatica. 229 Le Coureur.

CHRY SIS.

Aurata. 256 Le Doré.

Bidentata. 256 L'Armé.

Carnea. * 158 Le Délicat. F.

Cyanea. 257 Le Bleu.

Fervida. * 257 L'Impatient. F.

Fulgida. 257 L'Éclatant.

Ignita. 255 L'Enflammé.

Integra. * 259 L'Entier. F.

Lucidula. * 258 Le Brillant. F.

Punctatissima. * 259 Le Pointillé. V.

Purpurata. * 259 Le Pourpré. F.

Succincta. 256 Le Noble.

Viridula. 257 Le Vert.

LEUCOPIS.

Dorsigera. 260 Le Crocheteur.

Gallica. 261 Le François.

D. Geer.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Guêpe - Ichneumon
des chemins.

Ichn. noir avec les
trois anneaux an-
térieurs du ven-
tre rougeâtre, &
les ailes noires.

ead.

.

Guêpe dorée à cor-
celet vert & der-
niers anneaux du
ventre lisses.

ead.

Guêpe dorée-bleue
à tache noire.

ead.

.

ead.

.

Guêpe dorée-verte.

ead.

.

ead.

.

Guêpe dorée à cor-
celet vert & der-
niers anneaux du
ventre épineux.

ead.

Guêpe dorée à ven-
tre cramois.

Guêpe dorée à cor-
celet vert & der-
niers anneaux du
ventre épineux.

ead.

.

M. ead.

.

Guêpe dorée à cor-
celet mi-partie de
rouge & de vert.

ead.

.

M. ead.

.

ead.

.

G. dorée-verte. An?

lxxxij T O M. III. N O M E N C L A T O R

D. Linn. Pag. Gall.

V E S P A.

Abbreviata.	* 281	La Courte. V.
Arvensis.	269	La Campagnarde.

Bicincta.	* 280	La Cordeliere. V.
Bidens.	271	L'Epineuse.
Bifasciata.	270	La Bifasciée.
Biglumis.	271	L'Armée.
Bipunctata.	* 276	La Biponctué. F.
Campestris.	270	La Champêtre.
Ciliata.	* 283	La Ciliée. V.
6-Cincta.	* 278	La Cordée. F.
5-Cincta.	* 283	La Chinoise. V.
Chrysoptera.	* 284	La Chrysoptere. V.
Chrysoptera-Armata.	* 284	La Chrysoptere. V.
Coarctata.	268	L'Étranglée.

Crabro.	262	Le Frelon.
Crabro medius.	* 273	Le moyen Frelon. <i>De Geer.</i>
Dimidiata.	* 278	La Bedeade. F.
Gallica.	266	La Françoisse.

Hirsutissima.	* 284	La Velue. V.
Histris.	* 282	L'Arlequine. V.
Ligata.	* 280	L'Enchaînée. <i>Faun. Frid.</i>
Lunulata.	* 285	Les Lunules. V.
Maculata.	* 274	La Tachetée. <i>Scop.</i>
Minuta.	272	La Petite.
Muraria.	267	Des Murailles.
Nigricornis.	* 283	La Nigricorne. V.
Norwegica.	* 275	La Norvégienne. F.

D. Geer:

D. Geoff.

D. Fab.

Guêpe - Ichneumon
à filet bossu.

Guêpe à premier
anneau du ventre
en poire & trois
bandes jaunes. .

ead;

[illegible]

• • • • • Grabro 7.
• • • • • M. Crab. 11.

• • • • •	Guêpe à premier anneau du ventre en poire & le se- cond en cloche.	ead.
Grand Frelon.	La Guêpe-Frelon.	ead.

Guêpe à anneaux
bordés de jaune
& deux taches
jaunes. ead,

..... M. Chalc. 37
ead.

.....ead,
 f_{ij}

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Oculata.	* 275	L'Oculée. <i>F.</i>
Parietina.	272	La Menuisière.
Parietum.	265	Des Cloisons.
2-Pustulata.	* 280	La Ripustulée. <i>V.</i>
6-Pustulata.	* 281	La Sixpustulée. <i>V.</i>
Rufa.	264	La Rouffe.
Ruficornis.	* 278	La Ruficorne. <i>F.</i>
Sexfasciata.	* 276	La Sixfasciée. <i>F.</i>
Spinipes.	267	La Porte-Épine.
Subterranea.	* 277	La Gnome. <i>F.</i>
Sylvestris.	* 274	La Sauvage. <i>Scop.</i>
Triangulum.	* 276	La Dorfale. <i>F.</i>
Tricincta.	* 279	La Bizarre. <i>Enum.</i>
Tricuspidata.	* 280	La Trompeuse. <i>V.</i>
Tridens.	* 275	Le Trident. <i>F.</i>
Tridentata.	* 277	L'Armée. <i>F.</i>
Trifasciata.	* 279	La Trifasciée. <i>F.</i>
Unguiculata.	* 282	L'Onguiculée. <i>V.</i>
Uniglumis.	271	La Redoutable.
Vulgaris.	263	La Vulgaire.

A P I S.

Acervorum.	325	Des Monceaux.
Ænea.	291	La Bronzée.
Agilissima.	* 301	L'Agile. <i>Enum.</i>
Agrestis.	* 317	La Rustique. <i>F.</i>
Agrorum.	* 328	La Campagnarde. <i>Enum.</i>
Agrorum.	* 328	Des Champs. <i>F.</i>
Alpides.	* 313	L'Alpipède. <i>F.</i>
Alpina.	325	L'Alpine.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

ead.

Guêpe à cinq bandes jaunes sur le ventre , la première éloignée des autres. . .

ead.

ead.

M. Bembex.

9.

ead.

ead.

Crabro 4.

ead.

ead.

Crabro r.

M. ead.

Crabro 16.

Guêpe commune. .

ead.

ead.

Abeille verdâtre & cuivreuse. . .

Andrena 3.

M. Noma-
da 3.

M. ead.

ead.

lxxxvj *Tom. III.* NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Annulata.	297	La Musquée.
Argillacea.	* 329	L'Architecte. <i>Scop.</i> . . .
Atra.	* 306	Le Velours noir. <i>Scop.</i> . .
Bicincta.	* 305	La Cordeliere. <i>Enum.</i> . . .
Bicolor.	* 329	La Bicolor. <i>Enum.</i> . . .
Bicolor.	* 315	La Bicolor. <i>F.</i>
Bicornis.	288	Le Diable.
Brachiptera.	* 331	La Brachiptere. <i>V.</i>
Bryorum.	* 299	La Maçonne. <i>Enum.</i> . . .
Cærulea.	* 319	La Bleue. <i>V.</i>
Cærulescens.	291	La Bleuâtre.
Calcarata.	* 308	L'Éperonnée. <i>Scop.</i>
Carbonaria.	287	La Charbonniere.
Cariosa.	293	La Dépravée.
Centuncularis.	237	La Menuisiere.
Cetii.	* 300	La Soufflée. <i>Enum.</i>
Cineraria.	287	La Cendrée.
Cingulata.	* 314	L'Entourée. <i>F.</i>
Clavicornis.	286	La Clavicorne.
Cœcutiens.	* 312	Le Lynx. <i>F.</i>
Collium.	* 330	Des Collines. <i>Scop.</i>
Conica.	297	La Conique.
Convexa.	* 299	La Convexe. <i>Enum.</i>
Cryptarum.	* 325	Des Cavernes. <i>F.</i>
Cunicularia.	294	La Mineuse.
4-Dentata.	296	La Quadridentée.
Elongata.	318	L'Alongée. <i>V.</i>
Fabriciana.	290	La Fabricius.
Farfarisæqua.	* 307	Du Tussilage. <i>Scop.</i>
Ferruginata.	298	La Rouillée.
Ferruginea.	* 316	La Ferrugineuse. <i>F.</i>
Flavipes.	* 317	La Flavipede. <i>F.</i>
Florentina.	* 315	La Florentine. <i>F.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

· · · · · ead.
Lege *Fab.* 8. f. 30.

· · · · · Abeille noire à ventre
fauve.

· · · · · *Andrena* 4.
· · · · · ead.

· · · · · Abeille-Maçonne à
poils roux.

· · · · · *Andrena* 1.

· · · · · Abeille Charpen-
tiere à ventre
velu & roux en-
dessous. . . .

ead.

· · · · · ead.

· · · · · *Nomada* 8.

· · · · · ead.

· · · · · ead.

· · · · · *M.* ead.

· · · · · ead.

· · · · · ead.

· · · · · *Nomada* 5.

· · · · · *M.* ead.

· · · · · *M.* ead.

· · · · · ead.

f iv

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Florifomis.	289	La Sybarite.
Frontalis.	* 330	La Frontale. V.
Fulva.	* 329	La Fauve. <i>Enum.</i>
Fulvipes.	* 320	La Fulvipe. V.
Fulviventris.	* 305	La Bèdeau. <i>Enum.</i> . . .
Fufcescens.	* 320	La Brunette. V.
Gallica.	* 319	La François. V.
Gibba.	* 314	La Bosue. <i>F.</i>
Hæmorrhœa.	* 310	La Rouillée. <i>F.</i>
Hemorrhoidalis.	* 315	L'Hémorrhœdale. <i>F.</i> . . .
Hattorfiana.	* 314	L'Hattorf. <i>F.</i>
Helvola.	290	La Rougeâtre.
Hemisphærica.	* 305	L'Hémisphérique. <i>Enum.</i>
Hirsuta.	* 327	La Hérissée. <i>F.</i>
Hirta.	* 301	La Mandarine. <i>Enum.</i>
Hispanica.	* 327	L'Espagnole. <i>F.</i>
Hortensis.	* 318	La Jardinière. <i>Geoff.</i> . . .
Hortorum.	322	Des Jardins.
Hypnorum.	324	Des Hypnes.
Interrupta.	* 311	L'Interrompue. <i>F.</i>
Interrupta.	* 318	La Fasciculée.
Ireos.	* 310	De l'Iris. <i>F.</i>
Labiata.	* 314	La Labiée. <i>F.</i>
Lagopoda.	295	La Lagopode.

D. Gœr.

D. Geoff.

D. Fab.

. ead.

. Abeille noire à ventre brun & lisse.

. Nomada 6.
ead.

. Andrena 13.
ead.

. Andrena 5.

. *M.* ead.

. *M.* ead.

. Abeille à pattes jaunes & anneaux du ventre blancs.

. Ab. à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre mi-partie de citron & blanc. . ead.

. Ab. à couronne & extrémité du corcelet & haut du ventre citron & l'extrém. du ventre blanche ? ead.

. ead.

. Abeille à houppe blanche. *Ent. paris.*

. ead.
Andrena 2.
ead.

18 *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lapidaria.	323	Des Pierres.
Leucostoma.	* 300	Le Demi-Deuil. <i>Enum.</i>
Leucozonía.	* 300	L'Herminée. <i>Enum.</i>
Lineata.	* 317	La Rayée. <i>F.</i>
Linguaria.	* 313	L'Horrible. <i>F.</i>
Longicornis.	285	La Longicorne.
Lucorum.	324	Des Taillis.
Luctuosa.	* 299	Le Deuil. <i>Enum.</i>
Lunulata.	* 320	La Turque. <i>V.</i>
Maculata.	* 311	La Tachetée. <i>F.</i>
Manicata.	296	Les Manchettes.
Marginata.	* 314	La Bordée. <i>F.</i>
Maxillofa.	289	La Formidable.
Mellifica.	231	L'Abeille.
Minuta.	* 306	La Petite. <i>Enum.</i>
Mniorum.	* 327	Des Mnies. <i>F.</i>
Montana.	* 308	La Montagnarde. <i>Scop.</i>
Muraria.	* 317	La Solitaire. <i>Geoff.</i> . .
Muscorum.	324	De la Mouffe.
Nemorum.	* 326	La Sauvage. <i>F.</i>
Nemorum.	* 330	Des Pois. <i>Scop.</i>
Pascuorum.	* 330	Des Pâturages. <i>Scop.</i> . .
Pilipes.	* 309	L'Aigrette. <i>F.</i>
Præcox.	* 308	La Printannière. <i>Scop.</i>
Pratorum.	322	Des Prés.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. Ab. noire avec les
derniers anneaux
du ventre fauves. ead.

. *M. Noma-*
da 3.
ead.

. Abeille à longues
antennes. . . ead.
ead.

. A. à cinq crochets. ead.
ead.
Andrena 4.
ead.

. Abeille domestique
ou des ruches. . ead.

. ead.

. Abeille bleuâtre à
ailes nébuleuses.
. Abeille fauve à
ventre jaune &
extrémité fauve. ead.
ead.

Lege t. 8. f. 27.

. Ab. grise à levres
jaunes & à houp-
pe aux pattes du
milieu. An ? ead.

. A. noire à couronne
du corcelet citron
& extrémité du
ventre fauve. . Arbufforum.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Pratorum.	* 326	Des Prairies. <i>F.</i> . . .
Pubescens.	* 312	La Cotonneuse. . . .
Punctata.	* 312	La Ponctué. <i>F.</i> . . .
Purpurascens.	* 319	La Pourprée. <i>V.</i>
Quadriceincta.	* 312	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . .
Quadrifasciata.	* 319	La Quadrifasciée. <i>V.</i>
Retufa.	288	L'Émouffée.
Riparia.	* 307	Des Rivages. <i>Scop.</i>
Rostrata.	294	Le Museau. . . .
Rotundata.	* 315	L'Arrondie. <i>F.</i> . . .
Ruderata.	* 326	Des Graviere. <i>F.</i> . . .
Rufa.	* 328	La Rouffe. <i>Enum.</i>
Rufa.	288	La Rouffe. . . .
Ruficornis.	298	La Ruficorne. . . .
Rufipes.	* 316	La Rufipede. <i>F.</i> . . .
Sabulosa.	* 307	La Pressée. <i>Scop.</i>
Sanguinolenta.	* 306	La Sanguinolente. <i>Enum.</i>
Scutellaris.	* 313	L'Écuffonnée. <i>F.</i> . . .
Seminuda.	* 327	La Semi-Velue. <i>F.</i> . . .
Senilis.	* 327	La Vieille. <i>F.</i> . . .
Sibirica.	* 326	La Sibérienne. <i>F.</i> . . .
Sordida.	* 306	La Tachée. <i>Scop.</i> . . .
Soroensis.	* 326	La Danoise. <i>F.</i> . . .
Sphegoides.	* 303	La Sphégoide. <i>Enum.</i>
Subterranea.	325	La Gnome. . . .
Succincta.	290	La Rubanée. . . .
Sylvarum.	323	Des Forêts. . . .
Sylvarum.	* 329	Des Forêts. <i>Scop.</i>
Terrestris.	321	La Terrestre. . . .
Thoracica.	* 315	L'Ardente. <i>F.</i> . . .
Trispinosa.	* 316	L'Épineuse. <i>F.</i> . . .

D. Geer.	D. Geoff.	D. Fab.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Bembex 3.
.	.	M. ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Nomada 4.
.	.	M. ead.
.	.	Thoracica ?
.	.	Nomada 2.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Andrena 13?
.	.	ead.
.	Ab. noire à ventre brun vers l'ex- trémité.	ead.
.	Ab. mineuse à cor- celet roux & velu.	Andrena 18.
.	.	ead.
.	Ab. à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre blanche.	ead.
.	.	ead.
.	.	M. ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Truncorum.	289	Des Cloifons.
Tumulorum.	286	Des Tombeaux.
Variegata.	* 311	La Variée. <i>F.</i>
Variegata.	294	La Variée.
Vespiformis.	* 304	La Vespiforme. <i>Enum.</i>
Vespoïdes.	* 302	La Vespoïde. <i>Enum.</i>
Violacea.	321	La Violette.

FORMICA.

Cespitum.	336	Des Gazons.
Didyma.	* 338	La Doublée. <i>F.</i>
Flava.	* 338	La Jaune. <i>Geer.</i>
Flavipes.	* 337	La Flavipede. <i>Geoff.</i> . . .
Fusca.	334	La Brune.
Fuscoptera.	* 337	La Bedeaude. <i>Geoff.</i> . . .
Herculeana.	332	L'Hercule.
Nigra.	334	La Noire.
Obfoleta.	335	La Paffée.
Pratensis.	* 338	Des Prés. <i>D. Geer.</i> . . .
Pubescens.	* 338	La Velue. <i>F.</i>
4-Punctata.	337	La Ponctuée.
Rubra.	335	La Rouge.
Rufa.	332	La Rouffe.
Tuberum.	* 339	La Nouée. <i>F.</i>
Vaga.	* 339	La Vagabonde. <i>Scop.</i>
Viatica.	* 339	Des Chemins. <i>F.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

ead.
ead.
Nomada, 3.

Abeille Gigantesq. Abeille Perce-Bois. ead.

Fourmi brune à
aiguillon. ead.

Fourmi jaune.	ead.
---------------	------

Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Grande F. noire. F. toute brune. . ead.

Grande Fourmi à
ailes à montié
brunes.

ead.

Pet. Fourmi noire. Fourmi toute noire. ead.

• • • • • ead.

ead. *Lege* 1080.

• • • • • ead.

ead.

Fourmi rougeâtre à
aiguillon. ead.

Grande Fourmi des bois. Fourmi brune à corcelet fauve. .

• • • • •

• • • • • M. ead;

D. Linn. Pag. Gall.

MUTILLA.

Acarorum.	341	Des Tiques.
Arenaria.	* 342	Des Sablonnières.
Argentata.	* 343	L'Argentée. V.
Calva.	* 343	La Chauve. V.
Europæa.	340	L'Européenne.
Formicaria.	342	La Fourmi.
Halenfis.	* 342	De Hall. F.
Maura.	341	La Maure.
Melanocephala.	* 344	La Mélanocéphale. V.
Rufipes.	* 342	La Rufipede. F.

DIPTERA.

OESTRUS.

Bovis.	345	Des Bœufs.
Elaphi.	* 349	Du Cerf. <i>Enum.</i>
Hæmorrhoidalis.	347	L'Hémorrhoidal.
Lineatus.	* 349	Le Rayé. V.
Nafalis.	347	Le Nafal.
Ovis.	343	Des Moutons.
Tarandi.	346	Des Rennes.

TIPULA.

Agarici.	* 393	De l'Agaric. <i>D. Geer.</i>
Albimana.	* 367	La Gantée. F.
Amphibia.	* 394	L'Amphibie. <i>D. Geer.</i>
Annulata.	361	L'Entourée.
Annulata.	374	L'Annulaire.
Arundineti.	364	Des Roseaux.

D. Geer.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Ichn. roux non-ailé

à antennes noires. Ichn. 128.

. *M.* ead.

Lége f. 33.

. ead.

. Ichn. 130.

. ead.

. ead.

. *M.* ead.

Oestre des tumeurs Oestre des Bœufs. id.
du Bœuf.

Oestre de l'intestin L'Oestre du fonde-
du Cheval. ment des Chevaux. id.

. id.

. Oestre des Moutons. id.

. id.

Tipule de l'Agaric
à antennes fili-
formes.

. *M.* ead.

Tipule amphibie.

. ead.

. Cincla 41.

. ead.

Insect. Tom. IV.

. g

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Atomata.	* 403	La Ponctuée. <i>Faun. Frid.</i>
Atrata.	360	La Prolongée.
Aurea.	* 372	La Dorée. <i>Faun. Frid.</i>
Barbicornis.	365	La Demi-Panachée.
Berberina.	* 392	De l'Épine-Vinette. <i>Enum.</i>
Bifasciata.	* 369	La Bifasciée. <i>Enum.</i>
Bilineata.	* 403	La Doublée. <i>Faun. Frid.</i>
Bimaculata.	361	La Bimaculée.
Bipunctata.	386	La Biponctuée.
Boleti.	* 371	Du Bolet. <i>Scop.</i>
Brevicornis.	379	La Bordée.
Buxi.	* 399	Du Bouis. <i>Geoff.</i>
Chrysanthemi.	* 391	Du Chrysanthème. <i>F.</i> . . .
Cimicoides.	* 371	La Cimicoïde. <i>Scop.</i>
Cinerea.	* 366	La Cendrée. <i>F.</i>
Conica.	* 398	La Conique. <i>Geoff.</i>
Contaminata.	357	La Tachée.
Convallium.	* 400	Du Muguet. <i>Scop.</i>
Cornicina.	349	La Bruyante.
Crocata.	354	La Safranée.
CrySTALLINA.	* 394	La Cristalline. <i>D. Geer.</i> . .
Culiciformis.	385	Le Culiciforme.
Culiciformis.	* 394	Tipule-Cousin. <i>D. Geer.</i> . .
Degener.	* 401	L'Intruse. <i>Scop.</i>
Dorsalis.	* 366	La Dorsale. <i>F.</i>
Ensicornis.	363	L'Ensicorne.
Erythrocephala.	* 396	L'Érythrocéphale. <i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Tipule-Ichneumon. ead.

Tipule à ailes à
deux taches. ead.

Tip. à ventre jaune. ead.

. Scatopse du Bouis.
. *M.* ead.

. ead.

. Tipule noire à ailes
noires.

. Tip. noire à taches
jaunes & ailes
maculées. . . ead.

Tipule jaune tache-
tée de noir. Tip. jaune à points
noirs , rangés en
trois bandes sur
le ventre. . . ead.

Tipule à bandes
jaunes. Tipule variée de
brun , de jaune
& de noir. . . ead.

Tipule de la Larve
cristalline. ead.

.
Tirule Culiciforme.

. ead.

Tipule à grande
tête rouge.

c Tom. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fasciata.	* 397	La Verte. <i>Gcoff.</i> . . .
Fasciata.	* 400	La Fasciée. <i>Scop.</i>
Fasciata.	362	La Fasciée.
Fasciculata.	* 388	La Fasciculée. <i>F.</i> . . .
Febrilis.	380	La Dépravée.
Fenestralis.	* 401	Des Fenêtres. <i>Scop.</i>
Ferruginata.	379	La Rouillée.
Ferruginea.	* 400	La Ferrugineuse. <i>Scop.</i>
Flabellicornis.	* 389	L'Éventail. <i>F.</i>
Flavescens.	362	La Jaunâtre.
Flavicans.	* 403	La Flavipede. <i>F.</i>
Flavipes.	* 367	La Flavipede. <i>F.</i> . . .
Flexilis.	375	La Souple.
Florilega.	381	La Flore.
Forcipata.	* 390	La Prolongée. <i>F.</i> . . .
Fungorum.	* 393	Des Champignons. <i>D. Geer.</i>
Fulvipennis.	* 370	L'Aile fauve. <i>D. Geer.</i> .
Geniculata.	* 391	L'Agenouillée. <i>F.</i> . . .
Gramina	* 399	Des Graminées. <i>Scop.</i>
Hemerobioides.	* 401	L'Hémérobioïde. <i>Scop.</i>
Hiemalis.	* 393	L'Hiemale. <i>D. Geer.</i> . .
Hirta.	383	La Hérissée.
Hortorum.	356	La Jardinière.
Hortulana.	381	La Jardinière.
Johannis.	379	La Saint-Jean.
Juniperina.	384	Du Génévrier.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Tip. verte à bandes transverses sur les ailes.	
.	ead.
.	ead.
.	Le Bibion de Saint- Marc , noir. .	ead.
.	Brevicornis.
.	ead.
.	ead.
.	<i>M.</i> ead.
.	Tipule à pattes en forme d'antennes sans anneaux. .	ead.
.	Le Bibion de Saint- Marc , rouge.	
.	ead.
Tipule des Cham- pignons.		
Tip. à ailes fauves.		
.	<i>M.</i> ead.
Tipule d'hiver.		
Tipule hérissée.	Bibion à ailes fran- gées & couvertes de taches nébu- leuses. . . .	ead.
Tipule des jardins.	ead.
.	Bibion de Saint- Marc , rouge. .	ead.
Tip. de Saint-Jean.	ead.
Tipule des Galles du Génévrier.	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Ichneumonea.	* 392	L'Ichneumon. <i>Enum.</i>
Idriensis.	* 370	D'Idria. <i>Scop.</i>
Immaculata.	* 398	L'Immaculée. <i>Geoff.</i> . .
Incarnata.	385	L'Incarnat.
Inquieta.	* 400	L'Inquiète. <i>Scop.</i>
Iris.	* 402	L'Iris. <i>Faun. Frid.</i>
Labacensis.	* 401	La Jaune. <i>Scop.</i>
Lacustris.	* 399	Des Lacs. <i>Scop.</i>
Latrinarum.	* 396	Des Latrines. <i>D. Geer.</i> .
Lineata.	* 403	La Rayée. <i>Faun. Frid.</i>
Littoralis.	373	La Maritime.
Longicornis.	386	La Longicorne.
Loti.	* 396	Du Lotier. <i>D. Geer.</i> . .
Lunata.	358	La Lunule.
Macrocephala.	377	La Macrocéphale.
Maculata.	* 370	La Tachetée. <i>D. Geer.</i> .
Marci.	377	La Saint-Marc.
Marcifulvipes.	* 396	De Saint - Marc à cuisses rouffes. <i>D. Geer.</i> . .
Minutissima.	387	L'Imperceptible.
Monilis.	376	La Cerclée.
Monoptera.	364	La Monoptère.
Motitatrix.	374	L'Agitée.
Nigra.	360	La Noire.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. Tipule brune à ailes
blanches.

Tipule des latrines.

. Tip. brune à ventre
de couleur verte
en devant. . . ead.

. ead.

Tipule des fleurs du
Lotier.

Tipule à Lunule. Tip. à ailes cendrées
avec une tache
blanche margi-
nale. ead.

. ead.

Tipule tachetée.

Tipule noire de
Saint - Marc. Hortulana.

Tip. de Saint-Marc
à cuisses rouffes.

. Tip. à pattes d'ar-
lequin. . . . ead.

. ead.

. Tipule à pattes en
formé d'antennes,
ornée d'un an-
neau blanc. . . ead.

. Tipule noire à ailes
brunes. . . . ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Nigra-Aquatica.	* 395	L'Aquatique noire. <i>D. Geer.</i>
Notata.	383	La Marquée.
Ocellaris.	362	L'Oculée.
Ochreata.	* 369	La Bigarrée. <i>Enum.</i>
Oleracea.	355	Le Tailleur.
Pallida.	* 389	La Pâle. <i>F.</i>
Pallipes.	* 391	La Pallipede. <i>F.</i>
Palustris.	385	Des Marais.
Pectinicornis.	350	La Pectinée.
Pedella.	* 394	La Bedeaude. <i>D. Geer.</i> .
Pennicornis.	388	La Plume.
Perficariæ.	383	De la Persicaire.
Phalænoïdes.	382	La Phalénoïde.
Phragmitidis.	* 369	Du Roseau commun. <i>Enum.</i>
Pilicornis.	* 390	La Pilicorne. <i>F.</i>
Pilicornis.	* 391	La Pilicorne. <i>F.</i>
Pilipes.	* 368	La Pilipede. <i>F.</i>
Pini.	* 395	Du Pin. <i>D. Geer.</i>
Plicata.	* 368	La Plissée. <i>Enum.</i>
Plicata.	* 402	La Papillaire. <i>Faun. Frid.</i>
Plumbea.	* 366	La Plombée. <i>F.</i>
Plumosa.	372	La Panachée.
Pomonæ.	* 389	La Fruitière. <i>F.</i>
Pratensis.	358	Des Prés.
Pulicaris.	387	La Puce.
6-Punctata.	* 366	La Six-Ponctuée. <i>F.</i> . . .
Punctata.	* 397	La Quadri-Ponctuée. <i>Geoff.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

T. aquatique noire.

. ead.

Tipule des prés.

Tipule à bords des
ailes bruns. . .

ead.

. ead.

. M. ead.

. ead.

Tipule Aurore à
taches noires.

ead.

Tipule Bedeaude.

ead.

. ead.

Tipule Phalénoïde.

Bibion à ailes fran-
gées & sans ta-
ches.

ead.

. M. ead.

. M. ead.

. M. ead.

Tipule du Pin.

.

Tipule de couleur
plombée à ailes
blanches. . .

ead.

Tipule annulaire.
Lege p. 379.

Tipule à corcelet
vert & point mar-
ginal noir sur les
ailes.

ead.

. ead.

. ead.

. ead.

. ead.

.

Tip. brune à quatre
points bruns sur
les ailes.

cvj TOM. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Punctata.	* 369	La Ponctué. <i>Enum.</i>
Puppivaga.	* 392	L'Errante. <i>Enum.</i>
Pusilla.	377	La Délicate.
Putris.	380	Des Immondices.
Quadrимaculata.	343	La Quadrимaculée. . . .
Quadrinodia.	* 402	Les Quatre-Nœuds. <i>Scop.</i>
Regelationis.	363	La Précoc.
Replicata.	364	La Repliée.
Reticulata.	* 397	La Rerticulée. <i>Geoff.</i> .
Rufipes.	386	La Rufipede.
Riparia.	* 403	Des Rivages. <i>Faun. Frid.</i>
Rivosa.	352	La Sinuée.
Scathopse.	* 398	Le Scatopse. <i>Geoff.</i> . .
Sericea.	387	La Soyeuse.
Sinuata.	* 365	L'échancrée. <i>F.</i>
Spinata.	* 402	L'Épineuse. <i>Faun. Frid.</i>
Stercoraria.	* 395	Du Fumier. <i>D. Geer.</i> .
Stictica.	* 388	La Bigarrée. <i>F.</i>
Tendens.	* 388	La Rusée. <i>F.</i>
Tenera.	* 402	La Délicate. <i>Faun. Frid.</i>
Terrestris.	359	La Terrestre.
Tesselata.	* 397	La Marquetée. <i>Geoff.</i> .
Thomæ.	379	La Thomas.
Transversalis.	* 372	La Transversale. <i>V.</i> . .
Tremula.	375	La Tremblante.
Triangularis.	* 365	La Triangulaire. <i>F.</i> . .
Tripunctata.	* 367	La Triponctué. <i>F.</i> . .
Turcica.	* 367	La Turquie. <i>F.</i>
Varia.	* 390	La Variée. <i>F.</i>
Variegata.	357	La Variéc.
Variegata.	* 398	La Variée.
Velata.	* 402	La Hériffée. <i>Faun. Frid.</i>
Venosa.	* 368	La Nerveuse. <i>Enum.</i> .
Verna.	* 392	La Vernale. <i>Enum.</i>
Veris.	* 402	La Précoc. <i>Faun. Frid.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.		ead.
Tip. à quatre taches.		ead.
Tip. à ailes pliées.		ead.
Tipule bigarrée,	T. à ailes reticulées.	ead.
Tipule à bandes.	Tipule à ailes pa-	
	nachées.	ead.
.	Scatopse noir.	ead.
.	ead.
T. noire du fumier.		ead.
.		ead.
.	Tipule à ailes en	
	Damier.	ead.
.		ead.
.		ead.
.		ead.
.		M. ead.
.		M. ead.
Tipule variée,		ead.
.	Tip. à pattes noires	
	& jamb. blanches.	

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Vernans.	* 390	La Vernale. <i>F.</i> . . .
Vibratoria.	375	La Vibrante. . . .
Virens.	376	La Verdâtre.
Viridula.	376	La Vive. . . .
Zonata.	* 389	L'Entourée. <i>F.</i> . . .

MUSCA.

MOUCHE.

Adunata.	* 540	L'Y.
Ænea.	* 420	La Semi-Bronzée <i>F.</i> . .
Ænea.	* 522	La Bronzée. <i>Scop.</i> . .
Æstiva.	* 547	De l'Été. <i>Faun. Frid.</i>
Æstivans.	503	L'Inquiete.
Æthiops.	* 421	L'Éthiopienne. <i>F.</i> . . .
Albipes.	* 426	L'Albipede. <i>Geoff.</i> . .
Albifrons.	472	La Frontale.
Albimana.	* 459	La Propre. <i>F.</i>
Albifeta.	* 517	La Vieille. <i>Scop.</i>
Alni.	* 514	De l'Aulne. <i>Scop.</i>
Amentaria.	* 477	Des Chatons. <i>Scop.</i>
Angelicæ.	* 475	De l'Angelique. <i>Scop.</i>
Anilis.	414	La Vieille.
Annulata.	* 540	La Mariée. <i>Geoff.</i> . . .
Annulata.	* 546	L'Entourée. <i>Enum.</i> . .
Annulata.	* 418	La Cerclée. <i>D. Geer.</i> .
Anthrax.	* 427	Le Charbon. <i>Enum.</i>
Apiaria.	* 432	La Pseudo-Abeille. <i>F.</i> .
Aphidioides.	* 523	L'Aphidioïde. <i>Scop.</i>
Apiformis.	* 455	L'Apiforme. <i>D. Geer.</i> .
Apiformis.	* 543	L'Apiforme. <i>Enum.</i>
Apivora.	* 480	L'Apivorne. <i>D. Geer.</i> .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. ead.
. ead.

. ead.
. ead.

. Mouche à antennes
en Y. *Ent. paris.*

. Bibio 4.
Némotele à genoux
jaunes.

. *M.* ead.
. Bibio 13.
. *M.* armée noire à
pattes blanches. Stratiomys
13.

. Syrphus 63.

. Bibio 8.

. Mouche verdâtre à
anneaux blancs
aux tarfes.

. An *Geoff.* 63.

Némotele à an-
neaux jaunes.

. Syrphus 5.

Mouche Abeille.

Mouche du nid des
Bourdons.

Cx Tom. III. NOMENCLATOR

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Aquatica.	*	538	L'Aquatique. <i>Geoff.</i> . .
Arbustorum.		436	Des Arbustes.
Arcuata.		440	L'Arquée.
Arcuata.	*	530	La Tranchée. <i>F.</i> . . .
Argirostoma.	*	544	La Riche. <i>Enum.</i>
Arnicae.		504	De l'Arnique.
Arnicae Scorpioides.	*	514	De l'Arnique Scorpioïde. <i>Scop.</i>
Arrogans.		496	L'Arrogante.
Affelliformis.	*	537	La Cloporte. <i>Geoff.</i> . .
Afiliformis.	*	456	L'Afiliforme. <i>F.</i> . . .
Aterrima.	*	548	Le Charbon. <i>V.</i>
Atra.	*	551	La Partagée. <i>V.</i>
Atrata.	*	426	Le Deuil. <i>F.</i>
Atropos.	*	460	Atropos. <i>Enum.</i>
Aurata.	*	547	La Dorée. <i>Faun. Frid.</i>
Aurata.	*	533	La Dorée. <i>F.</i>
Aurifrons.	*	549	La Riche. <i>V.</i>
Autumnalis.	*	480	L'Automnale. <i>D. Geer.</i> .
Balteata.	*	454	L'Alternée. <i>D. Geer.</i> .
Bicincta.		439	La Cordelière.
Bicolor.		511	La Bicolor.
Bidentata.	*	429	La Bidentée. <i>V.</i>
Bifasciata.	*	462	La Bifasciée. <i>Enum.</i>
Bilineata.	*	550	La Bilinéaire. <i>V.</i>
Bipunctata.	*	517	La Biponctué. <i>Scop.</i>
Bombylans.	*	429	La Grondeuse.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. Mouche à bord des
ailes jaunâtres &
trois points noirs
sur chacune.

.
Mouche Armée.
Lege p. 125.
Mouche imitant la
Guêpe, à longues
antennes.

Syrphus 15.

Syrphus 31.

M. ead.

Mouc. du Doronic.

. ead.

.
M. noire à deux
bandes blanches
sur les ailes.

Syrphus 24.

. Rhagio 11.

. *M. ead.*

Mouc. d'Automne. Corvina 21.

Mouche à bandes.
Mouche à bandes
jaunes alternati-
vement plus lar-
ges sur le ventre.

M. à deux bandes. Syrphus 30.

.
M. à corcelet vert
& ventre bleu.

. : Syrphus 1.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Buccata.	* 518	La Joufflue. <i>Scop.</i>
Cadaverina.	468	La Dorée.
Cæruleophtalmica.	* 513	Les Yeux-Bleus. <i>Scop.</i>
Cærulefcens.	* 464	La Bleuâtre. <i>V.</i>
Cæsar.	467	César.
Cæsarina.	* 473	La Céfarienne. <i>Scop.</i>
Canicularis.	488	La Caniculaire.
Canina.	* 481	La Canine. <i>F.</i>
Cannabina.	* 520	Du Chanvre. <i>Scop.</i>
Capitata.	* 524	La Grosse-Tête. <i>D. Geer.</i>
Cardui.	507	Du Chardon.
Carnaria.	470	La Carnivore.
Cellaris.	491	Des Celliers.
Cœmiteriorum.	489	Des Cimétieres.
Cerasi.	506	Des Bigarreaux.
Chamæleon.	404	Caméléon.
Characteristica.	* 541	La Caractéristique. <i>Geoff.</i>
Chorea.	* 526	La Danseuse. <i>F.</i>
Chrysoorrhæe.	* 522	L'Alchimiste. <i>Scop.</i>
Cibaria.	496	La Friande.
Ciliata.	* 428	La Ciliée. <i>V.</i>
Cimicoides.	* 527	La Cimicoïde. <i>F.</i>
Cincta.	* 419	L'Entourée. <i>D. Geer.</i>
Cincta.	* 424	La Noircie. <i>F.</i>
Cinerea.	510	La Cendrée.
Clauda.	* 463	La Boiteuse. <i>V.</i>
Clavata.	* 534	La Massue. <i>F.</i>
Clavicus.	* 545	L'Estropiée. <i>Enum.</i>
		<i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Petite Mouc. dorée.	Mouche dorée à corcelet bleu & ventre vert. .	ead.
M. dorée commune.	M. dorée commune.	ead.
.	B. ead. 10.
.	ead.
.	ead.
Mouc. à grosse tête.		
Mouc. du Chardon.	Mouche à zizzag sur les ailes. .	ead.
Grande Mouche vivipare.	La grande Mouche à extrémité du ventre rougeâtre.	ead.
.	La M. du Vinaigre.	ead.
.	ead.
M. des Bigarreux.	ead.
Stratiome - Camé- léon.	La Mouche-Armée à ventre plat, chargé de six lu- nules. . . .	Stratiom. r.
.	Mouc. à caractères noirs.	
.	ead.
.	M. ead.
Némotele à cein- ture.	Rhagio 12.
.	M. ead.

<i>D. Cinn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Claviformis.	* 537	La Claviforme. <i>Geoff.</i>
Clavipes.	409	La Clavipede.
Coalescens.	* 540	La Réunion. <i>Geoff.</i> . . .
Coccinea.	* 426	La Satinée. <i>Geoff.</i> . . .
Coleoptrata.	* 479	La Coléoptrée. <i>Scop.</i>
Colossus.	* 474	La Colossale. <i>Scop.</i>
Combinata.	502	La Combinée.
Compressa.	* 532	L'Aplatie. <i>F.</i>
Conopsoïdes.	414	La Conopsoïde.
Cerileti.	* 478	Des Coudriers. <i>Scop.</i>
Corni.	* 475	Du Cornouiller. <i>Scop.</i>
Corrigiolata.	496	L'Étroite.
Crabroniformis.	* 428	La Crabroniforme. <i>V.</i>
Craffipes.	* 461	La Craffipede. <i>Enum.</i>
Cribrata.	* 547	La Criblée. <i>V.</i>
Cristata.	* 527	La Huppée. <i>F.</i>
Cruciata.	* 543	La Croisée. <i>Geoff.</i>
Cruentata.	* 462	L'Enfanglantée. <i>Geoff.</i> .
Cucularia.	497	La Compagne.
Cupraria.	493	La Cuivreuse.
Curforia.	* 516	La Coureuse. <i>Scop.</i>
Cyanea.	* 547	L'Azurée. <i>Faun. Frid.</i>
Cylindrica.	* 525	La Cylindrique. <i>D. Geer.</i>
Cynipsea.	501	La Cynipsoïde.

D. Geer.

D. Geoff.

Fab.

o	Mouche à corcelet noir, à gros ven- tre jaune & ailes fumées.	
o	M.-Armée noire, à ventre & cuisses jaunes.	Stratiom. II.
o	Mouche à antennes réunies.	
o	M. - Armée à cor- celet rouge fatiné.	Stratiom. 2.
o		ead.
o		M. ead.
o		Syrphus 38.
o		ead.
o		M. ead.
o	Mouc. jaune à ailes bleuâtres & croi- sées.	
o	M. noire à bande rouge transverse sur le ventre.	
o		ead.
Némotele cuivreu- se.	Mouche dorée à tache brune sur les ailes.	ead.
Mouc. cylindrique.		M. Brassica- ria.
Mouche Cinipsoïde.		ead.
		h ij

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Call.</i>
Dauci.	* 534	De la Carotte. <i>F.</i> . . .
Deceptoria.	* 512	La Trompeuse. <i>Scop.</i>
Denigrata.	409	La Noircie.
Depressa.	* 548	L'Aplatie. <i>V.</i>
Devia.	441	L'Égarée.
Diadema.	413	Le Diadème.
Diaphana.	* 528	La Diaphane. <i>F.</i> . . .
Diophtalma.	442	La Diophtalme.
Dioscoidea.	* 534	La Dioscoïde. <i>F.</i> . . .
Domestica Minor.	* 524	La petite Mouche Domestique. <i>D. Geer.</i> . . .
Domestica.	471	La Domestique.
Dorsalis.	* 530	La Dorsale. <i>F.</i> . . .
Elata.	* 482	L'Hydrocéphale. <i>F.</i> . .
Elegans.	* 464	L'Élégante. <i>V.</i>
Elongata.	* 549	L'Alongée. <i>V.</i>
Elongata.	* 457	L'Alongée. <i>F.</i>
Erratica.	444	L'Errante.
Erythrocephala.	* 534	L'Erythrocéphale. <i>F.</i> . .
Æstivationis.	488	De l'Été.
Falcata.	* 513	La Courbée. <i>Scop.</i>
Fallax.	438	La Trompeuse.
Fallax.	* 542	La Trompeuse. <i>Geoff.</i> .
Fasciata.	* 419	La Fasciée. <i>D. Geer.</i> . .
Fasciata.	* 424	La Fasciée. <i>F.</i>
Fasciata.	* 546	La Fasciée. <i>Faun. Frid.</i> .
4-Fasciata.	* 528	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . .
4-Fasciata.	* 536	La Quadrifasciée. <i>Geoff.</i> .
5-Fasciata.	* 536	La Cinqfasciée. <i>Geoff.</i> .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

ead.

Syrphus 34.

Rhagio 10.

ead.

Syrphus 45.

Mantiff.

Petite Mouche Domestique.

Grande Mouche Domestique.

ead.

ead.

ead.

Syrphus 42.

M. ead.

M. à derriere roux. Syrphus 26.

Mouche noire avec un trait noir sur la moitié du bord extérieur de l'aile.

Némotele à bandes.

Rhagio 5.

ead.

Mouc. jaune à quatre bandes brunes sur les ailes.

Mouc. noire à cinq bandes noires sur les ailes.

cxviii Tom. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fasciolata.	* 455	La Fasciolée. <i>D. Geer.</i>
Femorata.	453	La Difforme.
Fenestralis.	410	Des Fenêtres.
Festinans.	* 523	La Vive. <i>Scop.</i>
Festiva.	444	L'Agréable.
Fera.	484	La Farouche.
Ferruginea.	* 417	La Rouillée. <i>Scop.</i>
Fimetaria.	498	Du Fumier.
Fimetorum.	* 542	Des Fumiers. <i>Geoff.</i>
Flava.	502	La Jaune.
Flavescens.	* 433	La Jaunâtre. <i>Geoff.</i>
Flavicans.	* 547	La Jaunâtre. <i>Faun. Frid.</i>
Flavicornis.	* 458	La Flavicorne. <i>F.</i>
Flavipes.	* 419	La Flavipede. <i>D. Geer.</i>
Flavipes.	* 425	La Bizarre. <i>F.</i>
Florea.	434	La Flore.
Florescentiæ.	508	De la Floraison.
Formosa.	* 417	La Belle. <i>Scop.</i>
Frit.	492	Du Frit.
Frondefcentiæ.	509	De la Foliaison.
Frutetorum.	* 456	Des Taillis. <i>F.</i>
Fulvipes.	* 541	La Fulvipede. <i>Geoff.</i>
Fumigata.	* 477	L'Enfumée. <i>Scop.</i>
Funebis.	* 483	La Funebre. <i>F.</i>
Fungorum.	* 478	Des Champignons. <i>Scop.</i>
Furta.	472	La Voleuse.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

M. à bandelettes.

..... Syrphus 37.
Némotele des Fe-
nêtres. ead.

Mouche à bandes
citron.

Mouche imitant la
Guêpe à courtes
antennes.

Syrphus 47.

.....

M. noire à ventre
jaune, noir dans
le milieu.

ead.

.....
.....

Mouc. noire à ailes
brunes & yeux
rouges.

ead.

Mouche jaune.

Mouche jaune aux
yeux noirs.

ead.

.....

Volucelle à ventre
jaunâtre.

..... Syrphus 49.
Némotele à jambes
jaunes.

..... Rhagio 7.
Mouche des Fleurs. Syrphus 11.

..... ead.

..... Syrphus 17.
..... Mouche noire à
pattes fauves.

..... M. ead.
Mouche des Cham-
pignons.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fufca.		511	La Brune.
Fufca.	*	461	La Brune. <i>Enum.</i>
Geniculata.	*	526	La Coudée. <i>D. Geer.</i> .
Geographica.	*	538	La Géographie. <i>Geoff.</i> .
Germinationis.		505	La Printaniere.
Gibbosa.	*	525	La Boffue. <i>D. Geer.</i> . .
Gibbosa.		446	La Boffue.
Glaucia.		445	La Verdâtre.
Globosa.	*	458	La Ronde. <i>F.</i>
Globulipes.	*	541	L'Eftrapiée. <i>Geoff.</i> . . .
Graminum.	*	530	Des Graminées. <i>F.</i> . .
Grifea.		511	La Grife.
Groffa.		485	La Groffe.
Groffificationis.		500	Des Pépinieres.
Groffipes.		453	La Monftrueufe.
Guttata.	*	541	L'Étoilée. <i>Geoff.</i> . . .
Hæmorrhoidalis.	*	548	L'Hémorrhoidale. <i>V.</i>
Hederacæ.	*	535	Du Lierre. <i>Geoff.</i> . . .
Helenii.	*	536	De l'Inule Héléniere. <i>Geoff.</i>
Heraclei.		507	De la Berce.
Hieracii.	*	532	De l'Éperviere. <i>F.</i> . .
Hirfuta.	*	427	La Velue. <i>V.</i>
Hirfuta.		509	La Velue.
Hirta.	*	420	La Velue. <i>D. Geer.</i> . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. Mouche brune à
bandes transver-
ses blanchâtres
sur le ventre.

Némotele à genoux
jaunes.

. Mouche à ailes géo-
graphiques.

. ead.

Mouche bossue,

. Syrphus 55.

. Syrphus 53.

. Syrphus 56.

. Mouc. à tarfes an-
térieurs très-gros.

. ead.

Mouc. gigantesque. N°. 30. ead.
& non 4.

. M. à ailes noires &
tache blanche à
l'extrémité. . . ead.

. M. à tache blanche
sur le ventre.

. M. noire à base des
ailes & du ventre
fauve.

. Mouc. à ailes reti-
culées avec deux
taches noires.

. ead.

Némotele velue,

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Hortulana.	* 519	Des Jardins. <i>Scop.</i>
Hottentotta.	410	La Hottentotte.
Hydroleon.	406	Hydroléon.
Hyoscyami.	504	De la Jusquiame.
Hypoleon.	407	Hypoléon.
Ichneumonoides.	* 543	L'Ichneumonoïde. <i>Geoff.</i> .
Ichneumonea.	442	L'Ichneumon.
Inanis.	465	La Vide.
Intersecta.	* 539	L'Entrecoupée. <i>Geoff.</i> .
Intricaria.	437	L'Embrouillée.
Iridata.	* 516	De l'Iris. <i>Scop.</i>
Labiata.	* 532	La Labiée. <i>F.</i>
Lacustris.	* 519	Des Étangs. <i>Scop.</i> . . .
Lamed.	* 545	Le Lamed. <i>Enum.</i>
Lappona.	431	La Laponne.
Larvarum Minor.	* 524	La petite Mouche des Chenilles. <i>D. Geer.</i> . . .
Larvarum.	487	Des Larves.
Larvata.	* 537	La Masquée <i>Geoff.</i> . . .
Latro.	* 533	La Fripponne. <i>F.</i> . . .
Leucocephala.	* 550	La Leucocéphale. <i>V.</i>
Libatrix.	* 521	La Prudente. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Némol. Hottentotte.		Bibio 16.
Stratiome - Hydro- léon.	Mouche - Armée à ventre vert.	Stratiom. 7.
Mouc. du Pifénlit.		Umbellata- rum.
.	Mouche - Armée noire, à taches jaunes.	Stratiom. 10.
.	M. noire à pattes jaunes & ventre alongé, semblable à un Ichneumon.	
.	Syrphus 39.
.	La Némot. à bande.	ead.
.	M. à corcelet noir taché de jaune & ventre jaune à bandes noires.	
Mouc. Embrouillée.		Syrphus 22.
.	M. ead.
Némotele bronzée.		
Mouche Laponne.		Syrphus 4.
Petite Mouche des Chenilles.		
Grande Mouche des Chenilles.		ead.
.	M. cendrée à quatre bandes noires sur les ailes, dont la troisième est divi- sée en deux.	
.	ead.

cxxiv *Tom. III. NOMENCLATOR.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lineata.	* 423	La Tracée. <i>F.</i>
Lineata.	* 531	L'Ictérique. <i>F.</i>
Lineata.	* 539	La Rayée <i>Geoff.</i>
Longicornis.	* 425	La Longicorne. <i>F.</i>
Longicornis.	* 458	La Longicorne. <i>Geoff.</i>
Longipes.	* 478	La Difforme. <i>Scop.</i>
Longipes.	* 542	La Longipede. <i>Geoff.</i>
Lucida.	* 522	La Luifante. <i>Scop.</i>
Lucorum.	439	La Sauvage.
Lugubris.	* 421	La Lugubre. <i>F.</i>
Lugubris.	* 458	La Lugubre. <i>F.</i>
Lunula.	* 433	La Lunaire. <i>V.</i>
Lupulina.	* 483	Du Houblon. <i>F.</i>
Luteola.	* 523	La Jaunâtre. <i>Scop.</i>
Lychnidis.	* 535	Du Lichnis. <i>F.</i>
Maculata.	* 425	La Tachetée. <i>F.</i>
Maculata.	* 418	La Tachetée. <i>D. Geer.</i>
Maculata.	* 433	La Tachetée.
Maculata.	471	La Tachetée.
4-Maculata.	* 533	La Quadrimaculée. <i>F.</i>
Marginalis.	* 542	La Marginale. <i>Geoff.</i>
Marginata.	* 421	La Bordée. <i>F.</i>
Marginata.	* 528	La Bordée. <i>F.</i>
Maritima.	* 520	La Maritime. <i>Scop.</i>
Martia.	* 474	La Printanière. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • •		Rhagio 4.
• • • • •		ead. 95 &
• • • • •		non 91.
• • • • •	Mouche dorée à	
	trois paires de	
	raies blanches sur	
	le ventre.	
• • • • •		Rhagio 9.
• • • • •	M. à tache brune	
	sur le bord de	
	l'aile & point noir	
	au milieu.	
• • • • •	M. à point marginal	
	sur les ailes &	
	pattes jaunes.	
• • • • •		Syrphus 25.
• • • • •		M. Bibio 8.
• • • • •		Syrphus 50.
• • • • •		M. ead.
• • • • •		M. ead.
• • • • •		Rhagio 8.
Némotele à tache		
jaune sur les ailes.		
• • • • •	La Volucelle à ta-	
	che noire. <i>Ent.</i>	
	<i>parif.</i>	
Mouche tachetée.	• • • • •	Vulpina.
• • • • •		M. ead.
• • • • •	M. à point marginal	
	brun sur les ailes.	
• • • • •		Bibio 6.
• • • • •		ead.

cxxvj *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gali.</i>
Maura.	409	La Maure.
Meditabunda.	* 527	La Quadriponctué. <i>F.</i> . .
Melanura.	* 484	La Mélanure. <i>Enum.</i>
Mellina.	450	La Mielleuse.
Menthastri.	448	De la Menthe.
Metallina.	* 458	La Métallique. <i>F.</i>
Meteorica.	491	La Météorique.
Meticulosa.	* 520	La Méticuleuse. <i>Scop.</i>
Meridiana.	467	La Méridienne.
Merulina.	* 520	La Noire. <i>Scop.</i>
Microleon.	405	Microléon.
Minuta.	* 535	La Petite. <i>F.</i>
Morio.	408	Le Morio.
Mortuorum.	468	La Chrysoféphale.
Muraria.	* 515	Des Murs. <i>Scop.</i>
Murina.	* 461	La Souris. <i>Enum.</i>
Musitans.	* 431	La Bruyante. <i>F.</i>
Mutabilis.	441	La Variable.
Mutica.	* 423	La Défarmée. <i>F.</i>
Mystacea.	430	Le Pseudo-Bourdon. . . .
Nectarea.	416	La Friande.
Nectarea.	* 460	Des Nectaires. <i>F.</i>
Nemorum.	435	Des Bois.
Nigra.	* 420	La Noire, <i>D. Geer.</i> . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Némotele maure.	Bibio 12.
.	ead.
Mouche mielleuse.	Mouche à points jaunes triangulai- res sur le ventre.	Syrphus 61.
M. de la Menthe.	M. à pointe du cor- célet & bandes sur le ventre de cou- leur jaune. . .	Syrphus 59.
.	Syrphus 52.
Mouc. des Vaches.	ead.
Mouc. Méridienne.	Mouc. noire à base des ailes jaunes.	ead.
Stratione - Micro- léon.	M. armée à ventre plat & brun. . .	Stratiom. 3.
.	M. ead.
Némotele Éthio- pienne.	M. à ailes noires bordées de blanc ondé.	Bibio 11.
Mouc. à tête dorée.	ead.
.	Syrphus 3.
.	Syrphus 33.
.	Stratiom. 14.
Mouche - Bourdon.	Syrphus 2.
.	M. Syrp. 74.
Mouc. des jardins.	M. cendrée à ban- des blanches sur le ventre & deux grandes taches jaunes sur le pre- mier anneau. .	Syrphus 13.
Némotele noire.		

cxxxviii *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Nigra.	* 432	La Noire. <i>Geoff.</i> . . .
Nigricans.	509	La Noirâtre.
Nigrita.	* 475	La Négresse. <i>Scop.</i>
Nitens.	* 549	La Brillante. <i>V.</i>
Nobilitata.	* 421	La Livrée. <i>F.</i> . . .
Nobilitata.	495	La Noble.
Noctiluca.	445	La Phosphorique. . . .
Notata.	* 527	La Rayée. <i>F.</i>
Nova.	* 427	La Nouvelle. <i>Enum.</i>
Oestracea.	437	L'Oestre.
Onopordinis.	* 531	Du Pédane. <i>F.</i>
Oppidana.	* 523	L'Espion. <i>Scop.</i>
Orbicula.	* 459	La Sphérique. <i>F.</i> . . .
Orbiculata.	* 539	L'Orbiculée. <i>Geoff.</i> . .
Ornithovora.	* 518	L'Ornithovore. <i>Scop.</i>
Pallida.	* 42	La Pâle. <i>F.</i>
Pallida.	509	La Pâle.
Palustris.	* 521	Des Marais. <i>Scop.</i>
Pantherina.	407	La Panthere.
Parietina.	499	La Marbrée.
Pellucens.	466	La Transparente. . . .
Pelluceus.	* 432	La Talqueuse.
Pendula.	433	La Pendante.
Personnata.	* 537	La Déguisée. <i>Geoff.</i> . .
Petronella.	494	La Courtisane.
Pinastri.	* 454	Du Pin. <i>D. Geer.</i> . . .
Pipiens.	451	La Crieuse.
		<i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. La Volucelle à ventre tout noir.

. Bibio 7.

. Mouc. verte cuivreuse à ailes mi-partie de brun & de blanc. . .

ead.

. Syrphus 54.

. ead.

Mouche Oefstre. Syrphus 23.

. ead.

. M. Syr. 65.

. M. à points jaunes sur le ventre.

. M. ead.

. Mouche à ailes marbrées. . . ead.

M. Transparente. La Voluc. à ventre blanc en devant. ead.

Deleatur.

Mouche Pendante. M. à corcelet strié & bandes jaunes interrompues sur le ventre. . .

Syrphus 10.

. M. cendrée à points & ailes marbrées.

ead.

Mouche du Pin.

Mouche Crieuse. M. à grosses cuisses. Syrphus 65.

Insect. Tomus IV.

i

D. Linn. Pag. Gall.

Pirastri.	447	Du Rosier.
Placida.	* 547	La Tranquille. <i>Faun. Frid.</i>
Plebeia.	404	La Plébéïenne. . . .
Plebeia.	* 482	La Plébéïenne. <i>F.</i> . .
Plombea.	* 463	La Plombée. <i>Geoff.</i> . .
Plumata.	430	Le Plumet.
Plumipes.	* 515	La Plumipede. <i>Scop.</i>
Pluvialis.	489	La Pluviale.
Podagrica.	* 457	La Podagre. <i>F.</i> . . .
Pœcilopectera.	* 545	La Péciloptère. <i>Enum.</i>
Polita.	493	La Lisse.
Potentillæ.	510	De la Potentille.
Præceps.	* 514	L'Agile. <i>Scop.</i>
Pubera.	494	La Nubile.
Pulicaria.	* 543	La Puce. <i>Geoff.</i> . . .
Pullata.	* 547	La Pauvre. <i>Faun. Frid.</i>
Punctata.	* 545	La Ponctué. <i>Enum.</i>
Punctulata.	* 479	La Pointillée. <i>Scop.</i> . .
Punctata.	* 465	La Pointillée. <i>Faun. Frid.</i>
Punctata.	* 424	La Ponctué. <i>F.</i> . . .
5-Punctata.	* 545	La 5-Ponctué. <i>Enum.</i>
Putris.	492	Du Fromage.
Quadripunctata.	503	La Quadriponctué. . . .
Radicum.	487	Des Racines.
Rara.	* 416	La Rare. <i>Scop.</i>
Resinella.	* 546	De la Ph. Résinelle. <i>Enum.</i>
Reticulata.	* 529	La Réticulée. <i>F.</i> . . .
Ribesii.	446	Du Groseiller.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Mouche du Rosier. Mouche à six taches
blanches en croi-
sant sur le ventre. Syrphus 58.

. Bibio 5.
. ead.

. M. brune bronzée.
Mouche à plumet.

Mouc. de la pluie. Mouche cendrée à
points noirs. . ead.
. Syrphus 43.

Némotele dorée. ead.

. ead.
. M. noire à pattes
jaunes & bord
des ailes exté-
rieur noir.

Mouche panachée.

. M. Rhag. 10.

. ead.

. ead.

. ead.

. M. à ailes reticu-
lées à bandes? . ead.

M. du Groseiller. M. à 4 bandes jau-
nes sur le ventre
dont la première
est interrompue. Syrphus 57.
i ij

cxxxij *Tom. III. NOMENCLATOR*

D. Linn. Pag. Gall.

Roralis. 490 La Matinale.

Rosarum. * 460 Des Rosiers. *F.*

Rostrata. * 528 Le Museau. *F.*

Rotundata. 486 L'Arrondie.

Rufa. * 418 La Rouffe. *D. Geer.*

Rufa. * 476 La Rouffe. *Scop.*

Ruficornis. * 458 La Ruficorne. *F.*

Rufifrons. * 529 La Timide. *F.*

Rufiventris. * 476 La Xanthrogastrique. *Scop.*

Rufo-maculata. * 525 La Rouffie. *D. Geer.*

Rustica. * 482 La Rustique. *F.*

Sabaea. * 422 La Savoyarde. *F.*

Saltatrix. 454 La Sauteuse.

Saluum. 500 Des Bois.

Scolopacea. 411 La Bécasse.

Scolopacina. * 429 La Bécassine. *V.*

Scripta. 449 L'Imprimée.

Scybalaria. 497 Des Immondices.

Segnis. 452 L'Indolente.

Semiluctifera. * 463 Le Demi-Deuil. *V.*

Seminationis. * 530 La Pointillée. *F.*

Sepulcralis. 473 La Sépulcrale.

Serrata. 490 Des Latrines.

Serratulæ. 503 De la Sarrete.

Sericea. * 540 La Soyeuse. *Geoff.*

Sexdentata. * 423 La Sixdentée. *F.*

Sigmoidæa. * 535 Le Zigzag. *Geoff.*

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

• • • • • ?	Mouc. toute noire.	
	<i>Lege</i> page 532.	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>M. Syrp.</i> 71.
• • • • •	• • • • •	ead.
Mouche arrondie.	Mouc. noire à ventre hémisphérique roux, tacheté de noir.	ead.
Némotele rousse.		
Mouche rousse.		
• • • • •	• • • • •	<i>Syrphus</i> 48.
• • • • •	• • • • •	ead.
M. à taches rousses.	• • • • •	<i>Lateral.</i> ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	<i>Bibio</i> 18.
<i>Deleatur</i> n°. 512.	Mouche jaune à bandes noires?	
Némotele Bécasse.	• • • • •	<i>Rhagio</i> 1.
• • • • •	• • • • •	<i>Syrphus</i> 62.
• • • • •	• • • • •	ead.
Mouc.-à-Segment.	M. dorée à ventre brun & noir.	<i>Syrphus</i> 36.
• • • • •	• • • • •	ead. <i>Musca</i> 90 & non 96.
Mouc. des latrines.	• • • • •	ead.
• • • • •	• • • • •	ead.
• • • • •	Mouc. cuivreuse à pattes blanches.	
• • • • •	• • • • •	<i>Stratiom.</i> 12.
• • • • •	M. à ailes reticulées avec une tache en zigzag.	

cxxxiv *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Smaragdina.	* 540	La Chlorocéphale. . .
Solstitialis.	507	De la Bardane. . . .
Sonchi.	505	Du Laitron.
Spatula.	* 417	La Spatule. <i>Scop.</i>
Speculifera.	* 464	Porte-Miroir. <i>V.</i>
Sphegea.	* 457	La Sphégiforme. <i>F.</i> . .
Spinifera.	* 541	La Porte-Épine. <i>Geoff.</i> .
Spinipes.	* 517	La Spinipede. <i>Scop.</i>
Splendens.	* 424	La Brillante. <i>F.</i> . . .
Squamata.	* 547	L'Écailleuse. <i>Faun. Frid.</i>
Stellata.	* 535	L'Astérique. <i>Geoff.</i> . .
Stercoraria.	498	La Merdivore. . . .
Strigata.	* 422	La Sillonnée. <i>F.</i> . . .
Strumosa.	* 518	La Scrophuleuse. <i>Scop.</i>
Stylata.	* 529	Le Stilet. <i>F.</i>
Subsultans.	489	La Sautillante. . . .
Suecica.	510	La Suédoise.
Sylvarum.	439	La Sauvage.
Syngenesiæ.	* 531	De la Syngénésie. <i>F.</i> .
Tarda.	411	La Lourde.
Tan.	* 484	Le Tan. <i>Enum.</i>
Temula.	* 513	Du Cerfeuil. <i>Scop.</i>
Tenax.	436	Le Pourceau.
Tentaculata.	* 481	La Tâteuse. <i>D. Geer.</i> .
Terrestris.	500	La Terrestre.
Tesselata.	* 537	L'Échiquier. <i>Geoff.</i> . .
Testacea.	* 481	La Fauve. <i>D. Geer.</i> . .
Thymastri.	* 459	Du Thym. <i>F.</i>
Tigrina.	* 422	La Tigrée. <i>F.</i>
Tigrina.	* 526	La Dénaturée. <i>F.</i> . . .
Tipulæa.	* 542	La Tipule. <i>Geoff.</i> . . .
Tipuliformis.	* 425	La Tipuliforme. <i>F.</i> . .
Transfuga.	448	La Transfuge.

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Mouc. à tête verte. <i>Ent. parif.</i>	
Mouche de la Bar- dane.	Mouche des têtes de Chardons.	ead.
.	Syrphus 40.
.	Mouche noire à pattes épineuses.	
.	<i>M. Strat.</i> 3.
.	Mouche-à-l'Étoile.	
Mouc. Merdivore.	Mouc. Merdivore.	ead.
.	Stratiom. 4.
.	ead.
.	ead.
.	Syrphus 27.
.	ead.
Mouche Pourceau.	Mouche Apiforme.	Syrphus 19.
Mouche-à-Barbes.		
.	Mouche à ailes reti- culées de brun.	
Mouche fauve.	ead.
.	Syrphus 60.
.	Stratiom, 6.
.	ead.
.	<i>M. grise</i> à pattes longues & jaunes.	
.	<i>Rhagio</i> 6.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Tremula.	486	Du Tremble.
Trifasciata.	* 483	La Trifasciée. <i>Enum.</i>
Trilineata.	406	La Rayée.
Trimaculata.	* 536	La Trimaculée. <i>Geoff.</i>
Tringaria.	413	La Triplée.
Tuberculata.	* 428	La Tuberculée. <i>V.</i>
Tuberculata.	* 550	La Tuberculée <i>V.</i>
Tuguriorum.	* 474	Des Chaumieres. <i>Scop.</i>
Tussilaginis.	* 531	Du Tussilage. <i>F.</i>
Uliginosa.	415	Des Marais.
Umbelliferarum.	* 523	Des Ombellifères. <i>Scop.</i>
Umbrarum.	499	La Délicate.
Unguicornis.	* 477	L'Armée. <i>Scop.</i>
Ungulata.	495	La Crochue.
Urticæ.	506	De l'Ortie.
Vacua.	* 521	L'Affamée. <i>Scop.</i>
Variegata.	* 473	La Variée. <i>Scop.</i>
Vermileo.	412	Le Ver-Lion.
Vernicina.	* 514	La Vernissée. <i>Scop.</i>
Vespiiformis.	443	La Vespiforme.
Vibrans.	501	La Vibrante.
Viduata.	494	La Veuve.
Virens.	* 518	La Verdâtre. <i>Scop.</i>
Viridata.	* 423	La Verte. <i>F.</i>
Viridescens.	* 548	La Verdâtre. <i>V.</i>
Viridescens.	* 463	La Verdâtre. <i>V.</i>
Violacea.	* 516	La Violette. <i>Scop.</i>
Vivipara minor.	* 480	La petite Vivipare. <i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. ead.
 M.-Armée jaune à
 bandes noires. . Stratiom. 9.
 M. à ailes jaunes,
 chargées de points
 & de trois taches
 brunes.

. Rhagio 2.
Lege 9-Maculata,
 la 9-Maculée.

. ead.
 M. Strat. 20.

. ead.

Némotele bronzée. Mouche dorée à
 trois nervures sur
 les ailes. . . . ead.
 ead.

Ném. du Ver-Lion. Rhagio 3.

Mouche-Guêpe. Syrphus 46.
 Mouche vibrante. M. à ailes vibrantes
 ponctuées. . . ead.
 ead.

Lege Viridula. . . ? Stratiomys 8
L. Erythrocephala,
 l'Erythrocéphale. Viridula.

Petite Mouc. Vivi-
 pare.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Vomitoria.	469	La Nauséabonde. . . .
Vorax.	* 539	La Vorace. <i>Geoff.</i> . . .
Zonaria.	* 483	La Cerclée. <i>Enum.</i> . . .

T A B A N U S.

Albipes.	* 561	L'Albipede. <i>Enum.</i>
Alpinus.	* 556	L'Alpin. <i>Scop.</i>
Arcticus.	* 561	L'Arctique. <i>Enum.</i>
Autumnalis.	552	De l'Automne. . . .
Bidentatus.	* 560	Le Bidenté. <i>F.</i> . . .
Bifasciatus.	* 557	Le Bifascié. <i>Geoff.</i> . . .
Bispinosus.	* 560	L'Épineux. <i>F.</i> . . .
Borealis.	* 560	Le Norvégien. <i>F.</i> . . .
Bromius.	553	Le Bruyant. . . .
Bovinus.	551	Des Bœufs. . . .
Cæcutiens.	555	L'Aveuglant. . . .
Fasciatus.	* 560	Le Rayé. <i>D. Geer.</i> . . .
Ferus.	* 556	Le Cruel. <i>Scop.</i>
Haustellatus.	* 558	Le Bombyloïde. <i>F.</i> . . .
Hirsutus.	* 561	Le Hérissé. <i>V.</i>
Intersectus.	* 558	L'Entrecoupé. <i>Geoff.</i> . . .
Italicus.	* 559	L'Italien. <i>F.</i> . . .
Lugubris.	556	Le Lugubre. . . .

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Mouche bleue de la viande.	Mouche bleue de la viande. . .	ead.
.	Mouche brune à huit taches jaunes oblongues sur le ventre.	
.	Mouche-à-Zones,	
.	id. 5.
.	id. 25.
.	Taon à deux bandes noires sur les ailes.	
.	id. 26.
.	id. 21.
Taon tacheté	id. 14.
Taon des Bœufs.	Taon à ventre jaunâtre & taches triangulair. blanches.	id. 3.
Taon Aveuglant.	Taon brun à côtes du ventre jaunes & ailes tachetées de noir.	id. 27.
Taon rayé.		
.	id. 2.
.	Taon noir à anneaux du ventre bordés de blanc.	
.	id. 15.
.	id. 28.

cxl TOM. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Maritimus.	* 557	Le Maritime. <i>Scop.</i> . .
Morio.	556	Le Morio.
Paganus.	* 559	Le Villageois. <i>F.</i> . .
Pellucens.	* 559	Le Transparent. <i>F.</i> . .
Pluvialis.	554	Le Pluvial. . . .
Rufus.	* 557	Le Roux. <i>Scop.</i>
Ruficus.	552	Le Rustique. . . .
Salinarius.	* 557	Des Salines. <i>Scop.</i>
Tarandicus.	552	Des Rennes. . . .
Tropicus.	553	Le Tropicque. . . .

C U L E X.

Annulatus.	* 565	L'Annulaire. <i>F.</i> . .
Bifurcatus.	563	Le Fourchu. . . .
Ciliaris.	563	Le Cilié.
Equinus.	564	Des Chevaux. . . .
Fasciatus.	* 566	Le Fascié. <i>Faun. Frid.</i>
Flavescens.	* 566	Le Jaune. <i>Faun. Frid.</i>
Lutescens.	* 565	Le Jaunâtre. <i>F.</i> . .
Morio.	* 565	Le Morio. <i>F.</i> . . .
Pipiens.	562	Le Commun. . . .
Pulicaris.	564	Le Pygmée. . . .
Reptans.	564	Le Rampant. . . .
Stercoreus.	565	Le Sercoral.
Variegatus.	* 566	Le Varié. <i>Enum.</i>

E M P I S.

Acephala.	* 572	L'Acéphale. <i>V.</i>
Æstiva.	* 574	La Caniculaire. <i>Scop.</i>
Aurata.	* 571	La Dorée. <i>V.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

.	Taon à une seule bande noire pa- nachée.	
.	id. 18.
Taon Pluvial.	Taon à ailes brunes, piquées de blanc.	id. 12.
.	Taon gris, à jambes fauves.	id. 23.
.	id. 17.
Taon Tropicque.	id. 8.
.	id. 20.
.	<i>M.</i> id. 2.
.	id. 2.
.	id. 7.
.	id. 3.
.	id. 6.
Cousin commun.	Cousin commun.	id. 1.
.	Cousin à trois ta- ches sur les ailes.	id. 4.
.	id. 5.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Borealis.	567	La Boréale.
Ciliata.	* 570	La Ciliée. <i>F.</i>
Cinerea.	570	La Pallipede. <i>F.</i>
Cinerea.	* 573	La Cendrée. <i>Scop.</i>
Craffipes.	* 570	La Craffipede. <i>Enum.</i>
Dubia.	* 574	L'Incertaine. <i>Scop.</i>
Ferruginea.	* 573	La Ferrugineuse. <i>Scop.</i>
Flava.	* 571	La Jaune. <i>Faun. Frid.</i>
Flavipes.	* 572	La Flavipede. <i>V.</i>
Forcipata.	568	L'Appendiculée.
Fulcrata.	* 574	La Printanière. <i>Scop.</i>
Lineata.	* 571	La Rayée. <i>V.</i>
Livida.	568	La Livide.
Maculata.	* 569	La Tachetée. <i>F.</i>
Marginata.	* 570	La Bordée. <i>F.</i>
Maura.	* 569	La Maure. <i>F.</i>
Mucronata.	* 572	La Pointue. <i>Scop.</i>
Nigra.	* 571	La Noire. <i>V.</i>
Pennipes.	567	La Plumipede.
Punctata.	* 573	La Ponctué. <i>Scop.</i>
Setosa.	* 573	La Soyeuse. <i>Scop.</i>
Stercorea.	569	La Stercorale.

C O N O P S.

Aculeata.	578	Le Piquant.
Atomaria.	580	Le Pointillé.
Atra.	* 583	Le Charbonnier. <i>F.</i> . . .
Buccata.	581	L'Enflé.
Calcitrans.	576	Le Féroce.
Cinerea.	* 585	Le Cendré. <i>V.</i>
3-Fasciata.	* 582	Le Trifascié. <i>D. Geer.</i> .
Flavipes.	579	Le Flavipede.
Ferruginea.	579	Le Ferrugineux.
Hexagona.	* 584	L'Exagone. <i>Faun. Frid.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Empis Boréale. ead. 1.
 M. ead.
 ead. 6.

. ead. 3.

Empis livide. ead. 5.
 ead. 7.
 M. ead.
 ead. 4.

. ead. 2.

. ead. 8.

Conops à quatre
 bandes, ead. 2.

. Myopa 3.

. Myopa 5.

Mouche piqueuse. Le Stomoxe. . . Stomoxys 4.

Con. à trois bandes. ead. 5.

. L'Asile panaché de
 fauve & de noir,
 à ailes noires. . Myopa 1.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Irritans.	577	Le Méchant.
Lineata.	* 583	Le Rayé. <i>F.</i>
Lutea.	* 585	Le Jaune. <i>V.</i>
Macrocephala.	578	Le Macrocéphale. . . .
Nigra.	* 582	Le Noir. <i>D. Geer.</i> . . .
Palustris.	* 584	Des Marais. <i>Scop.</i> . . .
Petiolata.	580	Le Pétiolé.
Punctata.	* 584	Le Ponctué. <i>V.</i>
Pungens.	* 583	Le Méchant. <i>F.</i>
Rostrata.	576	Le Porte-Cône.
Rufipes.	* 582	Le Rufipede. <i>F.</i>
Sericea.	* 585	Le Soyeux. <i>V.</i>
Siberita.	* 583	Le Demi-Transparent. <i>F.</i>
Subcoleoptrata.	581	Le Déguisé.
Testacea.	580	Le Testacée.
Vesicularis.	577	Le Vésiculeux.

A S I L U S.

Algirus.	586	L'Algérien.
Aquaticus.	* 596	L'Aquatique. <i>Scop.</i>
Ater.	588	Le Noir.
Barbarus.	586	L'Africain.
Barbatus.	* 593	Le Barbu. <i>Scop.</i>
Bombylius.	* 604	Le Bombyle. <i>V.</i>
Cinctus.	* 600	Le Cerclé. <i>F.</i>
Cingulatus.	* 600	L'Entouré. <i>F.</i>
Conopsoides.	* 595	Le Conopsoïde. <i>Scop.</i>
Crabroniformis.	586	Le Frelon.
Culiciformis.	* 600	Le Culiciforme. <i>F.</i>
Diadema.	* 599	Le Diadème. <i>F.</i> <i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Stomoxys 5.
Rhing. 2. *M.*

Conops à grosse tête. L'Afile à antennes en massue & ailes brunes. *Lege* 471. ead. 4.

Conops noir.

Stom. 6. *M.*
Rhingia 1.
ead. 3.

Stomoxys 3.
Syrphus 12.
Myopa 2.
L'Afile à antennes en massue & ailes brunes bordées de blanc. ead.

id. 3.

L'Afile tout noir. id. 10.
id. 4.

id. 29.
id. 25.

Afile Frelon. L'Afile brun à ventre à deux couleurs. id. 5.
id. 33.
id. 11.
Insect. Tom. IV. k

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Dorsalis.	* 597	Le Dorsal. <i>D. Geer.</i> . . .
Fasciculatus.	* 603	Le Fasciculé. <i>V.</i>
Ferox.	* 594	Le Féroce. <i>Scop.</i>
Flavipes.	* 604	Le Flavipede. <i>V.</i>
Flavus.	588	Le Jaune.
Forcipatus.	591	Le Menaçant.
Fulvus.	* 601	Le Fauve. <i>Geoff.</i> . . .
Fuscipes.	* 604	Le Fuscipede. <i>V.</i>
Germanicus.	590	L'Allemand.
Gibbosus.	587	Le Bossu.
Gilvus.	589	Le Roux.
Ignavus.	* 603	Le Paresseux. <i>Faun. Frid.</i>
Inquinatus.	* 597	Le Taché. <i>Scop.</i>
Linearis.	* 601	Le Rayé. <i>F.</i>
Lusitanicus.	593	Le Portugais.
Maculatus.	* 603	Le Trimaculé. <i>Faun. Frid.</i>
Maculatus.	* 596	Le Tacheté. <i>Scop.</i>
Marginatus.	590	Le Bordé.
Marmoratus.	* 602	Le Marbré. <i>Geoff.</i> . .
Medius.	* 603	Le Moyen. <i>Faun. Frid.</i>
Morio.	592	Le Morio.
Niger.	* 596	Le Noir. <i>Scop.</i>
Niger.	* 598	Le Noir. <i>D. Geer.</i> . . .
Olandicus.	592	Le Cylindrique. . . .
Podagiricus.	* 602	Le Goutteux. <i>Enum.</i>
Punctatus.	* 599	Le Ponctué. <i>F.</i> . . .
Puillus.	* 596	Le Pygmée. <i>Scop.</i>
Rufipes.	* 595	Le Rufipede. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Afile à dosier ver-
dâtre Ephippium
a 6.

Afile jaune. id. 12.

Afile cendrée. Afile cendré. id. 18.

. Afile velu de cou-
leur fauve.

. id. 19.

Afile - Bourdon. id. 7.

Afile roux. Afile noir à taches
fauves sur le ventre. id. 14.

. M. id.

Afile bordé. id. 16.

. Afile noir lisse, à
antennes, cuisses
& balanciers fau-
ves & ailes on-
dées de brun,

Afile noir,

Afile noir lisse, à
pattes & balan-
ciers fauves & ai-
les toutes noires. id. 31.

. id. 15.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Rufipes.	* 598	Le Rufipede. <i>D. Geer.</i>
Rufus.	* 597	Le Roux. <i>Scop.</i>
Tarsofus.	* 601	Les Tarfes noirs. <i>Geoff.</i>
Tenthredoides.	* 595	Le Tenthredoïde. <i>Scop.</i>
Teutonius.	590	Le Chevalier.
Tipuloides.	591	Le Tipuloïde.
Undulatus.	* 601	L'Ondulé. <i>Geoff.</i>
Violaceus.	* 599	Le Violet. <i>F.</i>
Viridescens.	* 603	Le Verdâtre. <i>V.</i>

BOMBYLIUS.

Ater.	607	Le Noir.
Fulvipes.	* 609	Le Fulvipede. <i>V.</i>
Fuscus.	* 607	Le Brun. <i>F.</i>
Griseus.	* 608	Le Gris. <i>F.</i>
Major.	605	Le Grand.
Medius.	606	Le Moyen.
Minimus.	* 608	Le Nain. <i>F.</i>
Minimus.	* 609	Le Pygmée. <i>Enum.</i>
Minor.	606	Le Petit.
Nudus.	* 609	Le Nud. <i>V.</i>
Versicolor.	* 608	Le Versicolor. <i>F.</i>
Virefcens.	* 608	Le Verdâtre. <i>F.</i>

HYPOBOSCA.

Avicularia.	610	Des Oiseaux.
-------------	-----	----------------------

D. Geer.

D. Geoff.

Fab.

Afile à patt. rouffes.

. Afile noir liffe à
pattes fauves &
pieds noirs.

. id. 27.

. Afile à pattes fau-
ves alongées. id. 26.

. Afile noir velu à
pattes & balanciers
fauves & ailes noi-
res ondées.

. id. 13.

. id. 6.

. id. 8.

. *M.* 11. id.

Bombylius à ailes Le Bichon. id. 1.

Bombylius à ailes
ponctuées. id. 3.

. *M.* 6. id.

. id. 5.

. *M.* 14. id.

. *M.* 12. id.

Hippobofque des

Oifeaux. ead. 2.
k iij

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Corvi.		612	Du Corbeau.
Equina.		610	Des Chevaux.
Hirundinis.		611	Des Hirondelles.
Ovina,		611	Des Brebis.

D. Geer.

D. Geoff.

Fab.

Hippobosque	des	La Mouc.-à-Chien.	ead. 1.
Chevaux.			
.	.	La M.-Araignée.	ead. 3.
.	.	.	ead. 4.

Finis Nomenclatoris Entomologi Tomi III.



